

2. *P. sophorae*, Fabricius, Ent. Syst. Vol. 1, p. 215 (1794) (Guinée, Congo).
 3. *P. sophoroides*, Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), Vol. 2, p. 106 (1868) (Guinée, Natal).
auripes, Thomson, Typ. Bupr. p. 82 (1878).
 4. *P. granulatus*, Roth, Wieg. Arch. Naturg. p. 119 (1851) (Abyssinie).
 5. **P. subfasciatus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 318 (1898) (Congo).
 6. *P. cyanimus*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 359 (1851) (Caffrerie, Togo).
 7. **P. leonensis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 318 (1898) (Sierra Leone).
 8. *P. zonatus*, Roth, Wieg. Arch. Naturg. p. 119 (1851) (Abyssinie, Zambèse).
 9. *P. splendidus*, Castelnau, Silb. Rev. Ent. Vol. 3, p. 166 (1835) (Sénégal, Sierra Leone, Zanzibar).
-
10. *P. Fabricii*, Saunders, Cat. Bupr. p. 107, n° 4 (1871) (Guinée).
sophorae || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Agrilus*, p. 65, pl. 14, f. 85 (1839).
 11. *P. inornatus*, Harold, Mon. Akad. Wiss. Berl. p. 218 (1878) (Zanguebar).
 12. *P. melliculus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 266, pl. 45, f. 261 (1841) (Cap de Bonne-Espérance).

22. GENUS SAMBUS, H. DEYROLLE

Sambus. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 210 (1864),

Caractères. — Tête inclinée; front plus ou moins aplani ou inégal; vertex très bombé et sillonné; épistome très court, largement échancré, l'échancrure anguleuse, séparée du front par un fin sillon transversal; joues inermes; cavités antennaires grandes, transversales, ouvertes au côté interne où elles forment gouttière. — Antennes assez longues, insérées au repos, à leur base, dans un sillon non prolongé sur l'épisternum prothoracique; dentées à partir du 5^e article, les 4 premiers grêles et subcylindriques; 1 plus épais que 2; 2, 3 et 4 subégaux; les suivants transversaux, aigus et dentés au côté interne, munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez gros, subovales et parallèles. — Pronotum plus large que haut; le disque convexe; la base bisinuée avec un lobe médian tronqué, les côtés munis d'une carène, la marge latérale plus ou moins crénelée. — Ecusson médiocre, mais toujours large, caréné transversalement en arrière. — Elytres convexes, lobés à la base avec un calus huméral saillant; le sommet arrondi et déclive. — Marge antérieure du prosternum prolongée suivant une mentonnière grande et arquée; prosternum large, non rétréci au sommet mais simplement bisiné. — Mésosternum divisé; ses branches latérales courtes et arquées entre les hanches postérieures et les médianes. — Métasternum échancré en avant. — Hanches postérieures très étroites au milieu et dilatées sur les côtés; les marges, surtout l'antérieure, très sinueuses. — Pattes assez robustes; fémurs robustes, les postérieurs plus épais que les autres et munis, sur la tranche interne, d'une petite dent obtuse située vers le tiers antérieur; tibias grêles et normaux, les postérieurs avec un léger renflement obtus et cilié, situé vers le milieu de la tranche externe; tarses courts, le premier article des postérieurs semblable au suivant. — Corps épais, oblong, rarement allongé; taille médiocre ou petite.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre comprend une quarantaine d'espèces actuellement connues et propres à la région Indo-malaise. Deux espèces seulement ont été découvertes en Afrique.

1. **S. zonalis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 342 (1893) (Rangoon).
2. *S. coloratus*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 816 (1892) (Birmanie).
3. **S. fulgidicollis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 81 (1900) (Sikkim).
4. *S. vermiculatus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 215 (1864) (Dorey).
5. ****S. pygmaeus***, Kerremans, (Ile Roon).
|| *simplex*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 81 (1900).
6. **S. modestus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 202 (1892) (Birmanie).
7. *S. Gautieri*, H. Deyrolle, idem, Vol. 8, p. 214 (1864) (Waigiou).
8. **S. gibbicollis*, Kerremans, ibidem, Vol. 36, p. 206 (1892) (Bengale).

9. **S. minutus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 138 (1896) (Sumatra).
 10. *S. amabilis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 215 (1864) (Batchian).
 11. **S. Deyrollei*, Thomson, Typ. Bupr. p. 82 (1878) (Bengale).
 12. *S. subgriseus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 216 (1864) (Makian).
 13. *S. chalcosomus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 55 (1879) (Bengale).
 14. **S. nigrinus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 207 (1892) (Bengale).
 15. **S. opacus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 17 (1900) (Sumatra).
 16. **S. fulvopictus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 321 (1900) (Sumatra).
 17. **S. pictus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 18 (1900) (Sumatra).
 18. **S. Weyersi*, Kerremans, idem (Sumatra).
 19. **S. gratiosus*, Kerremans, ibidem, p. 19 (Sumatra).
 20. ***S. africanus**, nov. sp. (1) (Afrique orientale anglaise).
 21. **S. aeneus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 19 (1900) (Sumatra).
 22. **S. pauper*, Kerremans, idem, p. 28 (Sumatra).
 23. **S. simplex*, Kerremans, ibidem, p. 20 (Sumatra).
 24. ***S. villosus**, nov. sp. (2) (Sumatra).
 25. **S. delectabilis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 20 (1900) (Sumatra).
-
26. *S. albopunctatus*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 347 (1851) (Natal).
 27. *S. argentatus*, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 358 (1877) (Nouvelle-Guinée).
 28. *S. auricolor*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 322 (1874) (Samar).
 29. *S. Boisduwali*, Montrouzier, Ann. Soc. Agr. Lyon. (2), Vol. 7, p. 10 (1855) (Polynésie).
 30. *S. delicatus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 55 (1879) (Célèbes).
 31. *S. dives*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 217 (1864) (Célèbes).
 32. *S. divisus*, H. Deyrolle, idem, p. 218 (Célèbes).
 33. *S. femoralis*, Kerremans, Ann. Mus. Genova, p. 817 (1892) (Birmanie).
 34. *S. kansuensis*, Ganglbauer, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 24, p. 27 (1890) (Chine).
 35. *S. Lafertei*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 212, pl. 4, f. 17 (1864) (Batchian).
 36. *S. lituratus*, H. Deyrolle, idem, p. 214 (Makian).
 37. *S. Loriae*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova (2), Vol. 12, p. 1003 (1890) (Nouvelle-Guinée).
 38. *S. lugubris*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 323 (1874) (Bohol).
 39. *S. macromerus*, Montrouzier, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 252 (1860) (Nouvelle-Calédonie).
 40. *S. Parisii*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 213 (1864) (Céram).
 41. *S. quadricolor*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Vol. 11, p. 513 (1873) (Japon).
 42. *S. sorocinus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 217 (1864) (Célèbes).

23. GENUS SAMBOIDES, KERREMANS

Samboides, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 16 (1900).

Caractères. — Tête étroite, infléchie, proéminente, mais non bombée sur le vertex; épistome court, bisinué, situé sur le même plan que le front, dont il forme le prolongement sans sillon séparatif; joues inermes; cavités antennaires grandes et subtransversales. — Antennes assez longues et grêles, dentées à partir du 5^e article; 1 et 2 allongés, assez épais; 3 et 4 grêles, fusiformes et subégaux entre eux; les suivants dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux allongés, grands, ovales, amincis en avant, obliques et rapprochés en arrière sur le vertex. — Pronotum en trapèze très

(1) Long. 3; larg. 0,7 mm. — Petit, allongé, oblong, convexe; tête verte; pronotum bronze clair, ses côtés cuivreux; élytres bronze obscur avec une villosité grise éparsse et une bande anguleuse au tiers postérieur. — Vertex faiblement sillonné; pronotum à très fines rides onduleuses; élytres rugueux, couverts de squamules simulant des fines écailles aciculées. Dessous noir et couvert d'une courte villosité grise assez rare. — Afrique orientale anglaise.

(2) Long. 2,7; larg. 0,6 mm. — Ecourté, atténué et déclive en arrière, convexe; tête verte, couverte d'une longue villosité argentée; pronotum obscur et brillant avec les côtés inférieurs vert clair; élytres verdâtres et brillants, couverts, sur leur moitié suturale, d'une villosité argentée. Dessous noir. — Tête convexe, sans sillons; disque du pronotum convexe; élytres très finement granuleux, dentelés au sommet; dent fémorale presque nulle. — Sumatra.

atténué en avant; la marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian; les côtés obliques et faiblement arqués avec la marge latérale lisse et finement rebordée; la base bisinuée. — Ecusson large, subelliptique, sillonné transversalement, la marge postérieure sinueuse et acuminée au milieu. — Elytres plans sur le disque, déclives sur les côtés et en arrière, subacuminés et finement dentelés au sommet. — Marge antérieure du prosternum avancée suivant une large mentonnière échancrée au milieu; prosternum large et plan. — Mésosternum divisé, ses branches latérales très courtes et très étroites entre les hanches antérieures et les médianes. — Métasternum à peine échancré en avant. — Hanches postérieures non contiguës, élargies en avant, au côté externe. — Pattes assez robustes; fémurs antérieurs normaux, les postérieurs très renflés, inermes sur le bord interne; tibias longs et grêles; tarses courts, tous leurs articles subégaux entre eux, sauf le 5^e, celui-ci allongé; crochets dentés. — Corps écourté, naviculaire, convexe en dessous et acuminé en arrière.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce connue de ce genre provient de Sumatra.

1. **S. viridana*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 17 (1900) (Sumatra).

24. GENUS CRYPTODACTYLUS, H. DEYROLLE

Cryptodactylus. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 130 (1864).

Caractères. — Tête convexe, quadrituberculée entre deux sillons qui se coupent, l'un transversal, l'autre longitudinal; épistome court, échancré au milieu, son sommet formé par le bord des cavités antennaires; joues inermes; cavités antennaires grandes, arrondies et presque contiguës, séparées du front par un sillon. — Antennes courtes, dentées à partir du 5^e article; 1 allongé et épais; 2 court, obconique; 3 et 4 un peu plus longs mais moins épais, subégaux entre eux; les suivants transversaux, aigus au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, elliptiques, un peu obliques, plus écartés en arrière, sur le vertex que vers la bouche. — Pronotum peu convexe, élargi sur les côtés, rétréci en avant et en arrière; la marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian avancé et arqué; le lobe médian de la base tronqué; des carènes latérales. — Ecusson triangulaire, un peu plus long que large; son sommet aigu. — Elytres plans et droits sur le disque, un peu plus larges que le pronotum à la base, arrondis à l'épaule, sinueux sur les côtés, légèrement dilatés ensuite et séparément arrondis et subacuminés au sommet; celui-ci finement dentelé. — Marge antérieure du prosternum munie d'une large mentonnière arquée; prosternum très légèrement convexe, subtriangulaire et acuminé au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes et arquées entre les hanches antérieurs et les médianes. — Métasternum échancré en avant. — Hanches postérieures plus dilatées en avant au côté externe qu'à l'interne; la marge antérieure très sinueuse, la postérieure presque droite. — Pattes assez robustes; fémurs normaux; tibias larges, dilatés et tranchants sur le bord externe, évidés intérieurement au sommet pour l'insertion du tarse au repos; tarses courts et larges, les articles subégaux; crochets appendiculés à la base. — Corps allongé, plan en dessus, peu robuste.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre ne comprend qu'un petit nombre d'espèces connues, toutes propres à la faune Indo-Malaise.

1. *C. pulchellus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Evagora*, p. 7, pl. 2, f. 10 (1839) (Bengale).

* *pulchellus*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 206 (1890).

2. *C. tristis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 132 (1864) (Sumatra).

3. *C. philippinensis*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 321 (1874) (Manille).

4. **C. scutellaris*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 209 (1892) (Bengale).

5. **C. Weyersi*, nov. sp. (1) (Sumatra).

(1) Long. 4; larg. 0,8 mm. — Petit, étroit, entièrement noir avec, sur les élytres, trois bandes grises, sinueuses et formées par une courte villosité. — Tête étroite et très convexe en arrière: sillon de la base du pronotum très profond et oblique; les côtés de celui-ci largement arrondis, à peine anguleux en arrière; élytres très finement granuleux, plus finement encore sur les bandes villoses. — Sumatra.

6. **C. nigricans*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 206 (1890) (Bengale).
7. **C. cyaneoniger*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 207 (1892) (Bengale).
8. **C. cuprascens*, Kerremans, idem, p. 209 (Bengale).

-
9. *C. auriceps*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 513 (1873) (Japon).
 10. *C. coeruleus*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. (3), Vol. 5, p. 311 (1867) (Siam).
 11. *C. gracilis*, Schoenfeldt, Ent. Nachtr. Vol. 14, p. 209 (1888) (Célèbes, Japon).
auriceps, Lewis, The Entomologist, Vol. 26, p. 151 (1893).
 12. *C. lugubris*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 131, pl. 3, f. 3 (1864) (Céram).

25. GENUS TOXOSCELUS, H. DEYROLLE

Toxoscelus. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 127 (1864).

Caractères. — Tête convexe, sillonnée longitudinalement, vaguement bituberculée en arrière; épistome assez allongé, faiblement échancré en avant, séparé du front par un fin sillon transversal; joues inermes; cavités antennaires grandes, sensiblement espacées et situées à une certaine distance du bord interne des yeux. — Antennes courtes, dentées à partir du 4^e ou du 5^e article; 1 renflé, légèrement courbe; 2 plus court, de même épaisseur, 3 et 4 de même longueur, mais plus grêle; les autres dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, ovalaires, obliques et légèrement écartés en arrière sur le vertex. — Pronotum très élargi sur les côtés, atténué en avant et rétréci en arrière; la marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian très avancé; la base bisinuée avec un large lobe médian avancé et arrondi; carènes latérales plus ou moins distinctes. — Ecusson médiocre, triangulaire, un peu plus long que large et acuminé au sommet. — Elytres plans et droits sur le disque, sinueux sur les côtés, légèrement élargis au tiers postérieur, rétrécis ensuite et conjointement arrondis au sommet avec un très petit vide anguleux sutural. — Marge antérieure du prosternum faiblement échancrée en arc, sans mentonnière, mais avec un léger rebord; prosternum plan ou un peu concave, élargi en avant et acuminé en arrière. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes et arquées entre les hanches antérieures et les médianes. — Métasternum échancré en avant. — Hanches postérieures concaves en avant et droites en arrière. — Pattes moyennes; fémurs normaux; tibias subcylindriques, les antérieurs et les médians très recourbés, surtout à la base, les postérieurs presque droits et ciliés sur leur tranche externe; tarsi courts, à articles 1 à 4 subégaux entre eux; crochets lobés ou appendiculés à la base. — Corps aplani en dessus, peu robuste et allongé.

Distribution géographique des espèces. — Des sept espèces actuellement connues de ce genre, une seule est propre à l'Afrique (Cameroon); les autres proviennent de Bornéo, de Sumatra, du Bengale et des Philippines.

1. **T. purpureomicans*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 205 (1890) (Bengale).
2. **T. singularis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 12 (1900) (Sumatra).
3. **T. africanus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 274 (1899) (Cameroon).

-
4. *T. centralis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 129 (1864) (Bornéo).
 5. *T. funebris*, H. Deyrolle, idem, p. 130 (Bornéo).
 6. *T. rugicollis*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 322 (1874) (Luçon).
 7. *T. undatus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 130 (1864) (Bornéo).

26. GENUS EVIMANTIUS, H. DEYROLLE

Evimantius. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 113 (1864); Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. 163 (1891).

Caractères. — Tête convexe, bituberculée entre les yeux et sillonnée longitudinalement; épistome court, échancré en avant, situé sur un plan inférieur à celui du front et séparé de celui-ci par une carène transversale; joues armées d'une dent obtuse; cavités antennaires grandes et transversales. — Antennes dentées à partir du 4^e article; 1 épais, allongé et incurvé; 2 presque aussi long que 1, plus mince, renflé au bout; 3 et 4 obconiques, subégaux entre eux; les suivants plus larges et triangulaires; fossettes porifères terminales. — Yeux assez grands, elliptiques, obliques et plus écartés en arrière, sur le vertex, qu'en avant. — Pronotum subtrapézoïdal; le disque très convexe, les côtés déprimés; la marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian; la latérale oblique, échancrée contre la base; celle-ci bisinuée avec un lobe médian large et tronqué. — Ecusson en trapèze, tronqué au sommet. — Elytres allongés, plans, largement évidés entre la suture et une côte médiane, longitudinale et naissant du calus huméral, celui-ci très saillant; le sommet subacuminé. — Marge antérieure du prosternum munie d'une mentonnière très étroite, plus accentuée et lobée sur les côtés; prosternum large, plan, rétréci en arrière et acuminé au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes et recourbées entre les hanches antérieures et les médianes. — Mésternum largement échancré en arc en avant. — Hanches postérieures plus dilatées en avant au côté externe qu'à l'interne; la marge antérieure sinueuse, la postérieure presque horizontale, un peu abaissée au côté interne. — Pattes peu robustes; fémurs et tibiaux normaux, ceux-ci un peu arqués, grêles et subcylindriques; tarses assez allongés, les 4 premiers articles comprimés, le 1^{er} des postérieurs un peu plus long que le suivant, le 5^e allongé et grêle; crochets dentés à la base. — Corps allongé, plan en dessus, atténué en arrière.

Distribution géographique des espèces. — On ne connaît que deux espèces de genre, toutes deux de Madagascar.

1. **E. rufopictus*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 35, p. 163 (1891) (Madagascar).

2. *E. curvicollis*, Kerremans, idem, p. 164 (Madagascar).

27. GENUS ALYSSODERUS, H. DEYROLLE

Alyssoderus. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 114 (1864).

Caractères. — Tête convexe, inclinée en avant; front médiocrement sillonné et inégal, mais faiblement bossué; épistome allongé, échancré en avant et séparé du front par un fin sillon transversal; joues dentées; cavités antennaires assez grandes, arrondies. — Antennes médiocres, dentées à partir du 5^e article; 1 allongé, obconique, épaissi au bout, aussi long que 2 et 3 réunis; 2 court, épais, subglobulaire; 3 et 4 obconiques, plus grêles, subégaux entre eux, 3 un peu plus allongé que 2; les suivants triangulaires, transversaux, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, elliptiques, un peu obliques et légèrement écartés en arrière sur le vertex. — Pronotum inégal, bossué, convexe, bisinué en avant avec un lobe médian avancé et subanguleux; les côtés obliques et arqués; la base bisinuée avec un large lobe médian tronqué au-dessus de l'écusson. — Celui-ci petit, triangulaire. — Elytres subconvexes, atténués en arrière, largement et peu profondément évidés entre la suture et une côte longitudinale et médiane naissant du calus huméral. — Marge antérieure du prosternum tronquée, sans mentonnière; prosternum assez court, large, aplani, le sommet obliquement tronqué sur les côtés et subarrondi à l'extrémité. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes et

recourbées entre les hanches antérieures et les médianes. — Métasternum faiblement échancré en arc en avant. — Hanches postérieures courtes, plus dilatées en avant au côté externe qu'à l'interne, la marge antérieure sinueuse, la postérieure oblique. — Pattes peu robustes; fémurs et tibias normaux, ceux-ci grêlés, subcylindriques et droits, les postérieurs ciliés sur leur tranche externe; tarses médiocres et comprimés, le premier article des postérieurs plus long que le suivant; crochets des tarses bifides. — Corps allongé, subcylindrique, assez convexe, atténué en avant et en arrière.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre paraît exclusivement confiné dans l'Afrique australe.

1. *A. leucogaster*, Wiedemann, Germ. Mag. Vol. 4, p. 121 (1821) (Caffrerie).

foveolatus, Thunberg, Nov. Act. Upsal, Vol. 9, p. 48 (1827).

2. *A. albi vittis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Amorphosoma*, p. 7, pl. 2, f. 7 (1839) (Cap Bonne-Esp.).

3. *A. superciliosus*, Wiedemann, Germ. Mag. Vol. 4, p. 121 (1821) (Natal).

cornutus, Thunberg, Nov. Act. Upsal. Vol. 9, p. 52 (1827).

4. *A. cuprascens*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Amorphosoma*, p. 9, pl. 2, f. 10 (1839) (Cap Bonne-Esp.).

5. *A. spectrum*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 339 (1851) (Caffrerie).

6. *A. vittatus*, Lansberge, Notes Leyd. Mus. p. 116 (1886) (Kumpata).

28. GENUS EUPRISTOCERUS, H. DE YROLLE

Eupristocerus. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 113 (1864).

Caractères. — Tête sillonnée; front bituberculé entre les yeux; épistome court, profondément échancré en arc au milieu et lobé sur les côtés, séparé du front par une étroite carène anguleuse, un peu avancée entre les cavités antennaires; joues dentées; cavités antennaires grandes et arrondies. — Antennes robustes, dentées à partir du 4^e article; 1 épais, renflé au bout et courbe; 2 très court globulaire et aussi épais que le 1^{er}; 3 de la longueur du deuxième, mais triangulaire; 4 et 5 très larges, dentés au côté interne; 6 un peu moins grand que 5 et moins dilaté, les suivants diminuant graduellement en longueur et en largeur; à partir du 4 munis d'une large fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, ovales et parallèles. — Pronotum médiocre, plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, le disque très convexe, les côtés aplanis et la base sillonnée; la marge antérieure peu sinueuse, la latérale crénelée; la base bisinuée avec un large lobe médian arqué. — Ecusson très petit, triangulaire. — Elytres larges, convexes, élargis au tiers supérieur, sensiblement évidés le long de la suture; le sommet séparément arrondi et dentelé. — Marge antérieure du prosternum tronquée, sans mentonnière, très étroitement rebordée; prosternum court, large, plan, atténué au sommet, celui-ci arrondi. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes, incurvées entre les hanches antérieures et les médianes. — Métasternum faiblement échancré. — Hanches postérieures très courtes, non dilatées au côté interne, l'externe très élargi en avant. — Pattes peu robustes; fémurs et tibias normaux, à bord externe tranchant, les postérieures ciliés sur ce bord; tarses avec les quatre premiers articles subégaux; crochets bifides. — Corps assez épais, convexe et élargi en arrière.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce de ce genre habite l'Amérique du Nord.

1. *E. cogitans*, Weber, Obs. Ent. Vol. 1, p. 75 (1801) (Etats-Unis d'Amérique).

ignarus, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 211 (1801).

ruficollis, Herbst, Col. Vol. 9, p. 249, pl. 155, f. 9a-b (1801).

29. GENUS POLYONYCHUS, CHEVROLAT

Polyonychus. Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 102 (1837).

Caractères. — Tête convexe, sillonnée longitudinalement, quadrituberculée ou non; épistome court, à peine sinueux en avant, séparé du front par un sillon sinueux et profond; joues armées d'une courte dent obtuse; cavités antennaires grandes et transversales. — Antennes courtes, dentées à partir du 4^e article; le premier courbé et épais; 2 plus court, globulaire; 3 plus mince et plus court; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux oblongs, globulaires, obliques et plus écartés en arrière, sur le vertex, qu'en avant. — Pronotum large, convexe sur le disque, les côtés aplanis; la marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian arrondi; les côtés sinueux au milieu et atténués en avant et en arrière; la base bisinuée avec le lobe médian tronqué. — Ecusson assez grand, en triangle équilatéral. — Elytres allongés, peu convexes, avec une côte médiane naissant du calus huméral et disparaissant vers le sommet; celui-ci conjointement arrondi et finement dentelé. — Marge antérieure du prosternum munie d'une mentonnière entière, à bords subsinueux; prosternum court, un peu bombé, atténué et arrondi au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches très courtes, à peine visibles entre les hanches antérieures et les médianes. — Métasternum échancré en avant. — Hanches postérieures courtes, faiblement dilatées au côté inférieur interne et très dilatées au côté antérieur externe. — Pattes peu robustes; fémurs normaux, creusés sur leur tranche interne; tibias faiblement arqués, légèrement dilatés sur leur moitié postérieure et tranchants sur le bord externe, les postérieurs ciliés sur ce bord; tarses très courts, leurs quatre premiers articles subégaux entre eux; crochets bifides. — Corps allongé, subplan en dessus, subcylindrique, arrondi en avant et en arrière.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre a toujours été confondu avec les *Discoderes*, dont il s'éloigne par beaucoup de caractères. Il paraît confiné dans l'Hindoustan et les régions affines

1. *P. tricolor*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. (3), Vol. 5, p. 311, pl. 21, f. 5 (1867) (Birmanie).
2. *P. nigropictus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Coraeus*, p. 4, pl. 1, f. 4 (1839) (Bengale).
* *pictus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 339 (1893).
3. **P. mucidus*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 102 (1837) (Bengale).
Smer, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Coraeus*, p. 3, pl. 1, f. 3 (1839).
4. **P. proximus*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 207 (1890) (Bengale).

30. GENUS DIADORA, KERREMANS

Diadora. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 323 (1900).

Caractères. — Tête convexe, inclinée en avant; front inégal, sillonné longitudinalement et bituberculé en avant; épistome échancré en avant, court, séparé du front par une carène; droit et non rétréci entre les cavités antennaires; joues dentées; cavités antennaires médiocres, arrondies et situées contre les yeux. — Antennes médiocres, dentées à partir du 4^e article; 1 épais, 2 et 3 à peu près aussi longs que 1, mais plus grêles et subégaux entre eux; les suivants assez épais, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux petits, saillants, subelliptiques, à peine obliques et un peu plus écartés en arrière, sur le vertex. — Pronotum à peine plus large que haut et un peu plus étroit en avant qu'en arrière; le disque inégal, bossué et très convexe; la marge antérieure bisinuée, très avancée au milieu et relevée en gouttière ou simplement rebordée; la base bisinuée avec un large lobe médian arqué et avancé. — Ecusson petit, en triangle un peu allongé, acuminé au sommet. — Elytres allongés, subplans, légèrement lobés à la base, atténués en arrière et séparément arrondis ou subacu-

minés au sommet; celui-ci finement dentelé. — Marge antérieure du prosternum faiblement échancrée en arc, finement rebordée sans mentonnière distincte; prosternum court, légèrement convexe, atténué en arrière. — Branches latérales du mésosternum très courtes et arquées entre les hanches antérieures et les médianes. — Métasternum à peine échancré en avant. — Hanches postérieures plus dilatées au côté externe qu'à l'interne, la marge antérieure plus concave que la postérieure. — Pattes peu robustes; fémurs normaux; tibias un peu arqués, leur bord externe caréné, celui des postérieurs cilié; tarses très courts, leurs quatre premiers articles très courts et subégaux entre eux; crochets bifides. — Corps allongé, subcylindrique, très rugueux en dessus.

Distribution géographique des espèces. — Je ne connais que deux espèces de ce genre, toutes deux du Brésil.

1. **D. gibbicollis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 52 (1897) (Pernambouque).

2. **D. lutea*, Kerremans, idem, p. 51 (Bahia).

31. GENUS PARADORA, KERREMANS

Paradora. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 323.

Caractères. — Tête convexe, sillonnée longitudinalement et bituberculée en arrière; épistome échancré en arc en avant; joues inermes; cavités antennaires grandes, transversales et surmontés d'un sillon net et arqué. — Antennes courtes, dentées à partir du 5^e article; 1 et 2 subégaux, épais, renflés au sommet; 3 et 4 subégaux entre eux, plus grêles, obconiques, un peu plus courts que 1 et 2; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, assez saillants, elliptiques, un peu obliques et légèrement écartés en arrière sur le vertex. — Pronotum convexe sur le disque; impressionné et déprimé sur les côtés; la marge antérieure fortement bisinuée avec le lobe médian grand, arqué et avancé sur le vertex; les côtés dilatés, aplanis, subsinueux et arqués avec l'angle postérieur très obtus; une carène latérale sinueuse; la base bisinuée avec le lobe médian tronqué. — Ecusson assez grand, en triangle équilatéral. — Elytres assez convexes, allongés, oblongs, arrondis et saillants à l'épaule, déprimés à la base, arrondis au sommet. — Marge antérieure du prosternum munie d'une mentonnière plus ou moins grande et plus ou moins échancrée au milieu; prosternum assez large, plan, arrondi et un peu atténué en arrière. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes et arquées entre les hanches antérieures et les médianes. — Métasternum faiblement échancré en avant. — Hanches postérieures courtes au milieu, un peu dilatées en arrière au côté interne et très dilatées en avant à l'externe, la marge antérieure très sinueuse, la postérieure légèrement cintrée en dedans. — Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes; tibias grêles et simples; tarses assez courts, les articles 1 à 4 subégaux entre eux; crochets bifides. — Corps oblong, peu convexe en-dessus, couvert d'une vestiture bigarrée et soyeuse, sombre en-dessus.

J'ai fondé ce genre pour une espèce du Cap et une autre de Madagascar, décrites par Castelnau et Gory, et rangées par eux parmi les *Corabus*. M. Edw. Saunders, dans son catalogue, les plaçait parmi les *Discoderes*. Depuis, j'avais fait de ces espèces des *Phlocteis* et j'ai cru devoir les en inséparer ensuite.

Distribution géographique des espèces. — Je ne connais que quatre espèces pouvant être admises dans ce genre, dont trois de Madagascar et une de Mozambique et du Cap de Bonne-Espérance. Peut-être y aura-t-il lieu d'y intercaler quelques *Discoderes* ou quelques *Amorphosoma* qui ne me sont pas connus en nature.

1. *P. pumicata*, Klug, Ins. Madag. p. 62 (1833) (Madagascar).

2. *P. impetigiosa*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 277, pl. 46, f. 269 (1841) (Cap de Bonne-Espérance).

3. **P. zonata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 277 (1899) (Madagascar).
4. **P. saxosicollis*, Fairmaire idem, Vol. 41, p. 381 (1897) (Madagascar).
5. **P. nodifrons*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 281 (1899) (Dar-Es-Salaam).
nodiceps, Kerremans, idem, Vol. 44, p. 342 (1900).

32. GENUS EPIMACHA, KERREMANS

Epimacha. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 321 (1900).

Caractères. — Tête convexe, faiblement mais visiblement quadrituberculée en arrière; front étroitement sillonné; épistome court, largement et peu profondément échancré en arc en avant, séparé du front par une carène sinueuse; joues inermes; cavités antennaires très grandes et transversales. — Antennes courtes, dentées à partir du 5^e article; le 1^{er} robuste et épais; 2 plus grêle, un peu plus court que 3 et 4 réunis; ceux-ci courts, subégaux et obconiques; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, assez saillants, elliptiques, un peu obliques et légèrement écartés en arrière, sur le vertex. — Pronotum plus large que haut, plus étroit en avant et en arrière, plan sur le disque, déclive et caréné sur les côtés; la marge antérieure faiblement bisinuée; la marge latérale obliquement arquée en avant et échancrée en arrière dans l'angle postérieur; la base faiblement bisinuée. — Ecusson petit, en triangle équilatéral. — Elytres plans sur le disque et légèrement déclives sur les côtés, laissant à découvert une portion latérale de la région supérieure du premier segment abdominal; le sommet obliquement tronqué de part et d'autre et formant un angle obtus. — Marge antérieure du prosternum munie d'une large mentonnière arrondie aux angles et faiblement bisinuée au milieu; prosternum plan, anguleusement atténué en arrière. — Mésosternum divisé; ses branches latérales courtes et arquées entre les hanches antérieures et les médianes. — Métasternum faiblement échancré au sommet. — Hanches postérieures étroites, faiblement et inversement dilatées au côté interne et à l'externe. — Pattes médiocres; fémurs fusiformes, légèrement incurvés au sommet; tibias antérieurs et médians assez larges, aplanis et tranchants sur le bord externe; les postérieurs subcylindriques, ciliés sur le bord externe; tarses très courts, les articles 1 et 4 comme emboîtés l'un dans l'autre et égaux entre eux; crochets bifides. — Corps plan en dessus, atténué en avant et subacuminé en arrière.

Distribution géographique des espèces. — Les deux seules espèces que je connaisse de ce genre habitent les îles Andaman.

1. **E. planata*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 80 (1900) (Iles Andaman).
2. ***E. Théryi**, nov. sp. (1) (Iles Andaman).

33. GENUS NASTELLA, NOV. GEN.

Caractères. — Tête médiocrement convexe, sans tubercules, avec un fin sillon médian; épistome très court, échancré au milieu en avant et bilobé sur les côtés; joues obtusément dentées; cavités antennaires assez grandes et arrondies. — Antennes assez allongées, dentées à partir du 5^e article; le 1^{er} épaissi, subfusiforme; 2 plus court que 1 et plus long que 3, épais et obconique; 3 et 4 courts, obconiques et subégaux entre-eux; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, elliptiques et parallèles. — Pronotum uni, peu convexe sur le disque, déprimé sur les côtés; la marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian peu avancé;

(1) Long. 8; larg. 2,5mm. — Plan en dessus, atténué en avant et acuminé en arrière, d'un noir brillant et couvert en-dessus d'un dessin d'un noir velouté intense avec, vers le sommet, deux bandes villeuses et grises, l'une au tiers postérieur et l'autre préapicale. — Faciès de l'espèce précédente, mais le front plus tuberculé en arrière, la tête plus étroite, les côtés du pronotum plus élargis, plus dilatés et plus abaissés en avant, la carène moins nette, les élytres plus acuminés au sommet et terminés en épine aiguë, la coloration différente. — Iles Andaman.

les côtés arqués et subsinueux avec l'angle postérieur obtus et non échancré; la base bisinuée avec le lobe médian avancé entre les élytres et tronqué au sommet; une carène latérale sinueuse bien marquée en avant. — Ecusson très petit, triangulaire. — Elytres plans, à peine convexes avec une côte médiane vague; arrondis à l'épaule avec le calus huméral bien marqué; relevés à l'extrémité; les côtés postérieurs obliquement atténués, sinueux vers le sommet et ensuite obliquement tronqués. — Marge antérieure du prosternum sans mentonnière distincte sauf un très léger rebord de chaque côté; prosternum large, plan, atténué en arrière. — Mésosternum divisé; ses branches latérales arquées entre les hanches postérieures et les médianes. — Métasternum échancré au sommet. — Hanches postérieures non dilatées au côté interne et faiblement dilatées en avant à l'externe; la marge antérieure sinueuse et la postérieure droite. — Pattes médiocres; fémurs subfusiformes et normaux; tibias droits, grêles et subcylindriques; tarses égaux entre eux assez allongés, leurs articles non emboîtés, le premier des postérieurs un peu plus long que le suivant; crochets fortement dentés. — Corps allongé, légèrement élargi au tiers supérieur, peu convexe en-dessus.

Distribution géographique de l'espèce. — Une seule espèce, de la région du Cap de Bonne-Espérance.

I. ***N. Fairmairei**, nov. sp. (1). (Cap de Bonne-Espérance).

34. GENUS PLANIDIA, KERREMANS

Planidia, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 278 (1899).

Caractères. — Tête velue, quadrituberculée, sillonnée longitudinalement; épistome très étroit entre les cavités antennaires, son bord postérieur anguleusement échancré et constitué par les bords des cavités antennaires; joues inermes; cavités antennaires très grandes, arrondies, presque contigües, séparées par une étroite carène sillonnée que forme en cet endroit l'épistome, surmontées d'un profond sillon arqué. — Antennes très courtes, dentées à partir du 5^e article; 1 grand et très épais; 2 un peu moins grand, mais épais; 3 et 4 subégaux, triangulaires, obconiques; les suivants très courts et très transversaux, triangulaires, acuminés et dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, elliptiques, très obliques et plus écartés en arrière qu'en avant. — Pronotum grand, inégal, bossué, subcylindrique; la marge antérieure fortement bisinuée avec le lobe médian avancé et arrondi; les côtés droits en arrière et légèrement arqués en avant avec une carène très sinueuse et la marge latérale lisse, un peu arquée et invisible en dessus; la base bisinuée avec un large lobe médian arqué. — Ecusson grand, très acuminé en arrière, en triangle curviligne; la base et les côtés échancrés en arc. — Elytres plans, droits, allongés, sans côtes distinctes, légèrement déclives sur les côtés et séparément arrondis au sommet. — Marge antérieure du prosternum munie d'une mentonnière grande, avancée et cintrée en avant; prosternum court et subplan, anguleusement atténuée au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales arquées et entourant la moitié antérieure des hanches médianes. — Métasternum anguleusement échancré en avant. — Hanches postérieures courtes, un peu plus dilatées au côté antérieur externe qu'au postérieur interne. — Pattes peu robustes; fémurs et tibias normaux, les premiers sufusiformes et les seconds droits, à peine arqués à la base; tarses très courts, égaux entre eux; crochets bifides. — Corps très allongé, subcylindrique, plan sur les élytres.

(1) Long. 8, 5; larg. 2, 6 mm. — Bronze clair et légèrement cuivreuse, couvert d'une villosité grise assez dense et retenant une pulvéulence blanche, plus dense en-dessous, sur les côtés du pronotum, sur la moitié intérieure des élytres et à leur sommet que sur le restant du corps. — Tête rugueuse, finement et régulièrement chagrinée; pronotum couvert de petites rides sinueuses; élytres finement chagrinés, les rugosités formant de vagues petites rides onduleuses sur les côtés et sur la partie antérieure du disque. Dessous granuleux et ponctué, couvert, surtout en avant, d'une abondante pulvéulence blanche; extrémité du dernier segment abdominal arrondie et finement rebordée. — Cap de Bonne-Espérance.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce connue du genre provient de l'Abyssinie.

1. **P. velutina*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 279 (1899) Abyssinie.

35. GENUS DEMOSTIS, KERREMANS

Demostis. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 322 (1900).

Caractères. — Tête subplane en avant et ornée en arrière, sur le vertex, de deux tubercules saillants, légèrement divergents et velus; épistome échancré en avant au milieu et sinueux sur les côtés, séparé du front par une carène sinueuse; joues inermes; cavités antennaires grandes, transversales et presque contigües. — Antennes médiocres, dentées à partir du 5^e article; 1 et 2 épais, le premier plus grand que le deuxième; 3 et 4 courts, obconiques, subégaux entre eux, 3 plus court que 4; les suivants dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, un peu plus écartés en arrière qu'en avant. — Pronotum grand, inégal, bossué, à carènes latérales très saillantes; la marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian arqué; les côtés arqués en avant et droits en arrière avec l'angle postérieur arrondi; la base fortement bisinuée avec un large lobe médian tronqué. — Ecusson triangulaire et élargi, caréné et sillonné le long de la base. — Elytres allongés, parallèles et plans; séparément arrondis et finement dentelés au sommet. — Marge antérieure du prosternum munie d'une mentonnière avancée et à bord sinueux; prosternum large, plan, atténué en arrière, le sommet subanguleux et presque arrondi. — Mésosternum divisé; ses branches latérales arquées autour de la moitié antérieure des hanches médianes. — Métasternum échancré en arc en avant. — Hanches postérieures courtes, un peu plus dilatées au côté antérieur externe qu'au postérieur interne. — Pattes peu robustes; fémurs et tibiaux normaux, les premiers fusiformes et les seconds subcylindriques et droits; tarses égaux entre eux, leurs articles courts avec le 4^e fortement lamellé en dessous, la lamelle grande et cordiforme; crochets bifides. — Corps très allongé, plan en dessus.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce connue de ce genre habite l'île de Sumatra.

1. **D. elongata*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 15 (1900) (Sumatra).

36. GENUS MUNDARIA, KERREMANS

Mundaria. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 468 (1894).

Caractères. — Tête sillonnée, vaguement bituberculée en arrière et déprimée en avant; épistome court, assez élargi entre les cavités antennaires, échancré en arc en avant et lobé sur les côtés, séparé du front par une carène sinueuse; joues obtusément dentées; cavités antennaires médiocres et arrondies. — Antennes courtes, dentées à partir du 4^e article; le 1^{er} court et épais; 2 moins épais, mais plus allongé, aussi long que 3 et 4 réunis; 3 court, obconique; les suivants transversaux et écourtés, triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux peu saillants, elliptiques, allongés et parallèles. — Pronotum inégal, convexe et bossué; la marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian avancé; les côtés arrondis en avant et sinueux en arrière avec l'angle postérieur aigu; la marge latérale finement crénelée; carène latérale très éloignée du bord et constituée par un calus à crête tranchante et droite situé de chaque côté du disque; la base bisinuée avec un large lobe médian arqué. — Ecusson grand, large, subcordiforme et très acuminé en arrière. — Elytres allongés, convexes, impressionnés à la base entre deux calus, l'un huméral, l'autre subscutellaire; le sommet largement et séparément arrondi et dentelé. — Marge antérieure du prosternum échancrée en arc, sans

mentonnière distincte; prosternum large, plan, surélevé et triangulaire; son sommet arrondi. — Mésosternum divisé; ses branches latérales excessivement courtes et arquées entre les deux premières paires de hanches. — Mésternum échancré en avant. — Hanches postérieures plus dilatées au côté externe qu'à l'interne; la marge antérieure très sinueuse, la postérieure cintrée en arrière. — Pattes peu robustes; fémurs normaux, subfusiformes; tibias antérieurs et médians un peu aplanis et tranchants sur le bord externe, les postérieurs grêles, aplanis, ciliés sur le bord externe avec un petit lobe anguleux un peu avant le milieu; tarses courts, subégaux entre eux; crochets bifides. — Corps allongé, subcylindrique.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce connue de ce genre habite le Bengale.

1* *M. typica*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 469 (1894) (Barway).

37. GENUS ASYMADES, KERREMANS

Asymades. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 118 (1893).

Caractères. — Tête inégale, sillonnée et bituberculée en arrière; épistome court, échancré en avant entre deux larges lobes latéraux; joues obtusément et fortement dentées; cavités antennaires médiocres, arrondies et surmontées d'un court sillon arqué. — Antennes médiocres, dentées à partir du 4^e article; le 1^{er} allongé, épais, en massue; 2 et 3 courts, obconiques, aussi longs ensemble que le premier, 3 un peu plus long que 2; les suivants courts, triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, épais, elliptiques, obliques et plus rapprochés en avant qu'en arrière, sur le vertex. — Pronotum inégal, gibbeux au milieu, bossué et rugueux, la marge antérieure peu sinueuse; les côtés aplanis, obliquement arqués en avant, leur plus grande largeur après le milieu, l'angle postérieur très obtus, la marge latérale crénelée; la base bisinuée. — Ecusson assez grand déprimé et subcordiforme. — Elytres convexes, séparément arrondis et dentelés au sommet. — Marge antérieure du prosternum échancrée en arc, sans mentonnière distincte, mais lobée sur les côtés; prosternum bombé, déclive en avant et en arrière, son sommet encastré dans une cavité déclive et anguleuse du mésternum. — Mésosternum divisé, ses branches latérales à peine visibles entre les hanches antérieures et les médianes. — Mésternum déclive et échancré en avant. — Hanches postérieures très courtes, dilatées au côté externe. — Pattes peu robustes; fémurs médiocres, allongés, subfusiformes; tibias grêles et subcylindriques; les postérieurs ciliés sur le bord externe avec une dent obtuse près du sommet; tarses très courts, subégaux entre eux; crochets bifides.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce de ce genre habite le Transvaal.
1. **A. transvalensis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 119 (1893) (Transvaal).

38. GENUS BELGAUMIA, NOV. GEN.

Caractères. — Tête déprimée en avant et sillonnée en arrière entre deux larges tubercules peu saillants; épistome court et large, échancré au milieu, l'échancrure arquée et large; joues dentées, la dent courte et aiguë; cavités antennaires médiocres et arrondies. — Antennes courtes, dentées à partir du 4^e article; le 1^{er} court et épais; 2 plus allongé et plus grêle; 3 semblable à 2, mais plus court; les suivants triangulaires, assez épais, paraissant emboîtés l'un dans l'autre, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux grands, elliptiques et parallèles. — Pronotum plus large que haut, bombé sur le disque, déprimé et aplani sur les côtés; la marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian avancé et arqué; les côtés largement arrondis avec l'angle antérieur abaissé et aigu et le postérieur aigu; la marge latérale très finement crénelée; pas de carène latérale; la base bisinuée avec un

large lobe médian arrondi sur ses côtés et tronqué au milieu. — Ecusson plus large que haut, subcordiforme; sa marge antérieure tronquée, ses côtés arrondis, son sommet bisinué de part et d'autre et acuminé au milieu. — Elytres convexes, régulièrement arqués d'avant en arrière, largement et conjointement arrondis et dentelés au sommet. — Marge antérieure du prosternum largement et peu profondément échancrée en arc, sans mentonnière distincte; prosternum court et plan, largement arrondi en arrière. — Mésosternum divisé; ses branches latérales à peine sensibles entre les hanches antérieures et les médianes. — Métasternum échancré en arc en avant. — Hanches postérieures très courtes, plus dilatées au côté externe qu'à l'interne. — Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes et normaux; tibias antérieurs et médians tranchants et aplanis, dilatés à leur base; tibias postérieurs avec, sur la tranche externe, un lobe anguleux cilié et situé vers le milieu, mais plus vers la base que vers le sommet, la tranche interne un peu dilatée vers la base; tarses courts, comprimés et subégaux entre eux; crochets bifides. — Le premier et le deuxième segment abdominal soudés, plus longs ensemble que les trois suivants réunis.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce comme de ce genre provient du Belgaum (Bengale).

1. **B. capucina*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. vol. 37, p. 341 (1893) (Bengale).

39. GENUS CISSEICORAEBUS, NOV. GEN.

Caractères. — Tête peu convexe, front déprimé en avant, uni ou bituberculé en arrière; épistome court, échancré en arc en avant; joues armées d'une forte dent aiguë; cavités antennaires assez grandes, arrondies. — Antennes dentées à partir du 4^e article; le 1^{er} allongé et épais; 2 plus long, cylindrique; 3 plus court, obconique; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et muni d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, elliptiques et parallèles. — Pronotum grand, déclive en avant, le disque très convexe, les côtés aplanis avec les bords tranchants et crénelés; la marge antérieure bisinuée avec le lobe médian large et avancé en arc, les angles antérieurs avancés et aigus; les côtés arrondis, dilatés au milieu et droits ensuite avec l'angle postérieur obtus; la base très sinueuse avec un large lobe médian tronqué. — Ecusson grand, triangulaire ou subcordiforme, toujours acuminé au sommet, ses côtés arrondis ou anguleux. — Elytres très convexes, la partie antérieure du disque élevée; ensuite déclives en avant et en arrière suivant un arc régulier; la base sinueuse; le sommet largement tronqué et plus ou moins dentelé. — Marge antérieure du prosternum tronquée ou subarquée, avec une étroite mentonnière; prosternum, large, plan, subanguleux et arrondi au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes et cintrées entre les hanches antérieures et les médianes. — Métasternum anguleusement échancré en avant. — Hanches postérieures à bords presque parallèles au côté interne et au milieu, dilatées au côté externe en avant, le bord antérieur sinueux et le postérieur presque droit. — Pattes peu robustes; fémurs normaux, peu renflés, subfusiformes; tibias grêles, subcylindriques et droits, les postérieurs ciliés sur leur bord externe, avec un léger renflement vers le milieu; tarses courts, subégaux entre eux, les 4 premiers articles comprimés; crochets bifides. — Corps assez épais, écourté, large et tronqué en arrière, très déclive en avant et en arrière, bombé un peu au delà de la région scutellaire.

Distribution géographique des espèces. — Une espèce de ce genre se trouve aux Philippines; une deuxième à Sumatra et la troisième au Gabon. Toutes trois présentent un ensemble de caractères qui permet de les séparer des genres dans lesquels elles étaient primitivement rangées.

1. **C. grandis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. vol. 7, p. 77 (1900) (Ile Samar).

2. *C. retrolatus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg., vol. 8, p. 120, pl. 3, f. 1 (1864) (Sumatra).

3. **C. subcornutus*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. vol. 60, p. 244 (1891) (Gabon).

40. GENUS CISSEOIDES, KERREMANS

Cisseoides. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 118 (1893).

Caractères. — Tête inégale, sillonnée et bituberculée en arrière; épistome court, échancré en avant et séparé du front par une carène plus ou moins sinueuse; joues armées d'une dent obtuse; cavités antennaires assez grandes et arrondies. — Antennes courtes, insérées au repos dans une rainure non prolongée sur l'épisternum prothoracique; dentées à partir du 4^e article; le 1^{er} renflé et recourbé; 2 plus long que 1, subcylindrique; 3 court, obconique; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, elliptiques et subparallèles. — Pronotum grand, convexe sur le disque et aplani sur les côtés avec une carène latérale sinueuse; la marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian avancé et arqué; les côtés dilatés un peu après le milieu avec l'angle antérieur avancé, abaissé et aigu, et le postérieur obtus et arrondi; la base fortement bisinuée avec un large lobe médian tronqué dans son milieu. — Ecusson cordiforme, plus large que haut. — Elytres assez convexes, écourtées, droits sur les côtés jusqu'au tiers postérieur, ensuite obliquement atténués; le sommet séparément arrondi et dentelé. — Marge antérieure du prosternum munie d'une mentonnière courte et arquée, plus ou moins lobée sur les côtés; prosternum large, plan et arrondi en arrière. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes et arquées entre les hanches antérieures et les médianes. — Métasternum largement et profondément échancré en arc en avant. — Hanches postérieures plus dilatées au côté interne qu'à l'externe, celui-ci non avancé sur les côtés antérieurs. — Pattes plus ou moins robustes; fémurs normaux et subfusiformes; tibias antérieurs plus ou moins arqués et trigones, les moyens subcylindriques, les postérieurs ciliés et ondulés sur leur tranche externe, armés sur cette tranche de deux ou trois reliefs anguleux; tarses assez robustes, à articles élargis en avant, le 1^{er} article des postérieurs un peu plus long que le suivant. — Corps écourté, assez convexe et subheptagonal.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre comprend un petit nombre d'espèces propres à l'Australie et à la Nouvelle-Guinée.

1. **C. murina*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 118 (1893) (Australie).
2. *C. marmorata*, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 248 (1872) (Australie).
3. **C. albopicta*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 171 (1898) (Australie).
4. *C. auriceps*, H. Deyrolle, idem, Vol. 8, p. 117 (1864) (Nouvelle-Guinée).
5. **C. aeneipes*, Kerremans, ibidem, Vol. 42, p. 173 (1898) (Australie).
6. **C. cyanura*, Kerremans, ibidem, p. 172 (Australie).
7. **C. modesta*, Kerremans, ibidem, p. 173 (Australie).
8. **C. obesa*, Kerremans, ibidem, Vol. 44, p. 322 (1900) (Nouvelle-Guinée).

41. GENUS AMORPHOSOMA, CASTELNAU

Amorphosoma. Castelnau, Silb. Rev. Ent. Vol. 3, p. 166 (1835); Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 1, pl. 1 (1839); H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 114 (1864).

Caractères. — Tête rugueuse et inégale, fortement bituberculée en arrière, les tubercules parfois fasciculés; épistome échancré en avant au milieu et lobé sur les côtés, les lobes relevés en gouttière; séparé du front par un sillon plus ou moins sinueux; joues armées d'une forte dent, large à la base et aiguë au sommet. — Antennes courtes, leur base insérée dans une rainure non prolongée sur l'épisternum prothoracique, dentées à partir du 4^e article; le 1^{er} allongé, épaissi au bout; 2 plus court et plus large; 3 de la longueur de 2, mais plus grêle; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, elliptiques et parallèles. — Pronotum grand et inégal; le disque convexe à cause de quatre tubercules arrondis, séparés par deux sillons se croisant à angles

droits, ces tubercules accostés de quelques autres, moins nets; la marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian arqué et avancé; les côtés aplanis, avec une courte carène épaisse et arquée; sa marge latérale largement arrondie et crénelée avec l'angle antérieur avancé, abaissé et aigu et le postérieur très obtus; sa base fortement bisinuée avec un large lobe médian avancé et tronqué. — Ecusson grand, triangulaire ou subcordiforme. — Elytres convexes, droits sur les côtés, obliquement atténués au tiers postérieur; le sommet brusquement déclive, spatulé et tronqué avec une armature variable; ils présentent une large côte médiane interrompue vers le sommet et souvent des élévations fasciculées ou glabres, accentuées de chaque côté vers le tiers supérieur. — Marge antérieure du prosternum échancrée en arc, munie d'une mentonnière très courte au milieu, plus ou moins lobée sur les côtés et séparée du prosternum par un sillon plus ou moins net; prosternum large en avant et atténué en arrière, arrondi au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales courtes et arquées entre les hanches postérieures et les médianes. — Métasternum échancré en arc en avant. — Hanches postérieures non dilatées au côté interne et dilatées à l'externe en avant, un peu obliques; leur marge antérieure sinueuse extérieurement et droite ensuite, la postérieure droite. — Pattes peu robustes; fémurs normaux, subfusiformes; tibias antérieurs un peu plus arqués que les médians, les postérieurs ciliés sur leur tranche externe; tarses très courts, leurs articles 1-4 emboîtés l'un dans l'autre et subcomprimés; crochets bifides.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre comprend une vingtaine d'espèces environ, dont cinq seulement me sont connues. Il paraît répandu très inégalement et très pauvrement au Brésil, au Bengale, en Malaisie, au Transvaal et en Tasmanie.

1. *A. penicillatum*, Klug, Ent. Bras. Vol. 2, p. 429, pl. 40, f. 12 (1829) (Brésil).
 2. **A. pyropyga*, nov. sp. (1) (Sumatra).
 3. **A. javanum*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 174 (1898) (Java).
 4. *A. marmoreum*, H. Deyrolle, idem, Vol. 8, p. 127, pl. 4, f. 14 (1864) (Malaisie).
 5. **A. spinipenne*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 15 (1900) (Sumatra).
-
6. *A. apicale*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 49 (1897) (Brésil).
 7. *A. bispinosum*, Wiedemann, Zool. Mag. p. 103 (1823) (Bengale).
 8. *A. dentifer*, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) Vol. 10, p. 331 (1902) (Transvaal).
 9. *A. distans*, Waterhouse, idem, p. 330 (1902) (Transvaal).
 10. *A. diversicolor*, Wallengren, Ent. Tidschr. Vol. 2, p. 16 (1881) (Transvaal).
 11. *A. Gounellei*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 49 (1897) (Brésil).
 12. *A. grisator*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 4, pl. 1, f. 3 (1839) (Inde).
 13. *A. minutum*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 52 (1897) (Brésil).
 14. *A. pectorale*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 210 (1892) (Bengale).
 15. *A. spathatum*, Kerremans, Ann. Mus. Genov. p. 818 (1892) (Birmanie).
 16. *A. subindutum*, Wallengren, Ent. Tidschr. Vol. 2, p. 16 (1881) (Transvaal).
 17. *A. tasmanicum*, Germar, Linn. Ent. Vol. 3, p. 179 (1848) (Tasmanie).
 18. *A. undulatum*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 51 (1897) (Brésil).

42. GENUS AMORPHOSTERNUS, H. DEYROLLE

Amorphosternus. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 114 (1864).

Caractères. — Tête inégale et fasciculée; épistome assez large, échancré en avant suivant un arc peu tendu; joues inermes; cavités antennaires assez grandes, transversales et subtriangulaires; antennes grêles, dentées à partir du 5^e article; le premier épaissi au bout, en massue arquée; 2 court,

(1) Long. 10; larg. 2,7 mm. — Allongé, convexe en dessus, les côtés parallèles, le sommet déclive, spatulé et dentelé, noir en dessus avec l'apex rouge feu brillant. Dessous bleu foncé. — Tête tuberculée, les tubercules à rides concentriques. Pronotum bossué. Elytres évidés largement le long de la suture. Dessous plus brillant que le dessus. — Sumatra.

obconique et épais; 3 allongé, grêle et légèrement renflé au bout, 4 plus court que 3, triangulaire; les suivants dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, assez saillants, elliptiques, un peu obliques et légèrement écartés en arrière. — Pronotum très inégal, fasciculé en avant, le disque présentant un sillon limité par deux tubercules très saillants et parallèles; la marge antérieure bisinuée; les côtés obliques en avant et arrondis en arrière; la marge latérale crénelée; la base fortement bisinuée avec un large lobe médian avancé. — Ecusson petit, triangulaire. — Elytres plans, à côte médiane nette, ornés de fascicules de poils; le calus huméral très saillant; le sommet conjointement arrondi et subacuminé. — Marge antérieure du prosternum tronquée, sans mentonnière distincte; prosternum convexe, brusquement déclive en avant et en arrière, arrondi au sommet. — Mésosternum divisé, ses branches latérales très courtes et arquées. — Métasternum saillant, situé sur un plan plus élevé que celui du prosternum, déclive et échancré en avant. — Hanches postérieures très dilatées au côté externe, moins à l'interne. — Pattes peu robustes; fémurs normaux, subfusiformes; tibias grêles, faiblement arqués, un peu élargis et aplanis à leur extrémité; tarses très courts, leurs articles subégaux entre eux et comprimés; crochets bifides. — Corps oblongo-ovalaire, élargi en avant, couvert en dessus de fascicules et de houppes de poils raides.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre paraît exclusif à l'Amérique du Sud.

1. ***A. Bruchi**, nov. sp. (1) (Tucuman).

2. *A. cucullatus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 272, pl. 45, f. 266 (1841) (Brésil).

43. GENUS HYPOCISSEIS, THOMSON

Hypocisseis. Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 49 (1879).

Maschalix. Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 293 (1887).

Caractères. — Tête large, creusée et sillonnée, avec deux tubercules lisses parfois surmontés, contre les yeux, d'un fascicule de poils jaunes; épistome court, échancré en avant et séparé du front, en arrière, par un sillon transversal; joues armées d'une dent obtuse à la base et aiguë au sommet. — Antennes courtes, insérées au repos, à la base, dans un sillon non prolongé sur l'épisternum prothoracique, dentées à partir du 4^e article; le 1^{er} épais, en massue; 2 allongé, subcylindrique; 3 très court, obconique; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux épais, globulaires, saillants, elliptiques, obliques et écartés en arrière, sur le vertex. — Pronotum en trapèze, plus large que long, inégal, plus ou moins bossué, plus étroit que la base des élytres; la marge antérieure bisinuée; les côtés obliques et subsineux avec une carène latérale sinueuse, la marge irrégulièrement crénelée; la base bisinuée avec un lobe médian avancé et tronqué. — Ecusson grand, triangulaire. — Elytres écourtés, arrondis à l'épaule avec le calus huméral très grand et un autre, mince et allongé entre le premier et l'écusson; les côtés droits jusqu'au delà du milieu, ensuite obliquement atténués en ligne droite jusqu'au sommet; celui-ci finement dentelé. — Marge antérieure du prosternum munie d'une mentonnière courte, échancrée en arc au milieu et lobée de chaque côté; prosternum large, plan; ses côtés parallèles; le sommet arrondi et subanguleux. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes et semi-circulaires, entourant les hanches médianes en avant. — Métasternum échancré en arc en avant. — Hanches postérieures également mais inversement dilatées, en arrière au côté interne et en avant à l'externe. — Pattes peu robustes; fémurs et tibias normaux, les premiers

(1) Long. 10; larg. 3,4 mm. — Oblong, élargi en avant, subacuminé en arrière, d'un noir bleuâtre très brillant en dessus, la tête avec deux fascicules de poils roux doré; le pronotum avec deux fascicules de poils noirs, précédant les reliefs discaux et orné en outre de poils épars, roux doré; les élytres avec des fascicules de poils noirs dont deux, situés contre le bord au tiers postérieur, plus épais et plus grands que les autres, la partie médiane du disque ornée d'un dessin varié de poils roux doré mêlés de quelques poils blancs. Dessous bleu d'acier brillant avec l'abdomen bronzé clair et brillant. — Rép. Argentine: Tucuman (C. Bruch).

subfusiformes, les seconds subcylindriques et grêles, les antérieurs et les médians un peu arqués et les postérieurs droits, ceux-ci ciliés sur leur bord externe; tarses très courts, les articles 1 à 4 subégaux entre eux et comprimés; crochets bifides. — Corps épais, écourté, heptagonal.

Distribution géographique des espèces. — Le type du genre provient de l'Australie; j'y rapporte une seconde espèce de Mysole décrite par H. Deyrolle parmi les *Cisseis*.

1. *H. latipennis*, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 248 (1872) (Queensland).

cornuta, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 457 (1877).

laticornis, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 49 (1879).

2. *H. brachyformis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 117 (1864) (Mysole).

44. GENUS PHLOCTEIS, KERREMANS

Phlocteis. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 118 (1893).

Caractères. — Tête quadrituberculée; épistome court et très étroit entre les cavités antennaires, à peine bisinué en avant et séparé du front, en arrière, par un sillon bisinué; joues à peine dentées; cavités antennaires grandes, subcontiguës, arrondies et surmontées d'une carène saillante et transversale. — Antennes courtes, libres au repos, assez épaisses, dentées à partir du 5^e article; le 1^{er} épais et arqué; 2 plus court, épais, obconique aminci à la base; 3 et 4 triangulaires, épais, légèrement dentés au côté interne, les suivants transversaux, courts, triangulaires, fortement dentés au côté interne et munis fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, elliptiques, allongés, un peu obliques et plus écartés en arrière qu'en avant. — Pronotum inégal, très bossué, tuberculé; sa marge antérieure bisinuée avec un large lobe médian avancé et arqué; les côtés obliques avec l'angle postérieur échancré; la base bisinuée avec un large lobe médian avancé et arqué. — Ecusson grand, en triangle équilatéral. — Elytres larges, plans sur le disque avec une côte médiane; déclives sur les côtés, arrondis à l'épaule, légèrement élargis au tiers supérieur, ensuite obliquement atténués en arc; le sommet conjointement arrondi. — Marge antérieure du prosternum munie d'une mentonnière très courte, faiblement et largement échancré au milieu et lobée de chaque côté; prosternum plan, large en avant et atténué en arrière, son sommet subanguleux. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes et arquées. — Méta sternum anguleusement échancré en avant. — Hanches postérieures non-dilatées au côté interne et sensiblement dilatées en avant à l'externe; la marge antérieure sinueuse, la postérieure horizontale et subsinueuse. — Pattes peu robustes; fémurs normaux, subfusiformes; tibias grêles, un peu aplanis, les postérieurs ciliés sur leur tranche externe avec quelques crêtes irrégulières et espacées; tarses moyens, leurs articles subégaux entre-eux et comprimés; crochets bifides. — Corps plus ou moins allongé, plan en dessus, arrondi en arrière.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre paraît confiné dans l'Afrique équatoriale et méridionale: je ne connais pas les deux espèces malgaches que j'y rapporte d'après les descriptions et les figures et parce qu'elles se rapprochent du type, l'*Amorphosoma exasperata*, Castelnau & Gory.

1. **P. cyaniventris*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 317 (1898) (Mozambique).

2. *P. exasperata*, Schoenherr, Syn. Ins. App. p. 124 (1817) (Caffrerie).

3. **P. quadricornis*, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, p. 100 (1892) (Abyssinie).

4. **P. elongata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 323 (1900) (Kassai).

5. **P. zanzibarica*, nov. sp. (1) (Zanzibar).

6. *P. humeralis*, Waterhouse, Ann. Nat. Hist. (5) Vol. 19, p. 293 (1887) (Madagascar).

7. *P. lumbaris*, Klug, Ins. Madag. p. 62, pl. 2, f. 12 (1833) (Madagascar).

(1) Long. 10,5; 3 mm. — Oblong, allongé; tête et pronotum bronzé obscur; élytres noir velouté avec des dessins flexueux à fond bronzé et couverts d'une villosité grisâtre. Dessous noir bleuâtre et couvert d'une courte villosité grise. — Assez voisin, pour le faciès, du *P. elongata* Kerremans, du Kassai, mais plus petit et plus bronzé en dessus, les reliefs du pronotum autrement disposés, les côtés moins anguleux vers la base, le dessin élytral plus clair; les côtés du deuxième segment abdominal sans large tache villose et rousse, l'écusson plus petit. — Zanzibar.

45. GENUS ANADORA, KERREMANS

Anadora, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 319 (1898).

Caractères. — Tête étroite et inégale, ornée de six fascicules de poils fauves; épistome très court, faiblement bisinué en avant, très rétréci en arrière par les cavités antennaires; joues inermes; cavités antennaires grandes et arrondies, presque contiguës. — Antennes libres et courtes, dentées à partir du 5^e article; le 1^{er} allongé, épais et renflé au bout; 2 épais, plus court que 1, rétréci en avant et en arrière; 3 plus mince, globulaire; 4 un plus long que 2, obconique; les suivants larges, triangulaires, dentés aux côtés interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux épais, globulaires, elliptiques mais peu allongés, plus écartés en arrière qu'en avant. — Pronotum inégal et bossué, très rétréci en avant et très élargi en arrière, couvert de fascicules de poils frisés, surtout sur les côtés; la marge antérieure presque droite; les côtés sinueux et très obliques; le base fortement bisinuée, non échancrée mais droite sur les côtés, le milieu formant un large lobe médian très avancé. — Ecusson assez grand, en triangle un peu plus long que large, faiblement échancré en arc à la base. — Elytres allongés, subplans, légèrement évidés entre la suture et une côte médiane naissant à la base où elle s'incurve le long de la partie interne d'un calus huméral très prononcé, pour aboutir vers le sommet; celui-ci largement et obliquement tronqué, souvent avec des fascicules de poils. — Marge antérieure du prosternum formant une large mentonnière avancée et faiblement bisinuée; prosternum large et plan, son sommet largement anguleux. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes et contournant, en avant, les hanches médianes. — Métasternum largement et subanguleusement échancré. — Hanches postérieures plus distinctement dilatées au côté externe en avant qu'à l'interne en arrière. — Pattes peu robustes; fémurs normaux, subfusiformes; tibias antérieurs et médians normaux, subcylindriques, aplanis et droits, les postérieurs ciliés par touffes distantes l'une de l'autre sur leur tranche externe; tarses courts, leurs articles 1-4 comprimés et subégaux entre eux; crochets bifides. — Corps allongé, plan en dessus, plus atténué en avant qu'en arrière.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre paraît exclusif à la faune africaine et à Madagascar. Je n'en connais que deux espèces.

1. *A. Mechovi*, Quedenfeldt, Berl. Ent. Zeit. Vol. 3, p. 22, pl. 1, f. 12 (1886) (Congo).
2. **A. hova*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 277 (1899) (Madagascar).

46. GENUS CYPHOTHORAX, WATERHOUSE

Cyphothorax, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 180 (1887); Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 49 (1889).

Caractères. — « Intermédiaire entre *Stenogaster* et *Agrilus*. Tête assez convexe, profondément » canaliculée entre les yeux. Pronotum transversal, rétréci en avant au milieu, le milieu du disque avec » une tumeur saillante. Ecusson en triangle subéquilatéral. Elytres subplans et subparallèles, oblique- » ment atténués au tiers postérieur; irrégulièrement ponctués, avec des stries à peine distinctes. Tarses » médiocrement écourtés, l'article basilaire des postérieurs presque aussi long que les deux suivants » réunis; le deuxième et le troisième article sans lamelle distincte, mais avec un fascicule de poils; le » quatrième article avec une lamelle comme chez les *Stenogaster*. »

Distribution géographique de l'espèce. — Ce genre ne comprend qu'une seule espèce, qui m'est inconnue; elle provient du Mexique.

1. *C. palloolatus*, Chevrolat, Col. Mex. Cent. 2, p. 134 (1835) (Mexique).
gibber, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 205, pl. 34, f. 196 (1841).

47. GENUS STENOGASTER, SOLIER

Stenogaster. Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 305, pl. 12, f. 26 (1838); Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 1, pl. 1 (1839); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 82 (1857); H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 114 (1864).

Caractères. — Tête inégale et tuberculée; épistome court, échancré en arc en avant; joues dentées; cavités antennaires médiocres et situées contre le bord interne des yeux. — Antennes assez courtes et assez robustes, dentées à partir du 5^e article: le 1^{er} épais mais allongé; 2, 3 et 4 obconiques, subégaux entre eux; les suivants triangulaires, transversaux, dentés en scie aiguë et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, ovales, peu saillants et très légèrement écartés en arrière, sur le vertex. — Pronotum court, bossué et inégal en dessus; la marge antérieure à peine sinueuse; les côtés obliques jusque vers la base; celle-ci anguleusement bisinuée avec un large lobe médian tronqué. — Ecusson assez grand, subpentagonal et acuminé en arrière. — Elytres allongés, plans sur le disque, rétrécis en ligne droite de la base au sommet, présentant un large côté longitudinale, médiane et sinueuse à la base; celle-ci insérée dans le sinus de la base du pronotum. — Prosternum large et plan, tronqué en avant, atténué et arrondi au sommet, sans mentonnière distincte. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes et contournant, en avant, les hanches médianes. — Métasternum assez convexe, largement et profondément échancré en avant, l'échancrure un peu anguleuse. — Hanches postérieures dilatées au côté interne en arrière et très dilatées à l'externe, en avant. — Pattes assez longues et peu robustes; fémurs normaux, subfusiformes et peu renflés; tibias grêles et normaux, les postérieurs finement ciliés sur leur tranche externe; tarses grêles et comprimés, leur 4^e article seul muni d'une longue lamelle; crochets bifides. — Corps allongé, déprimé et cunéiforme.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre ne comprend qu'un petit nombre d'espèces de l'Amérique du Sud. Il s'étend, au nord, jusqu'au Mexique. On y fait figurer une espèce du Sénégal qui m'est inconnue, mais je doute qu'elle appartienne à ce genre.

1. *S. juvenicus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 202, pl. 33, f. 193 (1841) (Brésil).
 2. *S. linearis*, Linné, Syst. Nat. (ed. 10), Vol. 1, p. 410 (1758) (Colombie; Guyanes).
atomarius, Fabricius, Ent. Syst. Vol. 1, p. 212 (1794).
fasciatus, Voet, Cat. Col. Vol. 1, p. 96, pl. 51, f. 24 (1806).
 3. *S. costifer*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 48, pl. 4, f. 2 (1887) (Mexique).
 4. *S. nubilus*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 104 (1837) (Colombie).
badius, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 3, pl. 1, f. 2 (1839).
 5. **S. diffusus*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 87 (1837) (Brésil).
 6. *S. globithorax*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 201, pl. 33, f. 192 (1841) (Vénézuéla, Guyanes).
 7. *S. fossulatus*, Chevrolat, Col. Mex. Cent. 2, p. 192 (1835) (Mexique).
 8. *S. irroratus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 3, pl. 1, f. 3 (1839) (Brésil).
 9. *S. Lebasi*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 203, pl. 33, f. 194 (1841) (Vénézuéla).
-
10. *S. marmoreus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 48 (1877) (Bahia).
 11. *S. morosus*, Chevrolat, Col. Mex. Cent. 2, p. 135 (1835) (Mexique).
 12. *S. planus*, Fabricius, Ent. Syst. Suppl. p. 137 (1798) (Sénégal).
 13. *S. tenuis*, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 347 (1873) (Pérou).

48. GENUS TRYPANTIUS, WATERHOUSE

Trypantius. Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 179 (1887).

Trypanidius. Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 186 (1889).

Caractères. — Tête creusée; front avec un étroit sillon net et profond; épistome largement et peu profondément échancré en arc; joues dentées; cavités antennaires grandes et arrondies. — Antennes courtes mais assez robustes, dentées à partir du 5^e article; 1 et 2 épais, renflés au bout, 1 plus long que 2 et incurvé; 3 et 4 plus courts, obconiques et subégaux entre eux; les suivants triangulaires, transversaux, aigus et dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux épais et saillants, ovalaires, cintrés au côté interne et parallèles. — Pronotum un peu plus large que haut, sillonné au milieu, déprimé sur les côtés; la marge antérieure bisinuée avec un lobe médian subanguleux; les côtés plus ou moins arqués, parfois anguleux en avant et en arrière; la base bisinuée avec un lobe médian large, avancé et tronqué au milieu. — Ecusson variable, triangulaire ou subpentagonal, plus large que long et acuminé au sommet. — Elytres plans, allongés, atténués en lignes droite d'avant en arrière, avec une large côte médiane interrompue en avant et en arrière. — Prosternum plan, arrondi et un peu rétréci en arrière; sa marge antérieure sans mentonnière. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes et incurvées en avant autour des hanches médianes. — Mésternum largement et anguleusement échancré en avant. — Hanches postérieures plus dilatées au côté interne en avant qu'à l'externe en arrière. — Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes, finement crénelés sur leur tranche externe; tibias grêles et normaux, les postérieurs ciliés sur leur tranche externe mais non crénelés; tarses normaux, à articles 2, 3 et 4 lamellés en dessous, le premier article des postérieurs plus long que les deux suivants réunis; crochets bifides. — Corps allongé, subcunéiforme; faciès des *Stenogaster*.

Je crois pouvoir maintenir ce genre pour le *Stenog. bitaeniatus* Chevrolat, qui présente le faciès des *Stenogaster*, mais avec les articles intermédiaires des tarses lamellés. Le front présente, du reste, une allure différente, les antennes sont autres, les tibias moins arqués, etc. Je ne connais pas le *Tryp. infrequens* Waterhouse, mais je doute que son *Tryp. Flohri* puisse rester dans ce genre. J'en possède un exemplaire comparé au type et d'un faciès entièrement différent du *bitaeniatus*; le front et le pronotum ont une autre allure, l'écusson est différent quant à la forme, les élytres sont moins droits sur les côtés, enfin, les tibias postérieurs sont fortement et irrégulièrement crénelés, comme on le remarque chez beaucoup d'*Agrilus* s. s. Je laisserai donc le *Flohri* parmi les espèces de ce dernier genre.

Distribution géographique des espèces. — Les deux espèces actuellement connues de ce genre proviennent du Mexique.

1. **T. bitaeniatus*, Chevrolat, Col. Mex. Cent. 2, p. 136 (1835) (Mexique).

pulverosus, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 204, pl. 34, f. 195 (1841).

2. *T. infrequens*, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 179 (1887) (Mexique).

49. GENUS MYCHOMMATUS, MURRAY

Mychommatus. Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), Vol. 2, p. 110 (1868).

Caractères. — Tête convexe, sillonnée au milieu et bituberculée entre les yeux; épistome très court, largement échancré en arc en avant, joues inermes; cavités antennaires médiocres, prolongées en avant, entre les côtés de l'épistome et ceux des yeux, suivant un sillon destiné à insérer la base des antennes au repos. — Antennes courtes, dentées à partir du 4^e article; le 1^{er} plus épais que les deux suivants, mais de même longueur que 2; 2 et 3 subégaux, obconiques; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, ovalaires, rétrécis et écartés en arrière sur le vertex, cintrés sur leur bord interne. — Pronotum uni; sa marge antérieure faiblement bisinuée; ses côtés à peine obliques et faiblement arqués; sa base bisinuée avec un lobe médian avancé et échancré au milieu. — Ecusson grand, subcordiforme, plus large que long. — Elytres

allongés, plus étroits que le premier et le deuxième segment abdominal qui débordent les côtés; très légèrement convexes, régulièrement atténués en ligne droite ou à peine courbés d'avant en arrière, le sommet largement arrondi, subtronqué et irrégulièrement dentelé. — Marge antérieure du prosternum munie d'une mentonnière grande et avancée, située sur un plan oblique par rapport au prosternum; celui-ci plan, élargi en avant et atténué en arrière, son sommet arrondi. — Mésosternum divisé; ses branches latérales à peine visibles autour de la région antérieure des hanches médianes. — Métasternum profondément échancré en arc en avant. — Hanches postérieures très étroites au milieu et au côté interne, très dilatées en avant à l'externe; leur marge antérieure très sinueuse, la postérieure un peu cintrée en arrière. — Pattes peu robustes; fémurs fusiformes, légèrement arqués au coude, dentés en scie, surtout les antérieurs, sur la tranche interne; tibias postérieurs et médians un peu arqués et subcylindriques, les postérieurs ciliés et irrégulièrement crénelés sur leur tranche externe; tarses comprimés et normaux, le premier article des postérieurs un peu plus long que les deux suivants réunis; crochets bifides. — Corps allongé, subcunéiforme et peu convexe.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce connue de ce genre habite l'Afrique centrale occidentale et plus spécialement le Gabon.

1. *M. violaceus*, Fabricius, Mant. Ins. Vol. 1, p. 178 (1787) (Gabon).

cyaneus, Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 2, p. 110, pl. 8, f. 3 (1868).

50. GENUS AUTARCHONTES, WATERHOUSE

Autarchontes. Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 180; Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 49 (1889).

Caractères. — Tête inégale; front bossué, le milieu sillonné et déprimé; épistome court, échancré ou bisinué en avant, séparé du front, en arrière, par une carène sinueuse interrompue au milieu; joues armées d'une dent obtuse; cavités antennaires grandes et arrondies. — Antennes courtes, dentées à partir du 4^e article; le 1^{er} épais; 2 et 3 de la même longueur mais plus grêles que 1 et obconiques; les suivants dentés au côté interne, triangulaires et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, elliptiques, assez saillants, subparallèles et à peine écartés en arrière sur le vertex. — Pronotum transversal, très inégal et bossué; la marge antérieure faiblement bisinuée; les côtés un peu obliques avec une saillie anguleuse vers la base; celle-ci bisinuée avec un large lobe médian tronqué. — Ecusson triangulaire ou subcordiforme; dans ce cas tronqué en avant, plus large que long, bisinué et acuminé au sommet; sinon en triangle allongé et très acuminé en arrière. — Elytres plus ou moins convexes et plus ou moins droits sur les côtés, arrondis ou tronqués au sommet, avec, sur le disque, une côte médiane interrompue en arrière. — Marge antérieure du prosternum munie d'une mentonnière avancée, assez grande et plus ou moins sinueuse; prosternum large, plan, atténué et cintré entre les hanches antérieures, un peu dilaté et subanguleux au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes, refoulées autour de la région supérieure des hanches médianes. — Métasternum largement et subanguleusement échancré en avant. — Hanches postérieures très courtes; leur côté interne peu, l'externe sensiblement dilaté et remontant en avant. — Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes, leur marge interne finement crénelée, surtout celle des antérieurs; tibias grêles, les postérieurs ciliés sur leur marge externe; tarses assez allongés, le 1^{er} article des postérieurs au moins aussi long que les trois suivants réunis. — Corps oblong-ovalaire ou cunéiforme.

Distribution géographique des espèces. — Les quatre espèces connues de ce genre habitent l'Amérique du Sud et le Nicaragua.

1. *A. mucoreus*, Klug, Ent. Bras. Vol. 2, p. 428, pl. 40, f. 10 (1827) (Brésil).

2. *A. pictiventris*, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 181 (1887) (Goyaz).

* *costipennis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 341 (1899).

3. *A. abdominalis*, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 182 (1887) (Nicaragua).

4. *A. planus*, Waterhouse, idem, p. 181 (Amazonie).

51. GENUS OMOCHYSEUS, WATERHOUSE

Omochyseus. Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 182 (1887); Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 50 (1889).

Caractères. — Tête inégale, sillonnée longitudinalement et transversalement entre des tubercules épais; épistome assez allongé, séparé du front par une carène sinueuse, échancré en arc en avant entre deux lobes arqués; joues inermes; cavités antennaires grandes et arrondies. — Antennes (1)... — Yeux assez grands, cintrés au côté interne, subparallèles et très légèrement écartés en arrière sur le vertex. — Pronotum déclive en avant, inégal, largement impressionné au milieu, ses côtés inégaux et bossués; la marge antérieure bisinuée avec un lobe médian avancé et subanguleux; la base bisinuée avec un large lobe médian sinué. — Ecusson grand, triangulaire, plus long que large et très acuminé en arrière. — Elytres gibbeux en avant, déclives ensuite, brusquement inclinés au sommet, celui-ci élargi et spatulé, les épaules saillantes, le calus huméral surmonté d'une côte incurvée qui se prolonge en ligne droite jusque près du sommet. — Marge antérieure du prosternum munie d'une mentonnière sinueuse avec une faible échancrure médiane; prosternum plan, atténué et subanguleux en arrière. — Mésosternum divisé, ses branches latérales à peine distinctes en avant des hanches médianes. — Métasternum échancré en arc en avant. — Hanches postérieures très courtes, plus dilatés au côté antérieur externe qu'au postérieur interne. — Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes, finement dentelés au côté interne et un peu échancrés, sur ce côté, au sommet; tibias antérieurs et médians grêles, subcylindriques et arqués, les postérieurs droits, ciliés et à peine crénelés sur leur tranche externe; tarses médiocres et comprimés, le premier article des postérieurs plus long que les trois suivants réunis. — Corps convexe en dessus, spatulé et incliné en arrière.

Distribution géographique des espèces. — Deux espèces, de l'Amérique intertropicale.

1. *O. omocyrius*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 58 (1879) (Colombie).

humeralis, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 182 (1887).

2. *O. terminalis*, Waterhouse, idem, p. 182 (Mexique).

52. GENUS ENGYAULUS, WATERHOUSE

Engyaulus. Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 50, pl. 4, f. 9 a-b (1889).

Caractères. — Tête assez forte; front proéminent et régulièrement arqué, sillonné longitudinalement; épistome largement et anguleusement échancré, ses côtés formant un lobe anguleux et avancé; joues armées d'une courte dent obtuse; cavités antennaires petites, arrondies, entièrement closes et rapprochées l'une de l'autre. — Antennes assez robustes à article 1 épais; 2 et 3 courts, globulaires et épais, obconiques; les suivants très élargis, obtusément dentées à partir du 4^e article et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, ovalaires, subparallèles. — Pronotum carré, impressionné sur les côtés et au milieu, l'impression médiane formée par deux vagues fossettes superposées,

(1) Les antennes manquent à l'unique exemplaire que je possède de ce genre.

la marge antérieure et la base faiblement bisinuées; les côtés légèrement arqués. — Ecusson médiocre, un peu plus large que long, triangulaire. — Elytres allongés, oblongs, légèrement convexes, subsinueux à la base et séparément arrondis au sommet. — Marge antérieure du prosternum munie d'une courte mentonnière droite; prosternum uni, cintré et subatténué en arrière. — Mésosternum divisé; ses branches latérales à peine visibles autour de la région antérieure des hanches médianes. — Métasternum un peu convexe, faiblement échancré en avant. — Hanches postérieures à peine dilatées au côté interne et très dilatées en avant à l'externe; leur marge antérieure sinueuse et la postérieure cintrée en dedans. — Pattes peu robustes; fémurs antérieurs finement denticulés sur leur tranche interne; tibias normaux; tarses comprimés, le premier article des postérieurs plus long que les deux suivants réunis; crochets bifides. — Soudure du premier et du deuxième segment abdominal distincte. — Corps oblong allongé; ses côtés parallèles.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre ne comprend que deux espèces, propres à l'Amérique du Nord.

1. *E. pulchellus*, Bland., Proc. Ent. Soc. Philad. Vol. 4, p. 382 (1865) (Colorado).

2. *E. rubrovittatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 50 (1889) (Mexique).

53. GENUS PARADOMORPHUS, WATERHOUSE

Paradomorphus. Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 183 (1887); Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 51 (1889).

Caractères. — Tête plus ou moins tuberculée; front sillonné, surtout en arrière; épistome profondément échancré en avant; joues armées d'une courte dent aiguë; cavités antennaires grandes, elliptiques et obliques. — Antennes médiocres, dentées à partir du 4^e article; le 1^{er} allongé, en massue arquée; 2 plus court et plus mince, droit et obconique; 3 plus court que 2, obconique; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands oblongs, légèrement plus écartés en arrière qu'en avant, leur bord interne un peu cintré en dedans. — Pronotum plus ou moins inégal; bisinué en avant avec un lobe médian avancé et arrondi; les côtés plus ou moins sinueux et arqués; la base fortement bisinuée avec un large lobe médian avancé et arrondi. — Ecusson large, tronqué en avant et caréné transversalement; son sommet acuminé. — Elytres allongés, lobés à la base; le calus huméral saillant, le sommet arrondi ou subacuminé. — Marge antérieure du prosternum avec une courte mentonnière; prosternum large en avant, rétréci en arrière et acuminé au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales courtes et peu visibles autour de la moitié antérieure des hanches médianes. — Métasternum faiblement échancré en avant. — Hanches postérieures très courtes, à peine dilatées au côté interne et très dilatées en avant à l'externe. — Pattes peu robustes; fémurs fusiformes, les antérieurs et les médians dentelés sur leur tranche interne; tibias antérieurs et médians plus arqués que les postérieurs, ceux-ci simples; tarses à articles grêles et comprimés, le premier des postérieurs sensiblement plus court que chez les *Agrilus* s. s. — Premier et deuxième segments abdominaux soudés, les traces de la soudure à peine distinctes. — Corps oblong, allongé et un peu atténué en arrière.

M. Waterhouse a fondé ce genre pour une série d'*Agrilus* ayant le premier article des tarses postérieurs sensiblement plus court que chez les autres espèces de ce dernier genre. Je ne vois, dans la longue série d'*Agrilus* que je possède, que deux espèces pouvant entrer parmi les *Paradomorphus*. Toutes deux ont les fémurs antérieurs et les médians dentelés ou plutôt finement crénelés sur leur tranche interne, caractère que je ne retrouve chez aucun des autres *Agrilus* que j'ai pu examiner. Je crois donc que ce genre peut être maintenu.

Distribution géographique des espèces. — On connaît dix sept espèces de ce genre; parmi celles-ci, une habite les Antilles (Jamaïque), cinq l'Amérique centrale, dix le Mexique et une l'Amérique du Sud (Guyane). C'est donc actuellement un genre exclusif à la faune Centrale Américaine.

1. *P. frontalis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Agrilus*, p. 26, pl. 6, f. 31 (1839) (Cayenne).
 2. *P. persimilis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 56 (Mexique).
-
3. *P. albicollis*, Waterhouse, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 184 (1887) (Jamaïque).
 4. *P. biplagiatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 55 (1889) (Mexique).
 5. *P. carissimus*, Waterhouse, idem, p. 187, pl. 9, f. 16 (Mexique).
 6. *P. collaris*, Waterhouse, ibidem, p. 52 (Mexique).
 7. *P. complexus*, Waterhouse, ibidem, p. 56 (Nicaragua).
 8. *P. corrugatus*, Waterhouse, ibidem, p. 56 (Mexique).
 9. *P. elegantulus*, Waterhouse, ibidem, p. 53 (Panama).
 10. *P. emarginatus*, Waterhouse, ibidem, p. 53 (Panama).
 11. *P. Flohri*, Waterhouse, ibidem, p. 664 (1897) (Mexique).
 12. *P. gibbifrons*, Waterhouse, ibidem, p. 187, pl. 9, f. 20 (1889) (Mexique).
 13. *P. latevittatus*, Waterhouse, ibidem, p. 54 (Panama).
 14. *P. obscureguttatus*, Waterhouse, ibidem, p. 51, pl. 4, f. 7 (Panama).
 15. *P. plagiatus*, Waterhouse, ibidem, p. 55 (Mexique).
 16. *P. ruginosus*, Waterhouse, ibidem, p. 52 (Mexique).
 17. *P. vermiculatus*, Waterhouse, ibidem, p. 51, pl. 4, f. 8 (Mexique).

54. GENUS AGRILOIDES, NOV. GEN.

Caractères. — Tête inégale, quadrituberculée; front sillonné longitudinalement et transversalement; épistome échancré en arc entre deux lobes arrondis, séparé du front par une carène droite; joues inermes; cavités antennaires grandes, subtriangulaires. — Antennes courtes, dentées à partir du 4^e article; le 1^{er} épais, en massue arquée; 2 et 3 plus courts, obconiques et subégaux entre eux, les suivants épais, subtriangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, oblongs et subparallèles. — Pronotum inégal, bossué, impressionné et tuberculé; la marge antérieure avec un large lobe médian et arqué; les côtés arqués avec l'angle postérieur obtus et la marge latérale crénelée; la base bisinuée avec un lobe médian tronqué. — Ecusson très large, subcordiforme, acuminé en arrière. — Elytres convexes, déclives en arrière, toujours plus étroites que la région dorsale et laissant à découvert la partie supérieure du sternum et des segments abdominaux; le calus huméral saillant et prolongé suivant une côte médiane; le sommet variable mais toujours dentelé. — Marge antérieure du prosternum munie d'une mentonnière assez forte et bisinuée; prosternum large, plan, élargi en avant, rétréci et arrondi en arrière. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes et entourant la région antérieure des hanches médianes. — Mésternum faiblement échancré en avant. — Hanches postérieures très courtes, à peine dilatées au côté interne, très dilatées en avant à l'externe. — Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes et dentelés au côté interne; tibias grêles et normaux, les postérieurs ciliés sur leur tranche externe; tarses assez allongés et comprimés, le 1^{er} article des postérieurs aussi long ou presque aussi long que les trois suivants réunis. — Abdomen assez épais, parfois très dilaté en dehors, le premier et le deuxième segment soudés.

Corps allongé, légèrement convexe en dessus, atténué en avant et en arrière, légèrement ou plus sensiblement élargi au tiers supérieur.

Je crois pouvoir distraire du genre *Agrilus* les *A. hydropticus* et *tuberculatus*, de Klug, qui présentent, outre leur faciès propre, quelques caractères qui ne se retrouvent pas chez les vrais *Agrilus* et j'y joins

trois espèces que j'avais provisoirement placées parmi ceux-ci et une autre dans laquelle j'avais cru reconnaître un *Amorphosoma*.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre comprend six espèces provenant toutes du Brésil.

1. *A. hydropica*, Klug, Ent. Bras. p. 10, pl. 40, f. 11 (1827) (Brésil).
2. **A. gibbifrons*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 339 (1899) (Brésil).
3. **A. jucunda*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 50 (1897) (Amazones).
4. **A. errata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 325 (1900) (Goyaz).
5. *A. tuberculata*, Klug, Ent. Bras. p. 9, pl. 10, f. 10 (1827) (Brésil).
6. **A. velutina*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 324 (1900) (Brésil).

55. GENUS DIPOLOPHOTUS, ABEILLE

Dipolophotus. Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 1 (1897).

Caractères. — Tête inégale; front sillonné dans toute sa longueur; épistome échancré en arc entre deux lobes subanguleux; joues inermes; cavités antennaires médiocres, allongées et obliques. — Antennes courtes, dentées à partir du 3^e article; le 1^{er} court, épais et subcylindrique; 2 plus allongé et plus grêle que 1; 3 plus court, obconique; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, ovalaires, un peu obliques et légèrement rapprochés en arrière sur le vertex. — Pronotum plus large que long, aussi large en avant qu'en arrière, dilaté sur les côtés; la marge antérieure à peine bisinuée; les côtés arqués en avant et sinueux en arrière avec l'angle postérieur petit, aigu et légèrement saillant en dehors. — Ecusson large, tronqué à la base et incliné en avant d'une carène médiane; bisiné en arrière et acuminé au milieu. — Elytres lobés à la base, sinueux aux hanches, élargis au tiers postérieur et brusquement atténués ensuite jusqu'au sommet. — Marge entérieure du prosternum munie d'une mentonnière grande, avancée et arquée en avant; prosternum plan et large, atténué et arrondi en arrière. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes et visibles seulement contre la partie antérieure des hanches médianes. — Métasternum largement et faiblement échancré en avant. — Hanches postérieures à peine dilatées au côté interne et très dilatées en avant à l'externe. — Pattes peu robustes; fémurs fusiformes, creusés sur leur tranche interne pour l'insertion d'une partie des tibias; ceux-ci normaux, les postérieurs ciliés et très faiblement lobés sur leur tranche externe; tarses assez allongés, leurs articles comprimés, le premier des postérieurs presque aussi long que les trois suivants réunis; crochets bifides. — Milieu du premier et du deuxième segment abdominal sillonné. — Corps épais, assez écourté, élargi au tiers postérieur et acuminé au sommet.

M. Abeille de Perrin a fort judicieusement séparé ce genre des *Agrilus* proprement dits, à cause de la présence d'un sillon au milieu de la région antérieure de l'abdomen, caractère qui ne se retrouve que chez trois espèces de la région africaine et qui, toutes trois ont un faciès commun très caractéristique.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre, dont je ne connais que trois espèces, paraît habiter exclusivement l'Afrique et Madagascar.

1. *D. desertus*, Klug, Symb. Phys. Vol. 1, p. 14, pl. 1, f. 14 (1829) (Arabie, Obock, Djibouti).
 * *desertus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 443 (1865).
 * *nubeculosus*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. 10, p. 543 (1890).
 Martini, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 1 (1897).
2. *D. variegatus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Agrilus*, p. 33, pl. 8, f. 43 (1839) (Sénégal).
3. **D. Perrieri*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 71, p. 349 (1902) (Madagascar).

56. GENUS AGRILUS, STEPHENS

Agrilus. Stephens, Illustr. Brit. Ent. Vol. 3, p. 239 (1830); Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 300 (1833); Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, pl. 1, f. 1 (1839); Redtenbacher, Faun. Austr. p. 284 (1848); Kiesenwetter, Ins. Deutschl. Vol. 4, p. 119 (1857); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 83 (1857); Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 431 (1865); H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 116 (1864).

Caractères. — Tête verticale, variable, sillonnée ou plane, tuberculée ou simplement convexe en arrière; épistome échancré en avant; joues inermes ou obtusément dentées; cavités antennaires assez grandes et subcontiguës. — Antennes variables, le plus souvent courtes, dentées à partir du 4^e article, le 1^{er} assez allongé et épais; 2 court, globulaire; 3 obconique, moins épais; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux grands, ovalaires, écartés ou rapprochés en arrière, leur bord interne cintré en avant ou en arrière. — Pronotum plus large que long, assez convexe, largement échancré ou bisinué en avant; les côtés plus ou moins arqués et bordés de carènes souvent soudées par derrière, l'angle postérieur souvent caréné; la base bisinuée avec un large lobe médian plus ou moins tronqué, arrondi ou échancré; le disque sillonné ou impressionné; les côtés souvent déprimés. — Ecusson large, caréné transversalement, le plus souvent divisé, par cette carène, en deux portions dont l'antérieure forme un parallélogramme très large et peu élevé, situé sur un plan incliné et oblique par rapport à la portion inférieure qui est bisinuée avec une saillie médiane et aiguë. — Elytres allongés, sinués à la base; le calus huméral saillant; les côtés sinueux et laissant souvent à découvert une portion latérale de la région supérieure du sternum et des deux premiers segments abdominaux; le sommet très variable mais toujours atténué, mucroné, bifide, unidenté ou dentelé. — Marge antérieure du prosternum munie d'une mentonnière séparée de celui ci par un pli transversal, rabattue, large et plus ou moins grande; prosternum large, saillant entre les hanches et arrondi au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes et refoulées autour de la région antérieure des hanches médianes. — Métasternum échancré en arc en avant. — Hanches postérieures dilatées au côté inférieur interne et à l'antérieur externe. — Pattes grêles; fémurs fusiformes, souvent plus renflés chez le ♂ que chez la ♀; tibias grêles et subcylindriques, les postérieurs souvent ciliés ou lobés; tarses longs et grêles, le 1^{er} article des postérieurs aussi long ou plus long que les trois suivants réunis; crochets bifides ou dentés. — Corps allongé, peu convexe, épaissi au tiers postérieur, acuminé ou atténué au sommet.

Après avoir distrait des *Agrilus* s. s. toute une série d'espèces qui rentrent dans les genres qui précèdent et dans ceux qui suivent, il reste plus d'un millier d'espèces à grouper, suivant les caractères énoncés ci-dessus. Le faciès de celles-ci est extrêmement variable et nécessitera par la suite la création de nouveaux genres ou tout au moins, de sections qu'il serait difficile et prématuré d'établir maintenant.

La diffusion des types et des éléments de comparaison rendra la tâche très ardue au monographe qui serait tenté d'entreprendre une étude détaillée des *Agrilus*. Je ne pourrais, pour le moment, que grouper géographiquement les espèces qui me sont connues en nature et imiter M. Edw. Saunders, d'après son *Catalogue* de 1871, en rangeant mes *Agrilus* en différentes sections Américaine, Européenne, etc.

Distribution géographique du genre. — Il est répandu sur toute la surface du globe, mais, comme chez tous les Buprestides, plus étendu dans les régions chaudes que dans les tempérées.

SPECIES AMERICANÆ

1. **A. decemnotatus*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 91 (1837) (Brésil).
2. *A. xantholomus*, Dalman, Anal. Ent. p. 55 (1823) (Brésil).
albivittis, Germar, Nov. Spec. Ins. p. 39 (1824).
Helwigi, Klug, Ent. Bras. p. 6, pl. 40, f. 5 (1827).

3. **A. furcillatus*, Chevrolat, Col. Mex. fasc. 3, n° 50 (1835) (Mexique).
4. **A. sulcatus*, Chevrolat, idem, fasc. 6, n° 139 (1835) (Mexique).
5. **A. postulator*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 60 (1897) (São Paulo).
6. *A. posticalis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 6, pl. 1, f. 5 (1839) (Brésil).
7. *A. caudalis*, Castelnau & Gory, idem, p. 8, pl. 2, f. 7 (1839) (Brésil).
8. *A. productus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 208, pl. 34, f. 198 (1841) (Brésil).
9. **A. carus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 57 (1897) (Amazones).
10. *A. pyrosurus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 7, pl. 1, f. 6 (1839) (Brésil).
pyrotygus, Thomson, Typ. Bupr. p. 84 (1878).
11. **A. guttifer*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 327 (1900) (Goyaz).
12. **A. hirundo*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 85 (1835) (Brésil).
 * *pisciformis*, Chevrolat, idem, p. 86.
productus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 9, pl. 2, f. 11 (1839).
13. **A. lautus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 341 (1899) (Goyaz).
14. **A. hieroglyphicus*, Kerremans, idem, p. 342 (Goyaz).
15. **A. canaliculicollis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 58 (1897) (Brésil).
16. **A. subobtus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 415 (1894) (Mexique).
17. **A. bifoecicollis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 55 (1897) (Brésil).
18. **A. gilvopictus*, Kerremans, idem, p. 56 (Bahia).
19. ***A. tucumanus**, nov. sp. (1) (Tucuman).
20. **A. depressifrons*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 326 (1900) (Goyaz).
21. **A. ostentator*, Kerremans, idem, p. 328 (Goyaz).
22. *A. pisinoe*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 209, pl. 34, f. 199 (1841) (Colombie, Brésil).
23. *A. furcatipennis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 9, pl. 2, f. 8 (1839) (Brésil).
24. *A. squaliformis*, Thomson, Typ. Bupr. p. 85 (1878) (Guatemala).
25. *A. chlorocephalus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 73, pl. 4, f. 17 (1889) (Mexique).
26. **A. quietus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 71 (1897) (Brésil).
27. **A. nobilitatus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 343 (1899) (Goyaz).
28. **A. gaudens*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 72 (1897) (Brésil).
29. *A. siren*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 211, pl. 35, f. 201 (1841) (Colombie).
30. **A. Oberthuri*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 66 (1897) (Ega).
31. *A. immaculicollis*, Thomson, Typ. Bupr. p. 85 (1878) (Brésil).
32. *A. chrysostictus*, Klug, Ent. Bras. p. 7, pl. 40, f. 6 (1827) (Colombie, Goyaz, Buenos-Ayres).
argutus, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 109 (1837).
33. ***A. saltensis**, nov. sp. (2) (Salta).
34. *A. angustus*, Dejean, Cat. Ed. 3, p. 93 (1838) (Brésil).
spiniger || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 10, pl. 2, f. 10 (1839) (Brésil).
35. **A. dichrous*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 64 (1897) (Brésil).
36. *A. bifasciatus*, Gray, Anim. Kingd. Ins. Vol. 1, p. 358, pl. 31, f. 3 (1831) (Mexique).
 * *Catherinae*, Chevrolat, Col. Mex. Cent. 2, p. 191 (1835).
37. **A. verutus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 67 (1897) (Goyaz).
38. **A. ulens*, Kerremans, idem, p. 62 (Goyaz).
39. **A. spinamajor*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 90 (1837) (Brésil).
40. **A. parens*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 58 (1897) (Brésil).

(1) Long. 8; larg. 2,3 mm. — Oblong, allongé, assez convexe en dessus, bronzé brillant et clair avec la région suturale et l'extrémité des élytres bleu d'acier, l'apex cuivreuse pourpre sombre; le dessus couvert de monchetures irrégulières formées par des poils blancs; le dessous couvert d'une purulence blanche. — Tête inégale, bituberculée et sillonnée en arrière sur le vertex; antennes bronzées; pronotum ridé transversalement, avec une large impression médiane, irrégulière et avec une courte carène latérale arquée. Ecusson caréné. Elytres avec une large côte médiane naissant du calus huméral où elle s'incurve, le sommet tronqué avec ses côtés arrondis et irrégulièrement dentelés et une forte dent médiane aiguë. Dessous finement granuleux (C. Bruch).

(2) Long. 12,5; larg. 3 mm. — Allongé, assez convexe en dessus, atténué en arrière, le front bronzé, le pronotum noir verdâtre brillant, les élytres noirs ornés à l'extrémité de deux petites taches superposées, villenses et jaunes. Dessous bronzé très brillant avec une large tache jaunâtre sur les côtés du troisième segment abdominal, la région supérieure de l'abdomen plus large que les élytres, villose et ornée d'une purulence jaunâtre. — Front inégal, largement et profondément excavé; pronotum largement et profondément sillonné au milieu, la carène latérale formant un court bourrelet arqué; écusson large, subcordiforme et non caréné; élytres avec une côte médiane et légèrement creusés le long de la suture, le sommet avec une longue épine médiane accostée intérieurement d'une courte épine suturale et extérieurement de trois ou quatre petites dents remontant le long du bord. Dessous très finement ponctué. (C. Bruch).

41. **A. puerilis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 74 (1897) (Amazones).
42. **A. longicornis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 20, pl. 4, f. 23 (1835) (Brésil).
43. **A. trispinosus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 213, pl. 35, f. 203 (1841) (Colombie).
44. **A. dentibennis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 343 (1899) (Brésil).
45. **A. sennotatus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 16, pl. 3, f. 17 (1839) (Brésil).
46. **A. variabilis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 344 (1899) (Espírito Santo).
47. **A. luculentus*, Kerremans, idem, Vol. 44, p. 330 (1900) (Goyaz).
48. **A. inflatus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 72 (1897) (Amazones).
49. **A. enervatus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 59 (1879) (Brésil).
50. **A. scabiosus*, Thomson, idem, p. 88 (1878) (Mexique).
51. **A. notabilis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 340 (1899) (Rio-Grande).
52. **A. vittulus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 76, pl. 4, f. 18 (1889) (Mexique).
53. **A. multispinosus*, Klug, Ent. Bras. p. 8 (1827) (Brésil).
prolongatus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 9, pl. 2, f. 9 (1835).
54. **A. angustus*, Chevrolat, Col. Mex. Cent. 2, p. 137 (1835) (Mexique).
propinquus, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 95 (1837).
multinotatus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 62, pl. 14, f. 81 (1839).
55. **A. aculeatus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 210, pl. 34, f. 200 (1841) (Brésil).
56. **A. probus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 63 (1897) (Vénézuéla).
57. **A. patruelis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 415 (1894) (Mexique).
58. **A. umbratus*, Harold, Col. Heft. Vol. 5 (1869) (Etats-Unis).
tenuis || Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 266, pl. 44, f. 260.
59. **A. squamulatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 72 (1889) (Mexique).
60. **A. macer*, Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 70 (1858) (Texas).
61. **A. acuductus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 78, pl. 4, f. 15 (1889) (Guatemala).
62. **A. depressicollis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 328 (1900) (Guatemala).
63. **A. mansuetus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 59 (1879) (Brésil).
64. **A. cavatus*, Chevrolat, Col. Mex. fasc. 6, p. 142 (1835) (Texas, Mexique).
texanus, Crotch, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 94 (1873).
65. **A. aurocephalus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 218, pl. 36, f. 209 (1841) (Brésil).
66. **A. almenus*, Gory, idem, p. 242, pl. 50, f. 234 (Colombie).
67. **A. splendens*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 80 (1897) (Pernambuco).
68. ***A. eversoni**, nov. sp. (1) (Brésil).
69. **A. obsoletus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 229, pl. 38, f. 221 (1841) (Brésil).
70. **A. aurifrons*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 75 (1897) (Amazones).
71. **A. prolixus*, Kerremans, idem, p. 68 (Pernambuco).
72. **A. decorus*, Kerremans, ibidem, p. 82 (Minas Geraes).
73. **A. suturalineatus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 58 (1879) (Brésil).
74. **A. nigrofasciatus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 5, pl. 1, f. 5 (1839) (Brésil).
75. **A. dives*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 73 (1897) (Goyaz).
76. **A. subinflatus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 345 (1899) (Goyaz).
77. **A. irregularis*, Kerremans, idem, p. 346 (Goyaz).
78. **A. celsus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 75 (1897) (Bahia).
79. **A. fastigatus*, Kerremans, idem, p. 102 (Brésil).
80. **A. desideratus*, Kerremans, ibidem, p. 100 (Amazones).
81. **A. deliciosus*, Kerremans, ibidem, p. 81 (Minas).
82. **A. amazonicus*, Kerremans, ibidem, p. 101 (Amazones).
83. **A. hesperus*, Kerremans, ibidem, p. 105 (Bahia).
84. **A. cardiaspis*, Kerremans, ibidem, p. 104 (Brésil).

(1) Long. 8; larg. 1,3 mm. — Allongé, acuminé en arrière; front aplani, brillant, vert obscur; pronotum et élytres noirs, ceux-ci ornés d'un dessin villos et gris garnissant l'impression basilair; la moitié suturale antérieure, une bande flexueuse au tiers postérieur et une tache irrégulière préapicale. Dessous bronzé obscur. — Vertex bombé et faiblement sillonné; pronotum à rides onduleuses, avec un sillon médian formé par deux fossettes superposées; écusson caréné transversalement; élytres faiblement creusés le long de la suture, le sommet acuminé de part et d'autre et finement denté (E. Gounelle). — Brésil.

85. *A. adjunctus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 81 (1889).
 86. **A. voluptuosus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 98 (1897).
 87. **A. humeralis*, Kerremans, idem, p. 97 (Guatemala).
 88. **A. sculpturatus*, Kerremans, ibidem, p. 80 (Pernambuco).
 89. *A. bilineatus*, Weber, Obs. Ent. p. 74 (1801) (Etats-Unis).
 bivittatus, Kirby, Fauna Bor. Amer. Ins. p. 161 (1837).
 flavolineatus, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 110 (1837).
 aurolineatus, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 248, pl. 41, f. 241 (1841).
 90. **A. analis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 158 (1896) (Brésil).
 91. *A. Walsinghami*, Crotch, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 95 (1873) (Etats-Unis, Mexique).
 92. *A. dominicanus*, Thomson, Typ. Bupr. p. 83 (1878) (St-Domingue).
 93. *A. aureus*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 98 (1837) (Etats-Unis, Mexique).
 Couesi, Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 384 (1866).
 94. **A. major*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 90 (1889) (Mexique).
 95. **A. domitor*, nov. sp. (1) (Mexique).
 96. *A. fossulatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 120, pl. 7, f. 10 (1889) (Mexique).
 97. **A. clarus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 325 (1900) (Mexique).
 98. *A. aurilatera*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 120 (1889) (Mexique).
 99. *A. phanicopterus*, Waterhouse, idem, p. 121 (Mexique).
 100. *A. acutipennis*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 109 (1837) (Etats-Unis).
 latebrus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 38, pl. 9, f. 50 (1839).
 quadriimpressus, Ziegler, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 2, p. 267 (1846).
 101. **A. rimosicollis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 111 (1897) (Brésil).
 102. *A. flaveolus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 25, pl. 5, f. 30 (1839) (Brésil).
 103. **A. bellicus*, nov. sp. (2) (Montevideo).
 104. *A. leucostictus*, Klug, Ent. Bras. p. 9, pl. 40, f. 8 (1827) (Brésil).
 albomaculifer, Saunders, Cat. Bupr. p. 115, n° 70 (1871).
 105. **A. neuquensis*, nov. sp. (3) (Neuquen : République Argentine).
 106. **A. sensitivus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 99 (1897) (Goyaz).
 107. *A. frigidus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 254, pl. 42, f. 247 (1841) (Paraguay).
 insanus, Gory, idem, p. 255, pl. 42, f. 258.
 mendozanus, Steinheil, Atti Soc. Ent. Ital. Vol. 15, p. 565 (1872).
 108. *A. sulcipennis*, Solier, Gay, Hist. fis. Chile, Vol. 4, p. 506, pl. 12, f. 12 (1851) (Chili).
 109. *A. granulicollis*, Castelnau et Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 29, pl. 6, f. 36 (1837) (Brésil).
 110. **A. opimus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 98 (1897) (Goyaz).
 111. *A. fulvolineatus* (Brésil).
 flavolineatus || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 61, pl. 13, f. 79 (1839).
 112. **A. vesus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 102 (1897) (Pernambuco).
 113. **A. puniceus*, Kerremans, idem, p. 117 (Bahia).
 114. *A. difficilis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 224, pl. 37, f. 215 (1839) (Etats-Unis).
 occidentalis, Uhler, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 416 (1855).
 115. **A. messorius*, nov. sp. (4) (Brésil).
 116. *A. anxius*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 226, pl. 37, f. 217 (1841) (Etats-Unis).
 117. *A. muticus*, Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 70 (1858) (Texas).

(1) Long. 12; larg. 2,5 mm. — Bronze clair et couvert d'une fine et courte vestiture blanc jaunâtre; le front cuivreux, les élytres ornés de trois petites taches jaunes, l'une au tiers antérieur, près de la suture, la deuxième, médiane, plus près du bord extérieur que de la suture, la troisième, plus grande, au tiers postérieur et dans le prolongement de la première. Front sillonné et excavé; pronotum avec une profonde impression triangulaire et médiane, la carène latérale remplacée par un calus épais; écusson cordiforme et non caréné; élytres avec une fine côte médiane, le sommet subacuminé, séparément arrondi et à peine dentelé (Fenyès). — Mexique.

(2) Long. 9,5; larg. 2,5 mm. — Ressemble beaucoup à l'*Agr. flaveolus*, Castelnau & Gory, mais moins robuste, la coloration générale plus cuivreuse, la côte élytrale presque nulle, les mochetures moins nombreuses et non allongées, la villosité du dessous plus dense. — Montevideo.

(3) Long. 7; larg. 1,6 mm. — Faciès de l'*Agr. leucostictus*, Klug, semblable à lui pour les détails, mais noir et rugueux en dessus; le front et le dessous bleu foncé brillant, les pattes violacées; le dessin élytral moins net, les trois points clairs plus allongés, surtout les deux antérieurs, plus obscurs et d'un jaune sale et boueux (C. Bruch). — République Argentine).

(4) Long. 10,5; larg. 2 mm. — Allongé, arqué en dessus, un peu atténué en arrière, tête noire, pronotum pourpre obscur, élytres noir verdâtre. Dessous vert glauque foncé brillant, plus obscur en avant qu'en arrière. — Tête excavée et sillonnée; pronotum inégal et bossué par suite de deux impressions discales et d'une impression latérale assez grande; écusson strié et subcaréné; élytres évidés le long de la suture, le sommet séparément arrondi et très finement dentelé. (Fairmaire). — Brésil.

118. **A. cariosus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 346 (1899) (Espiritu Santo).
 119. **A. faber*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 111 (1897) (Brésil).
 120. **A. consularis*, Kerremans, idem, p. 105 (Sainte-Catherine).
 121. ***A. Bruchi**, nov. sp. (1) (Tucuman).
 122. **A. tersus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 110 (1897) (Minas Geraes).
 123. ***A. habilis**, nov. sp. (2) (Mexique).
 124. *A. lacustris*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 250 (1860) (Canada).
 125. *A. niveiventris*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 15, p. 304 (1891) (Californie).
 126. ***A. costifer**, nov. sp. (3) (Goyaz).
 127. *A. mutabilis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 101 (1889) (Mexique).
 128. **A. thoracius*, Castelnau & Gory, Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 58, pl. 13, f. 16 (1839) (Chili).
 129. **A. reliquus**, nov. sp. (4) (Goyaz).
 130. *A. aeneus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 63, pl. 14, f. 83 (1839) (Brésil).
 131. **A. rusticus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 125 (1897) (Chili).
 132. ***A. bonariensis**, nov. sp. (5) (Buenos-Ayres).
 133. **A. nigripennis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 96 (1889) (Mexique).
 134. *A. obscuripennis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 260, pl. 60, f. 253 (1841) (Brésil).
 135. ***A. aenescens**, nov. sp. (6) (Brésil).
 136. *A. ruficollis*, Fabricius, Mant. Ins. Vol. 1, p. 184 (1787) (Etats-Unis).
 137. *A. thoracellus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 59, pl. 13, f. 77 (1839) (Brésil).
 * *squameus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 108 (1897).
 138. **A. mentitus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 418 (1894) (Mexique).
 139. *A. masculinus*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 295 (1891) (Texas).
 140. **A. azureus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 345 (1899) (Goyaz).
 141. **A. impar*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 109 (1897) (Amazones).
 142. ***A. omissus**, nov. sp. (7) (Brésil).
 143. **A. praelongus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 115 (1897) (Amazones).
 144. ***A. metuens**, nov. sp. (8) (Goyaz).
 145. *A. pauperculus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 262, pl. 44, f. 256 (1841) (Brésil).

(1) Long. 6,5; larg. 1 mm. — Allongé, subparallèle, plan en dessus, atténué en arrière, bronzé clair et brillant et couvert d'une courte vestiture gris blanchâtre. — Tête convexe, finement granuleuse et faiblement sillonnée; pronotum un peu plus large en avant qu'en arrière, couvert de rides onduleuses, avec deux impressions médianes et une latérale; écusson triangulaire, sillonné et caréné transversalement; élytres couverts de rugosités simulant de très fines écailles, le sommet subacuminé, séparément arrondi et dentelé. (C. Bruch). — Tucuman.

(2) Long. 5; larg. 1 mm. — Ecourté, atténué en arrière, assez convexe en dessus et bronzé clair, très légèrement verdâtre en avant; dessous verdâtre clair, un peu plombé. — Tête convexe, nettement sillonnée; pronotum convexe sur le disque, celui-ci entouré en arrière d'une dépression semicirculaire; écusson caréné élytres vaguement déprimés le long de la suture, le sommet séparément arrondi et subacuminé. (Fenyès). — Mexique.

(3) Long. 10; larg. 2 mm. — Allongé, un peu élargi à l'épaule, acuminé en arrière, pourpré sombre et brillant en dessus; front et partie antérieure du dessous obscurs, l'abdomen verdâtre, brillant et clair. — Front étroit, sillonné et excavé; pronotum ridé transversalement, avec une dépression linéaire transverse et arquée; écusson caréné; élytres déprimés le long de la suture sur la moitié antérieure, le sommet accuminé avec une épine médiane allongée et accostée, de part et d'autre, de quelques petites dents. (H. Donckier). — Goyaz.

(4) Long. 7,5; larg. 1,6 mm. — Oblong, peu convexe, arrondi et un peu atténué en arrière, bronzé obscur en dessus et couvert d'une très fine vestiture grise; front et dessous noirs, un peu mats et recouverts de la même vestiture. — Tête rugueuse et convexe, faiblement sillonnée; pronotum ridé transversalement, sans impression médiane mais déprimé sur les côtés; écusson caréné; élytres faiblement déprimés le long de la suture, couverts de rugosités simulant de fines écailles, le sommet séparément arrondi et à peine dentelé. (H. Donckier). — Goyaz.

(5) Long. 5-5,5; larg. 0,6-0,7 mm. — Allongé, atténué en arrière, le dessus un peu arqué; pronotum bronzé cuivreux, élytres noirs, mats et peu brillants. Dessus bronzé, ♂ tête bronzé; ♀ tête noire. — Front finement granuleux, convexe, avec un fin sillon médian; pronotum couvert de rides sinueuses et transversales, les côtés arqués en avant et sinueux en arrière, le disque faiblement sillonné; élytres couverts de rugosités simulant de petites écailles, le sommet acuminé de part et d'autre et finement denté. Dessous plus foncé en avant qu'en arrière, couvert d'une villosité retenant une purulence blanche (C. Bruch). — Buenos-Ayres.

(6) Long. 6,3; larg. 1,2 mm. — Semblable au précédent (BONARIENSIS, Kerremans) pour les détails, mais plus robuste, plus bronzé surtout sur les élytres, l'extrémité de ceux-ci pareille, mais la rugosité plus forte; le front vert (♂) les côtés du pronotum un peu plus arqués, leur plus grande largeur au milieu et non avant le milieu. Le dessous plus clair, surtout les fémurs (C. Bruch). — Brésil.

(7) Long. 5; larg. 0,6 mm. — Faciès des deux précédents, mais plus grêle, plus allongé et plus atténué en arrière, le front plus bombé, pourpré sombre et brillant; le pronotum bronzé obscur, légèrement violacé; les élytres de même nuance, mais plus obscures. Dessous bronzé cuivreux. — Tête convexe, à peine sillonnée; pronotum ridé transversalement, les côtés régulièrement mais moins sensiblement arqués, le disque à peine impressionné; élytres moins rugueux, les écailles beaucoup plus fines, le sommet avec une petite dent suturale et une dent médiane plus forte, accostée extérieurement de quelques petites dents remontant le long du bord. Dessous à villosité moins dense, mais plus longue, plus molle et plus lâche et très espacée, d'un bronzé un peu plus cuivreux, surtout sur l'abdomen (C. Bruch). — Brésil.

(8) Long. 6,5; larg. 1,3 mm. — Allongé, mais relativement large, obscur, verdâtre en dessus avec le front plus clair, les angles postérieurs du pronotum un peu cuivreux. Dessous bronzé. — Tête large, finement granuleuse, subconvexe et faiblement impressionnée; pronotum à rides sinueuses et transversales, faiblement impressionné au milieu; élytres largement et peu profondément creusés le long de la suture, rugueux et couverts de petites écailles, le sommet séparément arrondi (H. Donckier). — Goyaz.

146. ***A. dualis**, nov. sp. (1) (Brésil).
 147. **A. expletus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 114 (1897) (Bahia).
 148. ***A. avulsus**, nov. sp. (2) (Goyaz).
 149. **A. cabellanus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 25 (1896) (Vénézuéla).
 150. ***A. argentinus**, nov. sp. (3) (Buenos-Ayres).
 151. **A. depressus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 351 (1899) (Goyaz).
 152. ***A. languens**, nov. sp. (4) (Brésil).
 153. **A. variatus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 115 (1897) (Minas Geras).
 154. *A. longus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 333 (1900) (Colombie).
 155. *A. pusillus*, Say, Ann. Lyc. New-York, Vol. 1, p. 252 (1825) (Kansas).
 parvus, Saunders, Cat. Bupr. p. 116, n° 207 (1871).
 156. ***A. percautus**, nov. sp. (5) (Buenos-Ayres).
 157. **A. tacitus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 416 (1894) (Mexique).
 158. **A. Claveri*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 333 (1900) (Colombie).
 159. **A. infuscatus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 116 (1897) (Amazones).
 160. *A. defectus*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 234 (1860) (Nouveau Mexique).
 161. ***A. raptor**, nov. sp. (6) (Mexique).
 162. **A. purus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 334 (1900) (Brésil).
 163. **A. fugitivus**, (Mexique).
 * *fugax*, || Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 417 (1894).
 163. **A. baliolus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 113 (1897) (Bahia).
 164. *A. addendus*, Crotch, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 95 (1873) (Etats-Unis d'Amérique).
 165. **A. Dugesi*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 83 (1897) (Mexique).
 166. **A. deceptor*, Kerremans, idem, p. 122 (Brésil).
 167. **A. piliferus*, Kerremans, ibidem, p. 112 (Buenos-Ayres).
 168. **A. prismaticus*, Kerremans, ibidem, p. 117 (Minas Geraes).
 169. **A. luctuosus*, Kerremans, ibidem, p. 123 (Goyaz).
 170. **A. intermedius*, Kerremans, ibidem, p. 112 (Brésil).
 171. *A. egenus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 258, pl. 43, f. 251 (1841) (Etats-Unis d'Amérique).
 172. *A. arcuatus*, Say, Ann. Lyc. New-York, Vol. 1, p. 249 (1825) (Canada, Etats-Unis d'Amérique).
 cupreicollis, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 240, pl. 41, f. 232 (1841).
 173. **A. melancholicus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 114 (Goyaz).
 174. *A. imbellis*, Crotch, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 94 (1873) (Etats-Unis d'Amérique).

(1) Long. 7,2; larg. 1,5 mm. — Allongé, atténué en arrière, bronzé verdâtre sur la tête et le pronotum, la première plus verte, les côtés antérieurs du second plus clairs et plus brillants; élytres bronzé obscur. Dessous bronzé. — Tête convexe, sillonnée longitudinalement et transversalement; pronotum ridé, les rides sinueuses, ses côtés arqués en avant et sinués en arrière, le disque et les côtés impressionnés; élytres allongés, rugueux, couverts de fines écailles aciculées, le sommet subacuminé et séparément arrondi. Dessous couvert d'une très courte villosité blanche (C. Bruch). — Brésil.

(2) Long. 6; larg. 1 mm. — Moins élancé que le précédent (DUALIS, Kerremans), d'un bronzé clair et brillant avec le front vert; le dessous bronzé clair et très légèrement verdâtre. — Tête finement granuleuse, à peine sillonnée; pronotum moins arqué et plus impressionné sur les côtés; le disque avec deux fossettes superposées; élytres profondément impressionnés à la base et évidés le long de la suture, le sommet séparément arrondi et dentelé. Dessous couvert d'une courte villosité retenant une purulence blanche (H. Donckier). — Goyaz.

(3) Long. 4; larg. 0,6 mm. — Allongé, subparallèle, plan en dessus, arrondi et à peine atténué en arrière, entièrement bronzé. — Tête assez forte, convexe et sillonnée; pronotum un peu plus large en avant qu'en arrière et sensiblement plus long que large; ses côtés faiblement arqués; élytres rugueux et couverts de fines écailles, sillonnés le long de la suture, celle-ci relevée sur la moitié postérieure; le sommet largement et séparément arrondi et dentelé. Dessous finement granuleux et couvert d'une villosité fine, courte, espacée et blanche, plus rare sur l'abdomen que sur le sternum (C. Bruch). — Buenos-Ayres.

(4) Long. 4; larg. 0,6 mm. — Petit, allongé, étroit, atténué en arrière; le front bleu, le pronotum bronzé à reflets bleu d'acier, les élytres bronzés. Dessous bronzé avec l'abdomen à reflets bleu d'acier. — Tête assez convexe, finement mais visiblement sillonnée; pronotum ridé, un peu plus large que long et plus large en avant qu'en arrière; élytres rugueux, couverts de fines écailles, le sommet subacuminé, armé en dedans de deux épines, l'une, subsuturale, plus courte que la médiane. Dessous couvert d'une très fine vestiture gris argenté, courte et espacée (C. Bruch). — Brésil.

(5) Long. 5; larg. 1 mm. — Plus large et d'un faciès plus robuste que l'*A. LANGUENS*, Kerremans, qui précède; bronzé en dessus; le dessous noir brillant, très légèrement bronzé. — Tête sillonnée; pronotum finement granuleux, déprimé sur les côtés, ceux-ci dilatés et arqués, le disque à peine sillonné; élytres plus rugueux que le pronotum, couvert d'écailles paraissant disposées en rides transversales, le sommet séparément arrondi et à peine dentelé (C. Burch). — Buenos-Ayres.

(6) Long. 5,3; larg. 0,9 mm. — Assez épais et assez robuste, peu élancé, arqué en dessus; front verdâtre, pronotum et élytres bronzés et brillants. Dessous bronzé clair et très légèrement verdâtre en arrière, plus obscur en avant. — Tête plane en avant et légèrement bombée en arrière finement granuleuse et sans sillon médian; pronotum plus large que long et aussi large en avant qu'en arrière, le disque à peine sillonné, les côtés avec une impression arquée, entourant en avant, la carène inférieure; élytres à peine plus rugueux que le pronotum, finement chagrinés, les rugosités disposées de façon à produire des petites rides transversales plus apparentes sur les côtés que sur le disque, le sommet subacuminé, séparément arrondi et visiblement dentelé. Dessous couvert d'une très fine villosité gris argenté, plus dense sur le sternum que sur l'abdomen; les fémurs plus verts et plus clairs que celui-ci (Fenyés). — Mexique.

175. *A. fallax*, Say, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 6, p. 163 (1836) (Etats-Unis d'Amérique).
impressipennis, Uhler, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 416 (1855).
176. **A. clausus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 116 (1897) (Brésil).
177. **A. congener*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 155 (1896) (Brésil).
178. *A. blandus*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 321 (Canada, Texas).
179. **A. praelucens*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 109 (1897) (Minas Geraes).
180. **A. illectus*, Fall (Californie).
181. **A. venustus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 94 (1897) (Pernambuco).
182. **A. honestus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 156 (1896) (Brésil).
183. **A. dicax*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 107 (1897) (Amazonie).
184. **A. cingulatus*, Kerremans, idem, p. 121 (Bahia).
185. *A. chalcoderes*, Chevrolat, Col. Mex. fasc. 6, p. 143 (1835) Mexique).
impressicollis, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 241 pl. 40, f. 133 (1841).
186. **A. fossifer** (Uruguay).
* *foveicollis* || Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 7 (1887).
187. *A. otiosus*, Say, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 6, p. 163 (1836) (Etats-Unis d'Amérique).
virens, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 259, pl. 43, f. 252.
188. *A. quadrinotatus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 233, pl. 38, f. 224 (Mexique).
189. **A. sincerus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 78 (1897) (Brésil).
190. **A. sacer*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 332 (1900) (Goyaz).
191. ***A. garrulus**, nov. sp. (1) (Brésil).
192. **A. mundus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 77 (1897) (Pernambuco).
193. **A. oculifer*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 350 (1899) (Goyaz).
194. **A. lucens*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 91 (1897) (Goyaz).
195. **A. consentaneus*, Kerremans, idem, p. 89 (Goyaz).
196. **A. subviolaceus*, Kerremans, ibidem, p. 84 (Guatemala).
197. **A. inornatus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 162 (1896) (Brésil).
198. **A. subniger*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 83 (1897) (Guatemala).
199. **A. percarus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 418 (1894) (Mexique).
200. **A. munificus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 90 (1897) (Bahia).
201. **A. aeneifrons*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 163 (1896) (Brésil).
202. **A. generosus*, Kerremans, idem, p. 157 (Brésil).
203. *A. politus*, Say, Ann. Lyc. New-York, Vol. 1, p. 249 (1825) (Etats-Unis d'Amérique).
204. **A. indagator*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 332 (1900) (Brésil).
205. *A. impexus*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 327 (1891) (Etats-Unis d'Amérique).
206. **A. dirus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 107 (1897) (Goyaz).
207. **A. congener*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 155 (1896) (Brésil).
208. *A. arnus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 232, pl. 38, f. 223 (Colombie).
209. *A. obsoletoguttatus*, Gory, idem, p. 256, pl. 43, f. 249 (Etats-Unis d'Amérique).
210. **A. gratus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 347 (1899) (Goyaz).
211. **A. villosulus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 89 (1897) (Pernambuco).
212. **A. ignavus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 93 (1897) (Goyaz).
213. **A. duplicatus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 161 (1896) (Brésil).
214. *A. antennatus*, Waterhouse, Biol. Cent. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 92 (1899) (Mexique).
215. **A. frustrator*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 331 (1900) (Colombie).
216. *A. vittaticollis*, Randall, Boston Journ. Vol. 2, p. 38 (1838) (Etats-Unis d'Amérique).
frenatus, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 239, pl. 40, f. 230.
217. **A. comptus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 331 (1900) (Goyaz).
218. **A. brasiliensis*, Kerremans, idem, Vol. 43, p. 348 (1899) (Goyaz).

(1) Long. 7; larg. 1,2 mm. — Allongé, atténué en arrière; tête et pronotum bronzés; élytres obscurs, violacés et ornés d'une moucheture villose, jaune et un peu allongée, située au tiers postérieur et plus près de la suture que du bord extérieur. Dessous bronzé brillant, un peu pourpré. — Tête un peu convexe, inégale, à reliefs peu accentués; front sillonné; pronotum presque aussi long que large, avec une impression latérale et deux vagues impressions disciales superposées; écusson caréné; élytres couverts de rugosités simulant de petites écailles, légèrement évidés le long de la suture, celle-ci relevée, le sommet séparément arrondi, subacuminé de part et d'autre et dentelé. Dessous assez rugueux, couvert de petites rides simulant des écailles et d'une courte villosité rare et d'un gris blanchâtre (E. Gounelle). — Brésil.

FAM. BUPRESTIDÆ

219. ***A. amoenulus**, nov. sp. (1) (Brésil).
 220. **A. prudens*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 88 (1897) (Vénézuéla).
 221. **A. turgitus*, Kerremans, idem, p. 95 (Bahia).
 222. **A. bicarinatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 83 (Mexique, Brésil).
 223. ***A. gestator**, nov. sp. (2) (Mexique).
 224. **A. detractus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 86 (1889) (Mexique).
 225. ***A. curator**, nov. sp. (3) (Brésil).
 226. **A. granulatus*, Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 3, p. 162 (1823) (Etats-Unis d'Amérique).
 227. **A. badius*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 79, (1897) (Minas Geraes).
 228. **A. auriceps*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 348 (1899) (Goyaz).
 229. **A. errans*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 84 (1889) (Panama).
 230. **A. expositus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 91 (1897) (Bahia).
 231. ***A. faciatius**, nov. sp. (4) (Tucuman).
 232. **A. subguttatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 84 (1889) (Mexique).
 233. **A. petarensis*, Kerremans, Ann. Soc. Fr. p. 24 (1896) (Vénézuéla).
 234. **A. eximius*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 92 (1897) (Brésil).
 235. **A. speciosus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 101, pl. 6, f. 6 (1889) (Mexique).
 tupatarensis, Dugès, La Nature, (2), Vol. 2, p. 31, pl. 2, f. 50 et 50 bis (1891) (Mexique).
 236. **A. suavis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 78 (1897) (Bahia).
 237. **A. Grouvellei*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 160 (1896) (Brésil).
 238. **A. Simoni*, Kerremans, idem, p. 23 (Vénézuéla).
 239. **A. lineatus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 349 (1899) (Goyaz).
 240. ***A. Caroli**, nov. sp. (5) (Tucuman).
 241. **A. fastidiosus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 159 (1896) (Brésil).
 242. **A. dubius*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 87 (1897) (Brésil).
 243. **A. bellator*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 334 (1900) (Brésil).
 245. ***A. plicatus**, nov. sp. (6) (Brésil).
 246. **A. impudens*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 93 (1897) (Pernambuco).
 247. ***A. luctator**, nov. sp. (7) (Mexique).

(1) Long. 6; larg. 1 mm. — Allongé, atténué en arrière; dessus assez convexe, noir brillant à reflets bronzés, la tête et le pronotum verdâtres; les élytres ornés chacun, dans le creusement présutural, de deux points villoses et jaune terne. Dessous bronzé, plus obscur en avant qu'en arrière. — Tête médiocrement convexe, sillonnée; pronotum plus sensiblement impressionné au milieu que sur les côtés; élytres séparément acuminés au sommet. Dessous couvert d'une villosité très courte, rare, plus dense en avant et d'un gris blanchâtre. — Brésil. (Ch. Bruch).

(2) Long. 6; larg. 1,2 mm. — Allongé, relativement robuste, peu convexe, entièrement noir avec le front bronzé obscur et l'extrémité des élytres rouge feu sombre; ceux-ci couverts d'un dessin vague formé par une courte villosité grise, disposée en taches et en bandes. — Tête inégale; front sillonné, bituberculé en arrière; pronotum inégal, couvert de reliefs à rides sinueuses; élytres rugueux, squamulés et présentant une vague côte médiane et dorsale, le sommet largement arrondi et dentelé, les dents espacées. Dessous couvert d'une courte villosité grise. — Mexique (Fenyes).

(3) Long. 6; larg. 1,2 mm. — Oblong, convexe, d'un noir verdâtre mat en dessus, les élytres couverts d'un duvet purulent de jaune terne et ne laissant de glabre que les côtés antérieurs et une large bande au tiers postérieur. Dessous noir assez brillant, couvert d'une villosité purulente de blanc sur les épisternums et formant une tache arrondie sur les côtés du 3^e segment abdominal. — Tête peu convexe, vaguement sillonnée; pronotum semicirculairement impressionné sur les côtés et le long de la base, le disque avec une fossette antérieure et médiane; les élytres creusés le long de la suture, celle-ci élevée, le sommet largement arrondi et finement dentelé. — Brésil.

(4) Long. 5,5; larg. 1,2 mm. — Allongé, atténué en arrière, arqué en dessus; tête bronzé cuivreux; pronotum et élytres bronzés et couverts d'une courte villosité grise et dense, ne laissant de glabre qu'une bande élytrale, transversale et postmédiane. Dessous d'un bronzé plus rouge que le dessus et couvert d'une villosité grise assez dense. — Front peu convexe et peu profondément sillonné, vaguement tuberculé; pronotum ridé transversalement avec deux fossettes superposées au milieu du disque; élytres avec une vague côte médiane, le sommet séparément acuminé de part et d'autre et finement dentelé. Dessous très finement granuleux. — Tucuman. (Ch. Bruch).

(5) Long. 5,5; larg. 0,8 mm. — Allongé, atténué en arrière, subparallèle, sensiblement plus large en avant, les côtés du pronotum étant très arqués; dessus bronzé, plus clair en avant qu'en arrière, le front cuivreux rougeâtre obscur, élytres ornés chacun de trois vagues taches villoses, d'un brun clair, l'une dans la dépression basilaire, la deuxième, médiane et la troisième au tiers postérieure. Dessous bronzé clair avec des taches purulentes et blanches dans les dépressions du corps. — Front vaguement impressionné en avant et sillonné en arrière; pronotum assez convexe, un peu plus long que large, les côtés très arqués et dépassant ceux des élytres, le disque vaguement sillonné; élytres couverts de fines écailles, le sommet séparément arrondi et finement dentelé. Dessous plus clair et plus brillant que le dessus. — Brésil. (Ch. Bruch).

(6) Long. 4,3; larg. 0,6 mm. — Petit, allongé, atténué en arrière; front vert clair et mat, vertex rougeâtre; pronotum bronzé, élytres vert obscur ornés chacun d'une vague bande médiane, allongée et subsuturale, grise et d'un point de même nuance vers le tiers postérieur. Dessous bronzé cuivreux brillant. — Tête subplane, vertex à peine sillonné; pronotum avec des rides profondes, sinueuses et transversales et deux fossettes médianes superposées; élytres séparément arrondis et dentelés au sommet. Dessous couvert d'une très courte villosité blanche, dense en avant et peu sensible en arrière. — Brésil. (C. Bruch).

(7) Long. 4,3; larg. 0,9 mm. — Petit, allongé, acuminé en arrière, bronzé brillant, un peu cuivreux ou pourpré, les élytres ornés chacun d'une tache allongée, blanchâtre, médiane et subsuturale et d'une petite tache de même, située vers le tiers postérieur. Dessous couvert d'une très courte villosité blanche, très épaisse et très dense sur les côtés de la région supérieure de l'abdomen. — Tête à peine sillonnée; pronotum ridé, sillonné au milieu et déprimé sur les côtés; élytres à rugosités simulant de très petites écailles, le sommet séparément acuminé et dentelé. — Mexique. (Fenyes).

248. *A. Lecontei*, Saunders, Cat. Bupr. p. 117, n° 110 (États-Unis d'Amérique)
subfasciatus || Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. (2), Vol. 2, p. 245 (1859).
249. **A. demissus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 416 (1894) (Mexique).
250. **A. idoneus*, nov. sp. (1) (Mexique).
251. *A. hilaris*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 87 (1889) (Guatémala).
252. **A. bucolicus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 419 (Mexique).
253. *A. biemarginatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 103, pl. 6, f. 8 (1889) (Guatém.).
254. *A. albofasciatus*, Waterhouse, idem, p. 110, pl. 6, f. 22 (Mexique).
255. **A. differens*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 156 (1896) (Brésil).
256. **A. blandulus*, Guérin, Rev. Zool. p. 256 (1844) (Mexique).
257. **A. dolatus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 119 (1897) (Goyaz).
258. *A. ornatulus*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 319 (1891) (États-Unis d'Amérique).
259. **A. verax*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 119 (1897) (Bahia).
260. **A. Bergi*, nov. sp. (2) (Tucuman).
261. **A. subdebilis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 351 (1899) (Goyaz).
262. **A. planatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 109, pl. 6, f. 19 (1889) (Guatémala).
263. **A. Sallei*, Dugès, Nat. Mex. Vol. 4, p. 172, f. 3-4 (1879) (Mexique).
264. **A. armillatus*, nov. sp. (3) (Goyaz).
265. **A. dilaticornis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 86 (1897) (Paraguay).
266. *A. Flohri*, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 219 (1890) (Mexique).
- * *opacus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 85 (1897).

SPECIES EUROPÆÆ, MEDITERRANÆÆ ET SIBIRICÆ

267. *A. Guerini*, Lacordaire, Faune Ent. Paris, p. 608 (1835) (Alsace, France).
- * *Guerini*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 440 (1865).
268. *A. ater*, Linné, Syst. Nat. (ed. 12), p. 663 (1767) (Suisse, Pyrénées).
- sexguttatus*, Brahm, Ins. Kalend. Vol. 1, p. 141 (1790).
- biguttatus*, Rossi, Faun. Etrur. Vol. 1, p. 191 (1790).
- * *sexguttatus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 441 (1865).
269. *A. biguttatus*, Fabricius Gen. Ins. Mant. Vol. 1, p. 137 (1777) (Europe Centrale et Méridionale).
- panonicus*, Piller & Mitterpacher, Iter, p. 92 (1783).
- biguttatus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 143 (1865).
270. *A. subauratus*, Gebler, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 277 (1833) (Alsace).
- auripennis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 46, pl. 10, f. 60 (1839).
- coryli*, Ratzeburg, Forstins. Vol. 1, p. 62, Note (1839).
- * *subauratus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 447 (1865).
271. *A. convexicollis*, Redtenbacher, Fauna Austr. p. 285 (1849) (Autriche).
272. *A. auricollis*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 149 (1857) (Jura).
273. *A. cæruleus*, Rossi, Faun. Etrur. Vol. 1, p. 407 (1790) (Europe Centrale et Méridionale).
- cyanescens*, Ratzeburg, Forstins. Vol. 1, p. 62, pl. 2, f. 2 (1837).
- cyanus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 52, pl. 11, f. 66 (1839).
- amabilis*, Castelnau & Gory, idem, pl. 12, f. 67 (1836).
- * *coeruleus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 425 (1865).
- sulcaticeps*, Abeille, Pet. Nouv. Ent. Vol. 1, p. 11 (1869).

(1) Long. 3,5; larg. 0,5 mm. — Très voisin du précédent (LUCTATOR K.) pour la coloration et le dessin élytral, mais plus petit, plus écourté et surtout moins acuminé en arrière; le disque du pronotum avec deux fossettes superposées nettes, le sommet des élytres séparément arrondi. — Front finement granuleux et vaguement sillonné sur toute sa longueur; pronotum un peu plus large que long, ses côtés faiblement arqués; écusson caréné transversalement; élytres couverts de rugosités simulant des écailles aciculées et très petites, le sommet séparément arrondi, obliquement tronqué extérieurement de part et d'autre. Dessous couvert, dans les dépressions, d'une purulence blanche. — Mexique. (Fenyes).

(2). — Long. 3,3; larg. 0,5 mm. — Petit, étroit, peu convexe, atténué en arrière, bronzé violacé en dessus avec une large bande élytrale transversale et médiane bronzée verdâtre claire; la tête verte; les élytres ornés chacun de deux points discaux et médians, blancs et rapprochés l'un de l'autre et d'une bande oblique ne touchant ni le bord ni la suture et située au tiers postérieur. Dessous pourpre sombre. — Tête faiblement sillonnée; pronotum grand, plus long que large, sans impressions, ni sillon, ni carènes; élytres finement granuleux, le sommet séparément arrondi et dentelé. Dessous couvert d'une très courte villosité blanche. — Tucuman. (C. Bruch).

(3). — Long. 6,5; larg. 1 mm. — Allongé, peu convexe, élargi en avant et au tiers postérieur, rétréci à hauteur des hanches, entièrement bleu d'acier, les élytres chacun avec deux cercles villoses et gris clair, l'un avant le milieu, l'autre, plus grand, au tiers postérieur. Côtés du troisième segment abdominal avec une tache purulente et blanche. — Tête inégale, sillonnée, bituberculée en arrière; pronotum inégal et bossué à rides très sinueuses; élytres squameux et rugueux, leur extrémité séparément arrondie et finement dentelée. Abdomen d'un bleu plus clair que le restant du corps. Goyaz. (H. Donckier).

274. *A. laticornis*, Illiger, Mag. Ins. Vol. 2, p. 243 (1803) (France, Autriche).
275. *A. angustulus*, Illiger, idem, p. 240 (Europe).
olivaceus, Gyllenhal, Ins. Suec. Vol. 1, p. 454 (1808).
viridis, Stephens, Brit. Ins. p. 174 (1830).
lactefrons, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Mosc. p. 115 (1837).
pavidus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 52, pl. 12, f. 68 (1839).
rugicollis, Ratzeburg, Forstins. Vol. 1, p. 62, Note 2, pl. 2, f. 6 (1839).
scaberrimus, Ratzeburg, idem, p. 62, Note.
laticollis, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 142 (1857).
* *angustulus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 457 (1865).
* *rugicollis*, Marseul, idem, p. 490.
* *scaberrimus*, Marseul, ibidem.
276. *A. elongatus*, Herbst, Col. Vol. 9, p. 203 (1801) (Europe).
cyaneus, Rossi, Faun. Etrur. p. 20 (1790).
tenuis, Ratzeburg, Forstins. Vol. 1, p. 60, pl. 2, f. 1 (1837).
Sahlbergi, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 113 (1837).
viridis, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 47, pl. 11, f. 62 (1839).
* *tenuis*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 458 (1865).
277. *A. foliicornis*, Abeille, Rev. Ent. Caen. Vol. 10, p. 284 (1891) (Syrie).
278. *A. asperimus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 492 (1865) (France méridionale).
* *Reyi*, Bauduer, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, Vol. 12, p. 83 (1881).
279. *A. obscuricollis*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 144 (1857) (France, Allemagne).
* *obscuricollis*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 491 (1865).
280. * *A. sinuatus*, Olivier, Entom. Vol. 2, Gen. 32, p. 74, pl. 10, f. 11 (1790) (France, Alsace).
chryseis, Curtis, Brit. Ent. Vol. 2, p. 67 (1825).
281. *A. mendax*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 111 (1837) (Laponie).
Faldermanni, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 42, pl. 10, f. 55 (1839).
* *mendax*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 446 (1865).
282. * *A. Roberti*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 89 (1837) (Europe centrale).
linearis || Paykull, Faun. Suec. Vol. 2, p. 226 (1799).
pratensis, Ratzeburg, Forstins. Vol. 1, p. 63 (1839).
* *pratensis*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 456 (1865).
283. *A. integerrimus*, Ratzeburg, Forstins. Vol. 1, p. 64 (1839) (Autriche, Espagne).
* *integerrimus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 485 (1865).
284. *A. lineolus*, Redtenbacher, Fauna Austr. p. 287 (1848) (Piémont).
* *lineolus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 451 (1865).
285. *A. pseudocyaneus*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 150 (1857) (Champagne).
* *pseudocyaneus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 453 (1865).
286. *A. betuleti*, Ratzeburg, Forstins. Vol. 1, p. 64 (1837) (Nassau).
* *betuleti*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 455 (1865).
287. * *A. bicoloratus*, Abeille (Algérie).
288. *A. viridis*, Linné, Syst. Nat. (ed. 10), p. 410 (1750) (Europe, etc.).
bicolor, Schrank, Fauna Boica, Vol. 1, p. 603 (1762).
serraticornis, Scopoli, Ent. Carn. p. 61 (1763).
rosaceus, Scopoli, idem.
linearis, Panzer, Fauna Germ. p. 101 (1789).
cyaneus, Olivier, Ent. Vol. 2, Gen. 32, p. 91, pl. 12, f. 132 (1790).
filiformis, Herbst, Col. Vol. 9, p. 313 (1801).
distinguendus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 44, pl. 10, f. 57 (1839).
Aubei, Castelnau & Gory, idem, f. 58.
iridipennis, Castelnau & Gory, ibidem, p. 45, pl. 10, f. 50.
* *capreat*, Chevrolat, Rev. Zool. p. 56 (1838).
fagi, Ratzeburg, Forstins. p. 63, note, pl. 2, f. 8 (1839).
nocivus, Ratzeburg, idem, p. 63, pl. 2, f. 7.
Littlei, Curtis, Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 10, p. 365 (1840).
quercinus, Redtenbacher, Fauna Austr. p. 285 (1848).
bicolor, Redtenbacher, idem, p. 287.
* *viridis*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 448 (1865).
289. *A. aurichalceus*, Redtenbacher, Fauna Austr. p. 286 (1848) (France, Allemagne, Italie).
* *aurichalceus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 483 (1865).

290. *A. hastulifer*, Ratzeburg, Forstins. Vol. 1, p. 61 (1839) (Landes).
**hastulifer*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 461 (1865).
291. *A. graminis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 15, pl. 11, f. 75 (1839) (Europe centr. et mér.).
**graminis*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 461 (1865).
292. *A. derasofasciatus*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 115 (1837) (Europe).
**derasofasciatus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 462 (1865).
293. **A. liturus*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 139 (1857) (Styrie, France).
**curtulus*, Mulsant, Opusc. Ent. fasc. 13, p. 12 (1863).
294. **A. limoniastri*, Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. 6, p. 130 (1886) (Algérie).
295. *A. croceivestris*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 472 (1865) (Algérie).
sericellus, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 27 (1866).
296. *A. purpuratus*, Klug, Symb. Phys. Vol. 1, pl. 1, f. 12 (1829) (Abyssinie).
297. *A. pubiventris*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 126, note 2 (1857) (Algérie).
**pubiventris*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 473 (1865).
298. **A. cinctus*, Olivier, Entom. Vol. 2, Gen. 32, p. 90, pl. 12, f. 130 (1790) (France, Alsace, Piémont).
299. **A. Baudii*, Bauduer, Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse, Vol. 12, p. 82 (1881) (Piémont).
300. *A. lituratus*, Klug, Symb. Phys. Vol. 1, 13^a, pl. 1, f. 13 (1829) (Egypte).
301. **A. Vaucheri*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 124 (1895) (Tanger).
302. **A. Linderi*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 468 (1865) (Trieste).
303. *A. grandiceps*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 126 (1857) (Chypre).
**grandiceps*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 477 (1865).
304. **A. olivicolor*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 135 (1857) (France, Russie).
olivaceus || Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 116 (1837).
305. *A. sericans*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 127, note 3 (1857) (Caucase).
cuprescens || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 56, pl. 12, f. 73 (1839).
**sericans*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 479 (1865).
306. *A. albogularis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 235, pl. 39, f. 226 (Autriche).
fossifrons, Sturm, Cat., p. 63 (1843).
**albogularis*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 481 (1865).
307. *A. roscidus*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 127, note 4 (1857) (Pyrénées).
**roscidus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 489 (1865).
308. *A. binotatus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 236, pl. 39, f. 227 (1841) (Algérie).
**binotatus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 482 (1865).
309. **A. vividicerulans*, Marseul, idem, Vol. 5, p. 175 (1868) (Beyrouth).
310. *A. Korbi*, Ganglbauer (Amasie).
311. *A. ecarinatus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 484 (1865) (Sibérie).
312. *A. hyperici*, Creutzer, Ent. Vers. p. 122, pl. 3, f. 26 (1789) (France, Italie, Algérie).
**hyperici*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 486 (1865).
313. *A. Artemisiae*, Brisout, Cat. Gren. p. 78 (1863) (Pyrénées).
**Artemisiae*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 474 (1865).
314. **A. cisti*, Brisout, Cat. Gren. p. 77 (1863) (Pyrénées).
315. **A. convexifrons*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 476 (1857) (Saxe).
316. **A. zigzag*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 478 (1865) (Crimée).
317. *A. Solieri*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 49, pl. 11, f. 61 (1839) (Pyrénées, Banat.).
**Solieri*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 475 (1865).

SPECIES ASIATICAE, MALAYANAE, AUSTRALASIAE ET JAPANICAE

318. **A. asiaticus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 178 (1898) (Mandchourie).
319. **A. cyaneoniger*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 515 (1873) (Japon).
**var. cupreoviridis*, Lewis, idem, Vol. 24, p. 332 (1892).
320. **A. spinipennis*, Lewis, ibidem, p. 334 (Japon).
321. **A. alazon*, Lewis, ibidem, p. 333 (Japon).
322. *A. discalis*, Saunders, ibidem, Vol. 11, p. 514 (1873) (Japon).
323. **A. japonicus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 178 (1898) (Japon).
324. *A. pilosovittatus*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 515 (1873) (Japon).

325. *A. australasiae*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 21, pl. 5, f. 25 (1839) (Australie).
hypoleucus, Castelnau & Gory, idem, p. 37, pl. 8, f. 48.
assimilis, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 217 (1846).
purpuratus, Hope, idem.
326. *A. Mastersi*, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 201 (1873) (Gayndah).
327. **A. nitidus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 179 (1898) (Australie).
328. **A. zonatus*, Kerremans, idem, p. 80 (Australie).
329. *A. ornatus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 155 (1864) (Java, Amboine, Mioko)..
330. *A. acutus*, Thunberg, Mus. Acad. Upsal. Vol. 4, p. 52 (1787) (Java, Sumatra).
armatus, Weber, Obs. Ent. p. 74 (1801).
spinosus, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 214 (1801).
cupreomaculatus, Herbst, Col. Vol. 9, p. 248, pl. 155, f. 8 a, b (1801).
fulchellus, Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. 12, p. 380 (1818).
mucronatus, Boheman, Eug. Res. Ent. Vol. 2, p. 63 (1858).
acanthopterus, Harold, Col. Hefte (1869).
331. **A. vendicator*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 335 (1900) (Sumatra).
332. *A. evanidus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 30, pl. 7, f. 37 (1839) (Java).
333. *A. semiaeneus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 157 (1864) (Sumatra).
334. *A. ignicollis*, H. Deyrolle, idem, p. 156 (Flores).
335. **A. Weyersi*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 23 (1900) (Sumatra).
336. **A. lombockianus*, Kerremans, idem, p. 83 (Lombok).
337. **A. fructus*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 370 (1896) (Sumbawa).
* *sumbuanus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 327 (1898).
338. **A. nodosus*, Kerremans, idem, Vol. 38, p. 470 (1894) (Bima).
339. **A. amabilis*, Kerremans, ibidem, Vol. 37, p. 343 (1893) (Hindoustan).
340. **A. agilis*, Kerremans, ibidem, Vol. 38, p. 471 (1894) (Hindoustan).
341. *A. purpurifrons*, H. Deyrolle, ibidem, Vol. 8, p. 163 (1864) (Ile Nias).
342. *A. quadri-punctatus*, H. Deyrolle, ibidem, p. 165 (Sumatra).
343. **A. fissifrons*, Fairmaire, Rev. Zool. p. 354 (1849) (Tonga Tabou).
344. **A. ampliatus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 23 (1900) (Sumatra).
345. **A. maculipennis*, Kerremans, idem, p. 24 (Sumatra).
346. **A. Dohrni*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 338 (1900) (Sumatra).
347. **A. Raapi*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 82 (1900) (Ile Nias).
348. **A. perakianus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 336 (1900) (Perak).
349. **A. woodlarkianus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 82 (1900) (Woodlark).
350. **A. fugax*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 472 (1898) (Céram).
351. **A. aequalis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 25 (1900) (Sumatra).
352. **A. splendidus*, Kerremans, idem, p. 26 (Sumatra).
353. *A. insularis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 173 (1864) (Java).
354. **A. subornatus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 26 (1900) (Sumatra).
355. *A. tripartitus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 181 (1864) (Sumatra).
356. **A. famulus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 27 (1900) (Sumatra).
357. **A. testor*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 339 (1900) (Sumatra).
358. **A. bifoveolatus*, Kerremans, idem, Vol. 39, p. 219 (1895) (Pédang).
359. **A. nixus*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 369 (1896) (Sumbawa).
360. **A. inops*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 215 (1892) (Bima).
361. **A. spectabilis*, Kerremans, idem, Vol. 39, p. 219 (1895) (Sikkim).
362. **A. striatocollis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 61, p. 24 (1892) (Manille, Nouvelle-Guinée).
363. *A. viridifrons*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 346 (1893) (Hindoustan).
364. **A. aberrans*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 34 (1900) (Sumatra).
365. **A. aurocyaneus*, Kerremans, idem, p. 30 (Sumatra).
366. *A. gratiosus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 202 (1864) (Sumatra).
367. **A. livens*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 825 (1892) (Birmanie).
368. **A. amorphus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 29 (1900) (Sumatra).
369. **A. tonkineus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 222 (1895) (Tonkin).

370. **A. nepos*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 337 (1900) (Sumatra).
 371. **A. adspersus*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 204 (1890) (Hindoustan).
 372. **A. nubilus*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 823 (1892) (Birmanie).
 373. *A. oblatulus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 336 (Sumatra).
 374. **A. grisator*, Kerremans, idem, Vol. 37, p. 343 (1893) (Hindoustan).
 375. **A. mandarinus*, Kerremans, ibidem, Vol. 36, p. 216 (1892) (Hindoustan).
 376. **A. adelphinus*, Kerremans, ibidem, Vol. 39, p. 222 (1895) (Chine).
 377. *A. chinensis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 73 (1879) (Chine).
 * *splendidicollis*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. 8, p. 348 (1888).
 378. **A. simplex*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 470 (1894) (Bengale).
 379. **A. repercussus*, Kerremans, idem, Vol. 37, p. 346 (1893) (Bengale).
 380. **A. opulentus*, Kerremans, ibidem, Vol. 44, p. 336 (1900) (Nouvelle-Guinée).
 381. **A. densus*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 362 (1896) (Mentawai).
 382. **A. subconsularis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 32 (1900) (Sumatra).
 383. *A. aeneolus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 197 (1894) (Nouvelle-Guinée).
 384. **A. connexus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 28 (1900) (Sumatra).
 385. *A. monogrammus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 72 (1879) (Almorah).
 386. *A. occipitalis*, Eschscholtz, Entom. p. 79 (1822) (Manille).
 387. **A. indignus*, Fairmaire, Rev. Zool. p. 353 (1849) (Taïti).
 388. *A. cupreoviolaceus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 169 (1864) (Pérak).
 389. **A. nudatus*, Kerremans, idem, Vol. 38, p. 474 (1894) (Pérak).
 390. **A. nigrinus*, Kerremans, ibidem, Vol. 39, p. 223 (1895) (Banguey).
 391. **A. coloratus*, Kerremans, ibidem, Vol. 38, p. 473 (1894) (Bengale).
 392. **A. singularis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 33 (1900) (Sumatra).
 393. *A. gentilis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 185 (1864) (Sumatra).
 394. *A. mediocris*, Kerremans, idem, Vol. 44, p. 341 (1900) (Bengale).
 * *modicus* || Kerremans, ibidem, Vol. 37, p. 348 (1893).
 395. **A. fragilis*, Kerremans, ibidem, p. 344 (Bengale).
 396. *A. spurcites*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 73 (1879) (Bengale).
 397. **A. simiolus*, Kerremans, Ann. Soc. Fr. p. 143 (1896) (Sumatra).
 398. *A. discicollis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 189 (1864) (Sumatra).
 399. **A. valens*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 30 (1900) (Sumatra).
 400. **A. fulvopictus*, Kerremans, Ann. Soc. Fr. p. 139 (1896) (Sumatra).
 401. **A. semivillosus*, Kerremans, idem, p. 141 (Sumatra).
 402. **A. humilis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 223 (1895) (Ile Bodjo).
 403. **A. cylindricus*, Kerremans, Ann. Soc. Fr. p. 138 (1896) (Sumatra).
 404. **A. verecundus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 347 (1893) (Bengale).
 405. **A. subvalidus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 84 (1900) (Bornéo).
 406. **A. keyensis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 475 (1894) (Iles Key).
 407. *A. funebris*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 188 (1864) (Nouvelle Guinée).
 408. **A. cupratus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 34 (1900) (Sumatra).
 409. **A. punctiventris*, Kerremans, idem, p. 31 (Sumatra).
 410. **A. alacris*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 141 (1896) (Sumatra).
 411. **A. comes*, Kerremans, idem, p. 140 (Sumatra).
 412. **A. insidiosus*, Kerremans, ibidem, p. 142 (Sumatra).
 413. *A. parvulus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 207 (1864) (Sumatra).
 414. **A. nervosus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 33 (1900) (Sumatra).
 415. **A. convexus*, Kerremans, idem, p. 32 (Sumatra).
 416. *A. melanarius*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 207 (1864) (Sumatra).
 417. **A. leviventris*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 36 (1900) (Sumatra).
 418. *A. agrestis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 286 (1864) (Sumatra).
 419. **A. tantillus*, Kerremans, Ann. Soc. Fr. p. 143 (1896) (Sumatra).
 420. **A. semivestitus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 339 (1900) (Sumatra).
 421. **A. fidelis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 140 (1896) (Sumatra).

422. **A. placidus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 473 (1894) (Bornéo).
 423. **A. videns*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 35 (1900) (Sumatra).
 424. **A. pyritosus*, Kerremans, idem, p. 35 (Sumatra).
 425. **A. coraeboïdes*, Kerremans, ibidem, p. 28 (Sumatra).
 426. **A. muscarius*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 224 (1895) (Tonkin).
 427. **A. ventripotens*, Kerremans, idem, Vol. 44, p. 342 (1900) (Bengale).
 **ventralis*, || Kerremans, idem, Vol. 37, p. 345 (1893).

SPECIES AFRICANÆ ET MADAGASCARIENSES

428. *A. grandis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 5, pl. 1, f. 3 (1839) (Sénégal, Congo, etc.).
 429. **A. congolanus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 320 (1898) (Congo).
 430. *A. discolor*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 354 (1851) (Caffrie).
 431. **A. Bennigseni*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 281 (1899) (Uragara).
 432. *A. sexguttatus*, Thunberg, Nov. Spec. Ins. Diss, pl. 5, f. 11 (1789) (Cap de Bonne-Espérance).
 ferruginoguttatus, Herbst, Col. Vol. 9, p. 309, pl. 66, f. 14 (1801).
 Klugi, Perty, Del. Anim. p. 20, pl. 4, f. 16 (1830).
 433. *A. octosignatus*, Schonherr, Syn. Ins. App. p. 122 (1817) (Sénégal, Sierra Leone).
 434. **A. sellatus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 320 (1898) (Natal).
 435. *A. cupriventris*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 23, pl. 5, f. 28 (1839) (Cap de B.-Esp.).
 436. **A. dahomeicus*, nov. sp. (1) (Dahomey).
 437. *A. falcatus*, Klug, Erm. Reise, p. 30 (1835) (Afrique méridionale).
 venosus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 28, pl. 6, f. 34 (1839).
 438. **A. vernus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 288 (1899) (Cameroon).
 439. **A. pretiosissimus*, Kerremans, idem, p. 282 (Uragara).
 440. **A. canaliculatus*, Kerremans, ibidem, Vol. 42, p. 321 (1898) (Zanguebar).
 441. *A. Raffrayi*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 56 (1879) (Abyssinie).
 442. **A. subgriseus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 327 (1898) (Congo français).
 443. **A. subapicalis*, Kerremans, idem, p. 321 (Cameroon).
 444. **A. Alluaudi*, nov. sp. (2) (Assinie).
 445. **A. notatus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 283 (1899) (Cameroon).
 446. **A. portonovencis*, nov. sp. (3) (Afrique centrale).
 447. **A. subnitidus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 328 (1898) (Congo français).
 448. **A. subelongatus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 284 (1899) (Cameroon).
 449. **A. camerunicus*, Kerremans, idem, p. 286 (Cameroon).
 450. **A. nitidifrons*, Kerremans, ibidem, Vol. 42, p. 323 (1898) (Congo français).
 451. **A. occidentalis*, Kerremans, ibidem, Vol. 43, p. 289 (1899) (Cameroon).
 452. **A. malus*, Kerremans, ibidem, p. 283 (Cameroon).
 453. **A. rufopictus*, Kerremans, ibidem, 285 (Cameron).
 454. **A. usamaroensis*, Kerremans, ibidem, p. 183 (Usamaro).
 455. **A. frontalis*, Kerremans, ibidem, Vol. 42, p. 322 (1898) (Congo).
 456. **A. benevolus*, nov. sp. (4) (Afrique orientale allemande).

(1) Long. 7; larg. 1,7 mm. — Allongé, légèrement élargi au tiers postérieur, le sommet un peu divergent; tête noire; pronotum rouge feu sombre; élytres vert foncé brillant presque noirs; dessous noir avec l'abdomen un peu verdâtre et très brillant, couvert dans les dépressions d'une villosité grise. — Tête étroite et sillonnée; pronotum à rides transversales, sans sillon médian ni carènes; élytres couverts de rugosités simulant des écailles, le sommet légèrement divergent et armé d'une courte dent suturale obtuse. — Dahomey.

(2) Long. 10,5; larg. 2,3. — Allongé, assez robuste, peu convexe en dessus, acuminé en arrière; épistome cuivreuse, tête verte; pronotum et élytres vert foncé et mats. Dessous vert brillant et pâle; abdomen cuivreuse rouge. — Tête subplane, vertex faiblement sillonné; pronotum ridé transversalement, impressionné sur les côtés en avant, sans sillon médian; écusson caréné; élytres séparément acuminés au sommet; villosité du dessous soyeuse, jaunâtre et peu dense. — Assinie, (Alluaud).

(3) Long. 9; larg. 2 mm. — Plus robuste et moins élancé que le *DAHOMEICUS* K., dont il a la coloration, mais moins acuminé en arrière, le pronotum avec deux fossettes superposées au milieu du disque, les élytres avec trois points villex et jaunes, l'un dans la dépression basillaire, l'autre presque imperceptible, au milieu, le troisième vers le quart postérieur. La région supérieure des segments abdominaux ornée de taches jaune clair visibles sur les côtés. Dessous couvert d'une courte villosité grise. — Afrique Centrale.

(4) Long. 11; larg. 2,5 mm. — Assez grand et assez convexe, robuste, vert foncé obscur et légèrement bronzé en dessus; dessous vert, l'abdomen bleu; les élytres ayant chacun un point villex et jaunâtre vers le quart postérieur et contre la suture. — Tête déprimée en arrière, vertex sillonné; pronotum ridé transversalement, vaguement déprimé en avant au milieu du disque; élytres couverts de rugosité simulant des écailles, le sommet séparément arrondi et dentelé. Dessous plus brillant que le dessus, les côtés de chacun des segments abdominaux 3, 4 et 5 ornés d'une tache purulente et blanche. — Afrique orientale allemande. (L. Fairmaire).

457. *A. nitens*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 322 (1898) (Libéria).
 458. *A. gravidus*, Kerremans, idem, Vol. 43, p. 285 (1899) (Cameroon).
 459. *A. subaeneus*, Kerremans, ibidem, Vol. 42, p. 323 (1898) (Congo).
 460. *A. capensis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 57 (1879) (Cap de Bonne-Espérance).
 461. *A. collaris*, Kerremans, Bull. Soc. Fr. p. 83, (1898) (Madagascar).
 462. *A. clavatus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 287 (1899) (Cameroon).
 463. *A. somalicus*, Kerremans, Ann. Mus Stor. Nat Genova, p. 109 (1096) (Abyssinie).
 464. *A. elongatulus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 33, pl. 1, f. 42 (1839) (Cap de Bonne-Esp.).
 465. *A. Baxi*, Castelnau & Gory, idem, p. 35, pl. 8, f. 45 (Sénégal).
 466. *A. suspectus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 342 (1900) (Zanguebar).
 * *subcornutus* || Kerremans, idem, Vol. 42, p. 325 (1898).
 467. **A. occisus**, nov. sp. (1) (Afrique orientale).
 468. *A. cornutus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 325 (1898) (Zanguebar).
 469. **A. notus**, nov. sp. (2) (Afrique Orientale).
 470. *A. griseopictus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 324 (1898) (Natal).
 471. *A. erraticus*, Kerremans, idem, Vol. 44, p. 341 (1900) (Cameroon).
 * *zonatus* || Kerremans, idem, Vol. 43, p. 287 (1899).
 472. *A. griseonotatus*, Kerremans, ibidem, p. 294 (Cameroon).
 473. *A. Kraatzi*, Kerremans, ibidem, p. 290 (Cameroon).
 474. *A. molivensis*, Kerremans, ibidem, Vol. 42, p. 325 (1898) (Tanganyka).
 475. **A. suberraticus**, nov. sp. (3) (Cap de Bonne-Espérance).
 476. *A. sumbuanus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 327 (1898) (Congo).
 477. *A. subdorsalis*, Kerremans, idem, Vol. 43, p. 290 (1899) (Cameroon).
 478. *A. togoensis*, Kerremans, ibidem, p. 295 (Togo).
 479. *A. striolatus*, Kerremans, ibidem, p. 291 (Cameroon).
 480. *A. infimus*, Kerremans, ibidem, p. 293 (Cameroon).
 481. **A. orbatus**, nov. sp. (4) (Cap de Bonne-Espérance).
 482. *A. aeneocupreus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 292 (1899) (Cameroon).
 483. *A. compressus*, Kerremans, idem, p. 296 (Cameroon).
 484. *A. triangularis*, Kerremans, ibidem, p. 289 (Cameroon).
 485. *A. gibbosus*, Kerremans, ibidem, p. 288 (Cameroon).
 486. *A. capicola*, Kerremans, ibidem, Vol. 42, p. 324 (1898) (Cap de Bonne-Espérance).
 487. *A. curvus*, Kerremans, ibidem, Vol. 43, p. 286 (1899) (Cameroon).
 488. *A. limvuanus*, Kerremans, ibidem, Vol. 42, p. 326 (1898) (Congo).
 489. **A. illibatus**, nov. sp. (5) (Afrique orientale).
 490. *A. Duvivieri*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 326 (Congo).

(1) Long. 7; larg. 1,7 mm. — Allongé, subcylindrique, atténué en arrière, tête et pronotum bronzé cuivreux brillant; élytres noir, brillants et rugueux, couverts de bandes sinuées grises vagues mais plus apparentes vers le sommet qu'en avant. Dessous bronzé cuivreux brillant. — Tête inégale, quadrituberculée, pronotum inégal et bossué; écusson caréné; élytres couverts de rugosités simulant des écailles, évidés le long de la suture, le sommet séparément arrondi et finement dentelé. Dessous rugueux; un point vilieux, jaunâtre et clair sur le côté de chacun des segments abdominaux 3, 4 et 5. — Afrique orientale. (Staudinger).

(2) Long. 5,2; larg. 1,7 mm. — Large, écourté, peu convexe; tête bronzé cuivreux rougeâtre; pronotum bronzé obscur et brillant; élytres bronzés sur les parties vilieuses et obscures sur les autres, le sommet rougeâtre, le tiers antérieur et une bande transversale antiers postérieur couverts d'une courte villosité soyeuse et jaune; deux points blancs, de chaque côté, sur la partie vilieuse antérieure. Dessous bronzé cuivreux rougeâtre. — Tête convexe et sillonnée; pronotum déprimé sur les côtés et le long de la base; écusson caréné; élytres séparément et largement arrondis et finement dentelés au sommet. — Afrique Orientale. (Staudinger).

(3) Long. 6,2; larg. 1,3 mm. — Allongé, un peu convexe en-dessus et d'un bronzé violacé obscur, couvert d'une villosité caduque, rare et annulée; dessous plus brillant, bronzé cuivreux. — Front peu convexe, sillonné; vertex bituberculé; pronotum avec une impression arrondie au dessus de l'écusson et impressionné de chaque côté; écusson caréné; élytres séparément arrondis et subacuminés au sommet, celui-ci dentelé. Villosité du dessous rare, purulente blanche. — Cap de Bonne Espérance. (Baron de Moffarts).

(4) Long. 5; larg. 1 mm. — Allongé, atténué en arrière, convexe en dessus, le front noir, le restant du corps d'un bronzé pourpré obscur plus clair et plus brillant en dessous; les élytres avec une bande suturale vilieuse et caduque, peu nette, d'un gris soyeux et s'étalant sur la région postérieure, mais d'une façon inégale. — Tête peu convexe, faiblement sillonnée; vertex vaguement bituberculé; pronotum ridé transversalement avec une impression arrondie au dessus de l'écusson, les côtés régulièrement arqués, l'arc assez tendu; élytres couverts de rugosités simulant de très petites écailles, le sommet atténué, séparément arrondi et finement dentelé. Dessous couvert d'une villosité courte, rare et espacée retenant une purulence blanche. — Cap de Bonne Espérance. (Baron de Moffarts).

(5) Long. 6,5; larg. 1,8 mm. — Assez épais, écourté, plan en dessous, atténué en arrière, d'un bronzé brillant, plus terne et verdâtre en dessous, cuivreux en dessous; les élytres ornés au sommet et contre la suture d'une courte villosité jaunâtre, peu nette. Dessous couvert d'une très courte villosité un peu dorée et très espacée. — Front peu convexe, ridé transversalement avec deux fossettes superposées au milieu du disque; écusson caréné; élytres couverts de rugosités simulant de petites écailles, le sommet séparément arrondi et dentelé. — Afrique orientale. (Staudinger).

491. **A. africanus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 293 (1899) (Cameroon).
 492. **A. aeneiceps*, Kerremans, idem, p. 294 (Togo).
 493. **A. Fauveli*, Kerremans, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 84 (1898) (Ile de la Réunion).
 494. **A. subazureus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 294 (1899) (Cameroon).
 495. **A. assinicus*, nov. sp. (1) (Assinie).
 496. **A. fidens*, nov. sp. (2) (Afrique orientale).
 497. **A. subrugosus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 292 (1899) (Cameroon).
 498. **A. subcutulus*, Kerremans, idem, p. 296 (Togo).
 499. **A. diversifrons*, Kerremans, ibidem, p. 291 (Cameroon).
 500. **A. levifrons*, Kerremans, ibidem, Vol. 44, p. 340 (1900) (Cap de Bonne-Espérance).
 501. *A. subfrontalis*, (Madagascar).
 * *frontalis* || Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 71, p. 350 (1902).
 502. *A. trochilus*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 10 (1897) (Djibouti).
503. *A. abditus*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 332 (1891) (États-Unis d'Amérique).
 504. *A. abdominalis*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond., p. 325 (1874) (Iles Philippines).
 505. *A. abductus*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 325 (1891) (États-Unis d'Amérique).
 506. *A. abjectus*, Horn, idem, p. 321 (États-Unis d'Amérique).
 507. *A. abstersus*, Horn, ibidem, p. 324 (États-Unis d'Amérique).
 508. *A. acceptus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 105, pl. 6, f. 12 (1889) (Guatémala).
 509. *A. acclivis*, Waterhouse, idem, p. 105, pl. 6, f. 13 (Guatémala).
 510. *A. aciculatus*, Waterhouse, ibidem, p. 71, pl. 5, f. 11 (Mexique).
 511. *A. aculeipennis*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 94 (1837) (Colombie).
 spinus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 61, pl. 13, f. 80 (1839).
 512. *A. acuminatus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 250, pl. 42, f. 243 (1841) (États-Unis d'Amérique).
 513. *A. acuticornis*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 10 (1897) (Caucase).
 514. *A. Adonis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 171 (1864) (Singapour).
 515. *A. adustellus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 66 (1879) (Brésil).
 516. *A. aeneellus*, Thomson, Typ. Bupr. p. 86 (1878) (Brésil).
 517. *A. aeneicollis*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 317 (1866) (Siam).
 518. *A. aeneipennis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 181 (1864) (Amboine).
 519. *A. aeneomaculatus*, H. Deyrolle, idem, p. 177 (Flores).
 520. *A. aequicollis*, Eschscholtz, Entom. Vol. 1, p. 78 (1822) (Luçon).
 521. *A. aereus*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 318 (1866) (Laos).
 522. *A. aerosus*, Ganglbauer, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 24, p. 33 (1890) (Chine).
 523. *A. aestimatus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 97 (1897) (Minas-Geraes).
 524. *A. affabilis*, Kerremans, idem, p. 94 (Rio de Janeiro).
 525. *A. affinis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 85 (1889) (Guatémala).
 526. *A. agnatus*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 820 (1892) (Birmanie).
 527. *A. albifrons*, Reitter, Wien. Ent. Zeit. Vol. 16, pl. 3, f. 5 (1897) (Hérat).
 528. *A. albogaster*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 175 (1864) (Bornéo).
 529. *A. albolatus*, H. Deyrolle, idem, p. 195 (Singapour).
 530. *A. albonotatus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 65 (1879) (Brésil).
 531. *A. albopictus*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 822 (1892) (Birmanie).
 532. *A. albopunctatus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 195 (1864) (Singapour).
 533. *A. albovittatus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 63 (1879) (Brésil).

(1) Long. 6,2; larg. 1,2 mm. — Plus allongé et plus svelte que le précédent (*ILLIATUS* K.), la coloration différente, d'un beau vert clair, un peu mat en dessus et brillant en dessous. — Tête convexe, sillonnée sur toute sa longueur; pronotum avec les impressions discales moins nettes et les rides transversales plus accentuées; élytres plus largement arrondis au sommet. — Assinie. (Ch. Alluaud).

(2) Long. 5; larg. 1,2 mm. — Petit, allongé, atténué en arrière, bronzé brillant, très légèrement verdâtre; les élytres avec une très étroite ligne villense et grise, très vague, le long de la suture, vers le sommet. — Tête assez convexe, sillonnée sur toute sa longueur; pronotum ridé transversalement, un peu plus large que long, ses côtés à peine arqués, le disque avec deux vagues impressions superposées, l'une, au dessus de l'écusson, longitudinale, l'autre, près de la marge antérieure, transversale; écusson caréné; élytres couverts de rugosités simulant de petites écailles, le sommet séparément arrondi, subacuminé et finement dentelé. Dessous couvert d'une courte villosité grise, très espacée. — Afrique orientale. (Staudinger).

534. *A. Alemani*, Dugès, La Natureza, Vol. 2, p. 33, pl. 2, f. 55 (1891) (Brésil).
 535. *A. allectorellus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 69 (1879) (Brésil).
 536. ***A. ambiguellus*** (Sikkim).
 ambiguus || Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 220 (1895).
 537. *A. amethysticollis*, H. Deyrolle, idem, p. 8, p. 192 (1864) (Dorey).
 538. *A. amethystopterus*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 342 (1890) (Caucase).
 539. *A. amicus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 161 (1864) (Singapour).
 540. *A. amplicollis*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 68 (1888) (Bengale).
 541. *A. angelicus*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 298 (1891) (États-Unis d'Amérique).
 542. *A. angulatus*, Fabricius, Ent. Syst. Supp. p. 136 (1798) (Inde).
 543. *A. antepodex*, Thomson, Typ. Bupr. p. 85 (1878) (Brésil).
 544. *A. anthracinus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 196 (1864) (Mysol).
 545. *A. antiquus*, Mulsant, Opus. Ent. f. 13, p. 19 (1863) (France méridionale).
 546. *A. apicalis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 74 (1889) (Amérique centrale).
 547. *A. apicatus*, Waterhouse, idem, p. 96, pl. 6, f. 2 (Guatemala).
 548. *A. araxicola*, Abeille, Rev. Ent. Caen. p. 11 (1897) (Caucase).
 549. *A. areolatus*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 229 (1898) (Madagascar).
 550. *A. Ascanius*, H. Deyrolle, idem, Vol. 8, p. 159 (1864) (Céram).
 551. *A. ascendens*, Abeille, Bull. Soc. Fr. p. 125 (1895) (Antiliban).
 552. *A. asperulus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 101, pl. 6, f. 7 (1889) (Mexique).
 553. *A. atripennis*, Chevrolat, Col. Mex. Cent. 6, p. 141 (1835) (Mexique).
 554. *A. atriplicis*, Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 33 (1900) (Algérie).
 555. *A. audax*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 300 (1891) (États-Unis d'Amérique).
 556. *A. auratus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 209 (1864) (Arou).
 557. *A. aureoviridis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 118, pl. 7, f. 6 (1889) (Mexique).
 558. *A. auripes*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 180 (1864) (Mysol).
 559. *A. auripilis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 167 (1864) (Bornéo).
 560. *A. auritus*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 93 (1835) (Brésil).
 561. *A. auriventris*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 517 (1873) (Japon).
 562. *A. aurovittatus*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 218 (1846) (Australie).
 563. *A. balaenoides*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 66, pl. 5, f. 4 (1889) (Mexique).
 564. *A. barbatus*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 34 (1897) (Caucase).
 565. *A. Baroni*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 23, pl. 5, f. 27 (1839) (Mexique).
 566. *A. basilaris*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 91 (1889) (Panama).
 567. *A. bellus*, Waterhouse, idem, p. 80, pl. 5, f. 18 (Panama).
 568. *A. bicolorellus*, Thomson, Typ. Bupr. p. 90 (1878) (Mexique).
 569. *A. bidentulus*, Ganglbauer, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 24, p. 31 (1890) (Chine).
 570. *A. bifenestratus*, Thomson, Typ. Bupr. p. 86 (1878) (Brésil).
 571. *A. bihamatus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 189 (1864) (Bornéo).
 572. *A. biimpressus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 91 (1889) (Mexique).
 573. *A. bimaculatus*, Dugès, La Natureza (2), Vol. 2, p. 26, pl. 2, f. 40 (1891) (Mexique).
 574. *A. binominatus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 341 (1900) (Bengale).
 villosotriatus || Kerremans, idem, Vol. 32, p. 214 (1892).
 var. carmineus, Kerremans, ibidem, p. 214.
 575. *A. birmanicus*, Kerremans, ibidem, p. 211 (Birmanie).
 576. *A. Blanchardi*, Saunders, Cat. Bupr. p. 115, n° 59 (1871) (Patagonie).
 ater || Blanchard, Voy. Orbigny, p. 154 (1846).
 577. *A. Borrei*, Dugès, La Natureza (2) Vol. 2, p. 24, pl. 2, f. 36 (1891) (Mexique).
 578. *A. Bonvouloiri*, Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) Vol. 2, p. 109, pl. 8, f. 2 (1868) (Afrique occid.).
 579. *A. Brancsiki*, Nonfried, Berl. Ent. Zeit. p. 305 (1895) (Tabora).
 580. *A. brevicollis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 352 (1894) (Madagascar).
 581. *A. brevicornis*, Guérin, Rev. Zool. p. 328 (1840) (Indes Orientales).
 582. *A. brunnellus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 61 (1879) (Brésil).
 583. *A. brunneipennis*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 96 (1837) (Mexique).

584. *A. caliginosus*, Dugès, La Natureza (2) Vol. 2, p. 29, pl. 2, f. 46 (1891) (Mexique).
 585. *A. campestris*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 205 (1864) (Amboine).
 586. *A. capitatus*, H. Deyrolle, idem, p. 179 (Singapour).
 587. *A. carbonarius*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 188 (1864) (Céram).
 588. *A. carinellus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 61 (1879) (Amazones).
 589. *A. carinifer*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 82 (1889) (Amérique centrale).
 590. *A. carmineus*, Dugès, La Natureza (2) Vol. 2, p. 34, pl. 2, f. 57 (1891) (Mexique).
 591. *A. caschmirensis*, Kollar, Hüg. Kaschm. Vol. 4, p. 505 (1844) (Cachemire).
 592. *A. caucasicolus*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 341 (1890) (Caucase).
 593. *A. caudatus*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 108 (1837) (Brésil).
 594. *A. caviceps*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 341 (1900) (Obock).
 cavifrons || Fairmaire, Rev. Entom. Caen, p. 100 (1892).
 595. *A. cavifrons*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 189, pl. 9, f. 18 (1889) (Mexique).
 596. *A. celebiensis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 175 (1864) (Menado).
 597. *A. centralis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 66, pl. 5, f. 3 (1889) (Guatémala).
 598. *A. cephalicus*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. p. 249 (1860) (Etats-Unis d'Amérique).
 599. *A. cephalotes*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 93, pl. 5, f. 23 (1889) (Mexique).
 600. *A. cerinoguttatus*, Chevrolat, Col. Mex. fasc. 6, n° 142 (1835) (Mexique).
 601. *A. cervicornis*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 22 (1897) (Algérie).
 602. *A. chalcoventrifrons*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 219, pl. 36, f. 210 (1841) (Cap Bonne-Espérance).
 603. *A. chalybeus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 193 (1864) (Dorey).
 604. *A. Chevrolati*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 98 (1889) (Mexique).
 605. *A. chlorus*, Dugès, La Natureza (2), Vol. 2, p. 35, pl. 2, f. 59 (1891) (Mexique).
 606. *A. Chobauti*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 22 (1897) (Algérie).
 607. *A. chrysicollis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 148 (1864) (Batchian).
 608. *A. chrysochloris*, H. Deyrolle, idem, p. 200 (Bourou).
 609. *A. chrysoderes*, Abeille, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 283 (1891) (Syrie).
 610. *A. chrysophanus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 212, pl. 35, f. 202 (1841) (Mexique).
 611. *A. ciliatipes*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 170 (1864) (Singapour).
 612. *A. citronolatus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 64 (1879) (Brésil).
 613. *A. coelestis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 156 (1864) (Flores).
 614. *A. coeruleicollis*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 319 (1866) (Siam).
 615. *A. coeruleodepilis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 60 (1879) (Cayenne).
 616. *A. colluviellus*, Thomson, idem, p. 69 (Brésil).
 617. *A. columbianus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 453, pl. 42, f. 246 (1841) (Colombie).
 618. *A. concavus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 203 (1864) (Nouvelle-Guinée).
 619. *A. concinnus*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 310 (1891) (Etats-Unis d'Amérique).
 620. *A. confinis*, Faldermann, Mém. Acad. Petropol. Vol. 2, p. 360 (1835) (Chine boréale).
 621. *A. conformis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 227, pl. 37, f. 218 (1841) (Cayenne).
 622. *A. confusus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 104, pl. 6, f. 11 (1889) (Panama).
 623. *A. conicus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 251, pl. 22, f. 224 (Brésil).
 624. *A. consimilis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 95, pl. 6, f. 1 (1889) (Guatém.).
 625. *A. consobrinus*, Dugès, La Natureza (2), Vol. 2, p. 32, pl. 2, f. 51 (1891) (Mexique).
 626. *A. consularis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 105 (1897) (Sainte-Catherine).
 627. *A. cordillerae*, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 18, p. 347 (1873) (Pérou).
 628. *A. correctus*, Thomson, Typ. Bupr. p. 90 (1878) (Guatémala).
 629. *A. costulatus*, Harold, Mon. Berl. Akad. p. 219 (1878) (Zanzibar).
 630. *A. coxalis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 89 (1889) (Amérique centrale).
 631. *A. crapulellus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 71 (1879) (Colombie).
 632. *A. credulus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 61 (1897) (Rio).
 633. *A. cribricollis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 70, pl. 5, f. 8 (1889) (Mexique).
 634. *A. crinicollis*, Horn, Trans. Ent. Soc. Vol. 18, p. 294 (1891) (Etats-Unis d'Amérique).
 635. *A. croaticus*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 21 (1897) (Croatie).
 636. *A. croceomaculatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 111, pl. 6, f. 23 (1889) (Guat.).

637. *A. croceovittatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 111 (Amérique centrale).
 638. *A. clenocerus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 247, pl. 41, f. 239 (1841) (Brésil).
 639. *A. cuneiformis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 187 (1864) (Mysol).
 640. *A. cupai*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 245, pl. 41, f. 237 (1841) (Colombie).
 641. *A. cupes*, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 336 (1892) (Japon).
 642. *A. cupidus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 124 (1897) (Bahia).
 643. *A. cupreiceps*, Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. p. 258 (1859) (Ceylan).
 644. *A. cupreolus*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 248 (1860) (Kansas).
 645. *A. cupreomaculatus*, Dugès, La Natureza (2), Vol. 2, p. 30, pl. 2, f. 48 (Mexique).
 646. *A. cuprescens*, Ménétries, Cat. p. 154 (1832) (Caucase).
 647. *A. cuprescensellus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 63 (1879) (Brésil).
 648. *A. cupricauda*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 520 (1867) (Penang).
 649. *A. cuprifrons*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 159 (1864) (Célèbes).
 650. *A. cupripes*, H. Deyrolle, idem, p. 149 (Céram).
 651. *A. cuspidatus*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 364 (1851) (Natal).
 652. *A. cyaneomicans*, Nonfried, Ent. Nachr. p. 91 (1892) (Chine méridionale).
 653. *A. cyanicollis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 174 (1864) (Morty).
 654. *A. cyanipennis*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 92 (1837) (Cayenne).
 655. *A. cyanopterus*, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 212 (1801) (Brésil).
 656. *A. Darwini*, Wollaston, Cat. Col. Madeira, p. 82 (1857) (Madère).
 657. *A. deauratus*, Mac Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, Vol. 2, p. 249 (1872) (Gayndah).
 658. *A. debilis*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 358 (1851) (Gariep).
 659. *A. decoloratus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 213 (1892) (Bengale).
 660. *A. Dejeani*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 57 (1879) (Mexique).
 661. *A. delectabilis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 119, pl. 7 f. 8 (1889) (Nicaragua).
 662. *A. deletus*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 362 (1896) (Mentawai).
 663. *A. delicatulus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 191 (1889) (Mexique).
 664. *A. delphinensis*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 12 (1897) (France).
 665. *A. denticornis*, Chevrolat, Ann. Soc. Fr. p. 586 (1867) (Cuba).
 666. *A. denticulatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 78, pl. 5, f. 16 (1889) (Amér. centr.).
 667. *A. dentifer*, Waterhouse, idem, p. 74, pl. 5, f. 13 (Mexique).
 668. *A. dentipes*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 153 (1864) (Batchian).
 669. *A. Deyrollei*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 1, p. 255 (1892) (Nouvelle Guinée).
 elongatus ||, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 151, (1864).
 670. *A. diadema*, H. Deyrolle, idem, p. 163 (Bornéo).
 671. *A. dianthus*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 823 (1892) (Birmanie).
 672. *A. dimidiatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 107, pl. 6, f. 18 (1889) (Panama).
 673. *A. Dionides*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 72 (1879) (Inde).
 674. *A. discoidalis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 68, pl. 5, f. 7 (1889) (Mexique).
 675. *A. dissimilis*, Waterhouse, idem, p. 123, pl. 7, f. 13 (Mexique).
 676. *A. distans*, Waterhouse, ibidem, p. 64 et 188, pl. 5, f. 2 (Mexique).
 677. *A. distinctus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 200 (1864) (Bornéo).
 678. *A. divaricatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 64, pl. 4, f. 16 (1889) (Mexique).
 679. *A. divergens*, Thomson, Typ. Bupr. p. 84 (1878) (Guatemala).
 680. *A. diversus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 60, pl. 4, f. 11 (1887) (Mexique).
 681. *A. docilis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 77 (1897) (Bahia).
 682. *A. dorsalis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 180 (1864) (Mysol).
 683. *A. electus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 64 (1897) (Bahia).
 684. *A. elegans*, Mulsant, Opusc. Ent. Vol. 13, p. 14 (1863) (France méridionale).
 685. *A. epistomalis*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 13 (1897) (Moravie).
 686. *A. ethlius*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 238, pl. 31, f. 229 (1841) (Himalaya).
 687. *A. eupalamus*, Gory, idem, p. 217, pl. 37, f. 207 (Colombie).
 688. *A. excisus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 70, pl. 5, f. 6 (1889) (Panama).
 689. *A. exiguus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 106 (1897) (Bahia).

690. *A. exilis*, Roth, Wieg. Arch. Naturg. Vol. 1, p. 119 (1851) (Abyssinie).
 691. *A. exustus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 62, pl. 4, f. 13 (Mexique).
 692. *A. Fahrei*, Saunders, Cat. Bupr. p. 125, n° 358 (1871) (Caffrerie).
 acutipennis || Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 346 (1851).
 693. *A. Fairmairei*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 1, p. 256 (1892) (Chine).
 obscuripennis || Fairmaire, Rev. Ent. Caen, Vol. 7, p. 120 (1888).
 694. *A. falcipes*, Roth, Wieg. Arch. Naturg. Vol. 1, p. 119 (1851) (Abyssinie).
 695. *A. fasciatellus*, Thomson, Typ. Bupr. p. 87 (1878) (Brésil).
 696. *A. fasciolatus*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 101 (1837) (Brésil).
 697. *A. felix*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 326 (1891) (Etats-Unis d'Amérique).
 698. *A. femoralis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 92, pl. 5, f. 22 (1889) (Guatém.).
 699. *A. filiformis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 68, pl. 15, f. 90 (1839) (Sénégal).
 700. *A. filosellus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 67 (1879) (Brésil).
 701. *A. fissiformis*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 9 (1897) (Carpathes).
 702. *A. flavoguttatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 112 (1889) (Guatémala).
 703. *A. flavotaeniatus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1, p. 73 (1879) (Australie).
 704. *A. fortunatus*, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 333 (1892) (Japon).
 705. *A. fosseicollis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 71 (1879) (Guatémala?).
 706. *A. fossiger*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 117, pl. 7, f. 5 (1889) (Mexique).
 707. *A. foveicollis*, Harold, Col. Hefte, Vol. 5 (1869) (Transbaïkal).
 impressicollis || Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 454 (1865).
 708. *A. frater*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 155 (1864) (Makian).
 709. *A. fraternus*, Dugès, La Nature (2) Vol. 2, p. 31, pl. 2, f. 49 (1891) (Mexique).
 710. *A. fraudatorellus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 69 (1879) (Brésil).
 711. *A. Frenchi*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 302 (1891) (Victoria).
 712. *A. fulgens*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 243 (1860) (Missouri).
 713. *A. fulgidiceps*, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 113 (1861) (Ceylan).
 714. *A. funestus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 221, pl. 36, f. 212 (1841) (Mexique).
 715. *A. fuscipennis*, Gory, idem, p. 238, pl. 39, f. 230 (Etats-Unis d'Amérique).
 716. *A. fuscosericeus*, Daniel, Col. Stud. Vol. 2, p. 66 (1899) (Europe).
 717. *A. Ganglbaueri*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 344 (1890) (Caucase).
 718. *A. giloloensis*, Saunders, Cat. Bupr. p. 123, n° 288 (1871) (Gillo).
 incertus || H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 182 (1864).
 719. *A. glabratus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 115 (1889) (Guatémala).
 719a. *A. Goryellus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 61 (1879) (Brésil).
 720. *A. Goryi*, Saunders, Cat. Bupr. p. 114, n° 29 (1871) (Brésil).
 mucronatus || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 12, pl. 2, f. 12 (1839).
 721. *A. Gounellei*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 55 (1897) (Bahia).
 722. *A. gracilipes*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 81 (1889) (Amérique centrale).
 723. *A. gracilis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 197 (1864) (Makian).
 724. *A. gracilitarsis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 109, pl. 6, f. 20 (1889) (Guatém.).
 725. *A. granulatus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 19, pl. 4, f. 21 (Sénégal).
 726. **A. grassator** (Chine).
 gracilicornis || Ganglbauer, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 24, p. 35 (1890).
 727. *A. gravis*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 247 (1860) (Etats-Unis d'Amérique).
 728. *A. griseus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 184 (1864) (Makian).
 729. *A. guttulatus*, H. Deyrolle, idem, p. 190 (Batchian).
 730. *A. hastulatus*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 356 (1851) (Natal).
 capensis, Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), Vol. 2, p. 108 (1868).
 731. *A. hemiphanes*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 467 (1865) (France Méridionale).
 732. *A. hibisci*, Montrouzier, Ann. Soc. Linn. Lyon, Vol. 7, p. 78 (1855) (Woodlark).
 733. *A. Hildebrandti*, Harold, Mon. Akad. Wiss. Berl. p. 219 (1878) (Zanzibar).
 734. *A. hirsutulus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 210 (1864) (Waigiou).
 735. *A. Horni*, Kerremans, idem, Vol. 44, p. 341 (1900) (Etats-Unis d'Amérique).
 Blanchardi || Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 305 (1891).

736. *A. humerosus*, Fairmaire, Rev. Zool. p. 182 (1850) (Taïti).
 737. *A. hypericicola*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 138 (Algérie).
 738. *A. hypocritus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 3, p. 198 (1864) (Batchian).
 739. *A. ichthyocerus*, Perty, Del. Anim. p. 19, pl. 4, f. 13 (1830) (Brésil).
 740. *A. ignarus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 104 (1897) (Minas-Geraes).
 741. *A. igneosignatus*, Dugès, La Natureza (2) Vol. 2, p. 47 (1891) (Mexique).
 742. *A. ignicaudatellus*, Thomson, Typ. Bupr. p. 87 (1878) (Brésil).
 743. *A. ignifrons*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 150 (1864) (Bourou).
 744. *A. ignipennis*, Lucas, Voy. Casteln. p. 66, pl. 4, f. 8 (1859) (Minas-Geraes).
 745. *A. ignotus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 98, pl. 6, f. 3 (1889) (Mexique).
 746. *A. imbellis*, Crotch, Proc. Acad. Philad. p. 94 (1873) (Etats-Unis d'Amérique).
 747. *A. imbricatus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 223, pl. 37, f. 214 (1841) (Cap de Bonne-Espér.).
 748. *A. imitans*, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 332 (1892) (Japon).
 749. *A. immaculatellus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 66 (1879) (Brésil).
 750. *A. immaculifrons*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 65 (1889) (Guatemala).
 751. *A. impopularis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 199 (1864) (Bornéo).
 752. **A. importunus** (Bengale).
 imbellis || Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 215 (1892).
 753. *A. impressifrons*, Kiesenwetter, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 23, p. 254 (1879) (Amour).
 754. *A. impressipennis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 68 (1879) (Brésil).
 755. *A. impressus*, Chevrolat, Col. Mex. Centr. (2), p. 145 (1835) (Mexique).
 756. *A. inaequalis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 59, pl. 4, f. 10 (1889) (Nicaragua).
 757. *A. inamoenus*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 824 (1892) (Birmanie).
 758. *A. incerticolor*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 170 (1864) (Bornéo).
 759. *A. incertus*, Chevrolat, Col. Mex. Centr. 2, p. 138 (1835) (Mexique).
 760. *A. inclinatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 62, pl. 5, f. 1 (1889) (Mexique).
 761. *A. indigaceus* H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 161 (1864) (Nouvelle-Guinée).
 762. *A. indulgens*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 76 (1897) (Bahia).
 763. *A. ineditus*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 97 (1837) (Colombie).
 764. *A. ineptus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 218 (1892) (Bengale).
 765. *A. infelix*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 265, pl. 44, f. 259 (1841) (Brésil).
 766. *A. inhabilis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 341 (1900) (Californie).
 ineptus || Horn, Calif. Acad. (2) Vol. 4, p. 378 (1841).
 767. *A. inquinatus*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 226 (1874) (Iles Philippines).
 768. *A. insipidus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 162 (1864) (Singapour).
 769. *A. interruptus*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 246 (1860) (Etats-Unis d'Amérique).
 770. *A. Iris*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 273, pl. 46, f. 267 (1841) (Brésil).
 771. *A. irrequietus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 70 (1879) (Cayenne).
 772. *A. irroreus*, Harold, Col. Heft. Vol. 5 (1869) (Siam).
 leucostictus || Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 317 (1866).
 773. *A. jacobinus*, Horn, Trans. Am. Ent. Soc. Vol. 18, p. 314 (1891) (Etats-Unis d'Amérique).
 774. *A. junceus*, Pallas, Icon. Ins. p. 65, pl. D, f. 5 (1781) (Indes orientales).
 775. *A. juxtasuturalis*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 21 (1897) (Caucase).
 776. *A. kandaricus*, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genov. Vol. 9, p. 360 (1877) (Célèbes).
 777. *A. Kerremansi*, Dugès, La Natureza (2) Vol. 2, p. 32, pl. 2, f. 52 (1891) (Mexique).
 778. *A. Lacordairei*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 63, pl. 14, f. 82 (1839) (Cayenne).
 779. *A. lacrymans*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 274 (1895) (Syrie).
 egens || Abeille, idem, p. 123.
 780. *A. laetabilis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 70 (1897) (Minas Geraes).
 781. *A. laeticeps*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 342 (1891) (Caucase).
 782. *A. laetulus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 93, pl. 5, f. 25 (1889) (Guatemala).
 783. *A. laetus*, Waterhouse, idem, p. 67, pl. 5, f. 5 (Mexique).
 784. *A. laevipennis*, Waterhouse, ibidem, p. 65 (Mexique).
 785. *A. La Fertei*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 212 (1892) (Bengale).

786. *A. lancifer*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 169 (1864) (Bornéo).
787. *A. languidus*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 92 (1837) (Brésil).
longulus, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 229, pl. 38, f. 220 (1841).
788. *A. lateralis*, Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 3, p. 169 (1823) (États-Unis d'Amérique).
Sayi, Saunders, Cat. Bupr. p. 126, n° 393 (1871).
789. *A. laticaudatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 72, pl. 5, f. 9 (1889) (Panama).
790. *A. laticeps*, Waterhouse, idem, p. 113, pl. 6, f. 25 (Guatémala).
791. *A. latifrons*, Waterhouse, idem, p. 191 (Mexique).
792. *A. laudabilis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 95 (1897) (Minas Geraes).
793. *A. lentulus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 73, pl. 5, f. 12 (1889) (Mexique).
794. **A. Lewisi** (Japon).
brevitarsis || Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 337 (1892).
795. **A. Lewisiellus** (Japon).
gracilipes || Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 325 (1892).
796. *A. lineellus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 214, pl. 35, f. 204 (1841) (Brésil).
797. *A. lobiceps*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 125 (1895) (Syrie).
798. *A. longicollis*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 315 (1866) (Siam).
799. *A. longiusculus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 68, pl. 15, f. 91 (1839) (Brésil).
800. *A. lucidicollis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 244, pl. 40, f. 236 (1841) (Brésil).
801. *A. maculatus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 17, pl. 3, f. 18 (1839) (Pérou).
802. *A. maculicollis*, Castelnau & Gory, idem, p. 37, pl. 9, f. 49 (Guinée).
803. *A. maculifer*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 514 (1873) (Japon).
804. *A. maculifrons*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 246, pl. 41, f. 238 (1841) (Brésil).
805. *A. maculiventris*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 158 (1864) (Batchian).
806. *A. manatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 76, pl. 5, f. 14 (1889) (Mexique).
807. *A. marginatus*, Waterhouse, idem, p. 99 (Mexique).
808. *A. marginicollis*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 516 (1873) (Japon).
809. *A. marmoreus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 201 (1864) (Batchian).
810. *A. melanopterus*, Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 11, p. 277 (1876) (Sibérie orientale).
811. *A. melas*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 363 (1896) (Mentawai).
812. *A. mendicus*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 360 (1851) (Gariep).
813. *A. Mephistopheles*, Abeille, Rev. Ent. Caen. p. 23 (1897) (Europe).
814. *A. meracus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 122 (1867) (Bahia).
815. *A. metallescens*, Dugès, La Naturelle (2), Vol. 2, p. 26, pl. 2, f. 39 (1891) (Mexique).
816. *A. meticulous*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 185 (1864) (Célèbes).
817. *A. mexicanus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 267, pl. 45, f. 262 (1841) (Mexique).
818. *A. minor*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 171 (1864) (Bornéo).
819. *A. Minos*, H. Deyrolle, idem, p. 168 (Bornéo).
820. *A. minusculus*, Marseul, L'Abeille. Vol. 2, p. 493 (1865) (Autriche).
821. *A. miserabilis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 194 (1864) (Makian).
822. *A. mixtus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 217 (1892) (Bengale).
823. *A. modestulus*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 29, p. 247 (Transcaucasie).
824. *A. modestus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 22, pl. 5, f. 29 (1839) (Brésil).
825. *A. Modiglianü*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 529 (1894) (Sumatra).
826. *A. moerens*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 517 (1873) (Japon).
827. *A. moestus*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 230 (1898) (Madagascar).
828. *A. molestus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 83, pl. 5, f. 20 (1889) (Panama).
829. *A. molitor*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 28 (1897) (Algérie).
830. *A. monotonus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 70 (1878) (Brésil).
831. *A. morio*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 220 (1895) (Kurseong).
832. *A. morosus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 35, pl. 8, f. 46 (1839) (Brésil).
833. *A. mucronatus*, Klug, Ent. Brazil. p. 8, pl. 40, f. 7 (1827) (Brésil).
834. *A. mundus*, Abeille, L'Echange, p. 91 (1894) (Algérie).
835. *A. Munieri*, Brisout, Rev. Ent. Caen, Vol. 2, p. 83 (1883) (Telessa).

836. *A. Murrayi*, Saunders, Cat. Bupr. p. 126, n° 368 (1871) (Cote d'Or).
ignicolis || Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. Vol. 2, p. 107, pl. 8, f. 1 (1868).
837. *A. nanus*, Dugès, La Natureza, (2), Vol. 2, p. 33, pl. 2, f. 56 (1891) (Mexique).
838. *A. neelgheriensis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 218 (1892) (Bengale).
839. *A. nevadensis*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 303 (1891) (Etats-Unis d'Amérique).
840. *A. niger*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 58, pl. 13, f. 75 (1839) (Brésil).
841. *A. nigerellus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 62 (1879) (Brésil).
842. *A. nigerrimus*, H. Deyrolle, Ann. Ent. Belg. Vol. 8, p. 204 (1864) (Mysole).
843. *A. nigriventris*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 23 (1897) (France).
844. *A. nigroaeneus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 176 (1864) (Waigiou).
845. *A. nigrocinctus*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 325 (1874) (Iles Philippines).
846. *A. nigrocyanus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 172 (1864) (Bornéo).
847. *A. nigroviolaceus*, H. Deyrolle, idem, p. 195 (Waigiou).
848. *A. nitidicollis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 79, pl. 5, f. 15 (1889) (Guatém.).
849. *A. niveoguttatus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 210 (1892) (Bengale).
850. *A. nobilis*, Burmeister, Stett. Ent. Zeit. Vol. 33, p. 385 (1872) (Buenos-Ayres).
851. *A. nodifrons*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 68 (1889) (Mexique).
852. *A. Nonfriedi*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 342 (1900) (Chine).
violaceus || Nonfried, Ent. Nachr. p. 90 (1892).
853. *A. novus*, Dugès, La Natureza (2), Vol. 2, p. 34, pl. 2, f. 58 (1891) (Mexique).
854. *A. obliquus*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 243 (1860) (Canada).
855. *A. oblitus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 189, pl. 9, f. 19 (1889) (Nicaragua).
856. *A. obolinus*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 248 (1860) (Nouveau-Mexique).
857. *A. obscurus*, Thomson, Typ. Bupr. p. 87 (1878) (Brésil).
858. *A. obscurus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 193 (1864) (Batchian).
859. *A. observans*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 79, pl. 5, f. 17 (1889) (Panama).
860. *A. obtusus*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 288 (1891) (Brésil).
861. *A. octonotatus*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 316 (1866) (Laos).
862. *A. ocularis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 179 (1864) (Bornéo).
863. *A. oculatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 60 (1889) (Mexique).
864. *A. Œdipus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 160 (1864) (Bornéo).
865. *A. olympicus*, H. Deyrolle, idem, page 183 (Mysole).
866. *A. opacipennis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 192 (1889) (Mexique).
867. *A. Orbignyi*, Saunders, Cat. Bupr. p. 115, n° 60 (1871) (Bolivie).
spinosus || Blanchard, Voy. d'Orbigny, Col. p. 153 (1846).
868. *A. orientalis*, Harold, Col. Hefte, Vol. 5 (1869) (Indes orientales).
cyanipennis || Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 18, pl. 4, f. 20 (1839).
insignis, Saunders, Cat. Bupr. p. 122, n° 232 (1871).
869. *A. ornativentris*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 315 (1866) (Laos).
870. *A. ostrinus*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 819 (1892) (Birmanie).
871. *A. owas*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 65, pl. 14, f. 86 (1839) (Madagascar).
octosignatus || Castelnau & Gory, idem, p. 32, pl. 7, f. 41.
872. *A. pacificus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 64 (1879) (Brésil).
873. *A. paganus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 184 (1864) (Bornéo).
874. *A. palmaricollis*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 326 (1891) (Etats-Unis d'Amérique).
875. *A. panchlorus*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 24 (1897) (Italie).
876. *A. papuanus*, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 359 (1877) (Nouvelle Guinée).
877. *A. paradoxus*, Boheman, Eugen. Res. Ent. p. 64 (1858) (Rio-Janeiro).
878. *A. parallelus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 191 (1864) (Morty).
879. *A. parvus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 106, pl. 6, f. 16 (1889) (Mexique).
- 879a. *A. pauciguttatus*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 519 (1867) (Penang).
880. *A. pauper*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 198 (1864) (Morty).
881. *A. pavidus*, Fabricius, Ent. Syst. Vol. 1, p. 214 (1794) (Europe).
882. *A. pectoralis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 85 (1889) (Mexique).

883. *A. pensus*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 305 (1891) (Etats-Unis d'Amérique).
 884. *A. perangustus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 124 (1897) (Pernambuco).
 885. *A. peregrinus*, Kiesenwetter, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 33, p. 145 (1879) (Amour).
 886. *A. perlucidus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 217, pl. 36 f. 208 (1841) (Mexique).
 887. *A. perniciosus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 199 (1864) (Bornéo).
 888. *A. perplexus*, Burmeister, Stett. Ent. Zeit. Vol. 33, p. 386 (1872) (Parana).
 889. *A. pertenuis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 120 (1867) (Bahia).
 890. *A. pictipennis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 38, pl. 9, f. 60 (1839) (Brésil).
 891. *A. pictus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 59 (1897) (Bahia).
 892. *A. pilicauda*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 326 (1874) (Iles Philippines).
 893. *A. piliventris*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 157 (1864) (Bornéo).
 894. *A. pilosellus*, Thomson, Typ. Bupr. p. 90 (1878) (Mexique).
 896. *A. pilosus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 188, pl. 9, f. 17 (1889) (Mexique).
 897. *A. pinguis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 69 (1897) (Pernambuco).
 898. *A. Pinii*, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 360 (1877) (Nouvelle-Guinée).
 899. *A. piscis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 207, pl. 34, f. 197 (1841) (Colombie).
 900. *A. placens*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 103 (1897) (Rio Janeiro).
 901. *A. plagiatus*, Ganglbauer, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 24, p. 31 (1890) (Chine).
 902. *A. planiceps*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 25 (1897) (France).
 903. *A. planipennis*, Fairmaire, idem, Vol. 7, p. 121 (1888) (Chine).
 904. *A. plebejus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 196 (1864) (Sumatra).
 905. *A. plicaticollis*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 32 (1888) (Bengale).
 906. *A. plicipennis*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 231 (1898) (Madagascar).
 907. *A. plumbeus*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 247 (1860) (Canada).
 908. *A. plutonicellus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 64 (1879) (?).
 909. *A. praecipuus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 60 (1897) (Minas Geraes).
 910. *A. prasinus*, Mulsant, Opusc. Ent. Vol. 13, p. 17 (1863) (Lyon).
 911. *A. pretiosus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 203 (1864) (Batchian).
 912. *A. prionurus*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 95 (1837) (Mexique).
 913. *A. profugellus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 68 (1879) (Brésil).
 914. *A. Proteus*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 137 (1893) (Algérie).
 915. **A. protractus** (Lyon).
proximus || Bauduer, Bull. Soc. Toulouse, Vol. 12, p. 80 (1881).
 916. *A. pruinosulus*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 19 (1897) (France).
 917. *A. pruinosus*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 99 (1835) (Brésil).
 918. *A. puberulus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 209 (1864) (Bornéo).
 919. *A. pudens*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 108 (1897) (Pernambuco).
 920. *A. puellus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 24, pl. 5, f. 29 (1839) (Brésil).
 921. *A. pugionellus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 66 (1879) (Brésil).
 922. *A. pulcher*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 327 (1874) (Iles Philippines).
 923. *A. pullulus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 104, pl. 6, f. 10 (1889) (Mexique).
 924. *A. pulvereus*, Abeille, Bull. Soc. Fr. p. 123, (1895) (Portugal).
 925. *A. pulverosus*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 97 (1837) (Brésil).
 926. *A. punctatissimus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 107 (1889) (Mexique).
 927. *A. punctifrons*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 149 (1864) (Mysol).
 928. *A. pupillus*, H. Deyrolle, idem, p. 198 (Flores).
 929. *A. purpureus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 1, p. 269 (1892) (Mexique).
purpureus || Dugès, La Naturelleza, (2), Vol. 2, p. 32, pl. 2, f. 53 (1891).
 930. *A. purpureus*, Thunberg, Nov. Act. Upsal. Vol. 9, p. 51 (1827) (Cap de Bonne-Espérance).
proximus, Saunders, Cat. Bupr. p. 126, no 366 (1871).
 931. *A. putillus*, Say, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 6, p. 163 (1839) (Etats-Unis d'Amérique).
 932. *A. pygmaeus*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 353 (1851) (Limpopo).
 933. *A. quadricolor*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 164 (1864) (Sumatra).
 934. *A. quadricostatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 122, pl. 7, f. 11 (1889) (Mexique).

935. *A. quadrifossulatus*, Fairmaire & Germain, Ann. Soc. Fr. p. 740 (1858) (Chili).
 936. *A. quadriguttatellus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 67 (1879) (Brésil).
 937. *A. quadrimaculatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 116, pl. 7, f. 3 (1889) (Am. centr.).
 938. *A. quadrisignatus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 444 (1865) (Sibérie).
 939. *A. rarus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 65 (1897) (Minas Geraes).
 940. *A. ratus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 103, pl. 6, f. 9 (1889) (Guatémala).
 941. *A. rectus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 152 (1864) (Amboine).
 942. *A. refectus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 105, pl. 6, f. 15 (1889) (Guatémala).
 943. *A. Reitteri*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 16 (1897) (Caucase).
 944. *A. restrictus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 119, pl. 7, f. 7 (Mexique).
 945. *A. Ribbei*, Kiesenwetter, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 23, p. 255 (1879) (Amour).
 946. *A. robustus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 89 (1889) (Nicaragua).
 947. *A. rorensis*, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 359 (1877) (Ile Yule).
 948. *A. roscidulus*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 22 (1897) (Maroc).
 949. *A. rotundicollis*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 517 (1873) (Japon).
 950. *A. rubifrons*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 164 (1864) (Bornéo).
 951. *A. rubrovittatus*, Dugès, La Naturelleza, (2), Vol. 2, p. 28, pl. 2, f. 14 (1891) (Mexique).
 952. *A. rudis*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 13 (1897) (Transcaucasie).
 953. *A. rufocentralis*, Thomson, Typ. Bupr. p. 89 (1878) (Mexique).
 954. *A. rugosicollis*, Blanchard, Voy. d'Orbigny, Col. p. 154 (1846) (Patagonie).
 955. *A. rugosus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 122 (1889) (Mexique).
 956. *A. Saundersi*, Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4), Vol. 2, p. 109, pl. 8, f. 2 (1868) (Afrique occidentale).
 957. *A. scitulus*, Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. 18, p. 318 (1891) (Etats-Unis d'Amérique).
 958. *A. scrobicollis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 60 (1879) (Brésil).
 959. *A. scutellaris*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 148 (1864) (Bornéo).
 960. *A. semifossus*, Fairmaire, idem, Vol. 42, p. 230 (1898) (Madagascar).
 961. *A. Semperi*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 324 (1874) (Iles Philippines).
 962. *A. Semenovi*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 1, p. 271 (1892) (Caucase).
 laticeps || Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 342 (1890).
 963. *A. senegalensis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 34, pl. 8, f. 44 (1839) (Sénégal).
 964. *A. sepulchralis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 186 (1864) (Célèbes).
 965. *A. sericarius*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 25 (1897) (Caucase).
 966. *A. setipes*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 93 (1837) (Cayenne).
 chrysocephalus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 19, pl. 4, f. 22 (1837).
 967. *A. sexflavoguttatellus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 65 (1879) (Brésil).
 968. *A. sexguttatellus*, Thomson, idem (Brésil).
 969. *A. sexmaculatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 117, pl. 7, f. 4 (1889) (Mexique).
 970. *A. sexpunctatus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 166 (1864) (Bornéo).
 971. *A. sexualis*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 17 (1897) (Europe).
 972. *A. sicariellus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 70 (1879) (Brésil).
 973. *A. signatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 110, pl. 6, f. 21 (1889) (Nicaragua).
 974. *A. simplicellus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 63 (1879) (Brésil).
 975. *A. simplicicollis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 116, pl. 7, f. 2 (1889) (Guatémala).
 976. *A. simulans*, Waterhouse, idem, p. 100, pl. 6, f. 5 (Mexique).
 977. *A. sinuatocollis*, Brisout, Rev. Ent. Caen, Vol. 2, p. 83 (1883) (Espagne).
 978. *A. smaragdifrons*, Ganglbauer, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 24, p. 29 (1890) (Chine).
 979. *A. smaragdinus*, Solsky, idem, Vol. 11, p. 279 (1876) (Sibérie).
 980. *A. sobrinus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 93 (1889) (Mexique).
 981. *A. socialis*, Waterhouse, idem, p. 77, pl. 4, f. 20 (Guatémala).
 982. *A. sodalis*, Waterhouse, ibidem, p. 63, pl. 4, f. 14 (Guatémala).
 983. *A. solitarius*, Harold, Col. Hefte, Vol. 5 (1869) (Californie).
 desertus || Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 249 (1860).
 984. *A. soricellus*, Thomson, Typ. Bupr. p. 86 (1888) (Brésil).
 985. *A. sospes*, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 334 (1892) (Japon).

986. *A. sparsus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 71, pl. 5, f. 10 (1889) (Mexique).
987. *A. Sperkei*, Solsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, Vol. 46, p. 159 (1873) (Kiew).
988. *A. spinicaudatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Vol. 3, pt. 1, p. 80, pl. 5, f. 19 (1889) (Guatémala).
989. *A. spiniger*, Eschscholtz, Entomogr. Vol. 1, p. 77 (1822) (Brésil).
990. *A. spinipes*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 153 (1864) (Mysolè).
991. *A. spissus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 108, pl. 6, f. 18 (1889) (Amér. Centr.).
992. *A. splendidipodex*, Thomson, Typ. Bupr. p. 89 (1878) (Mexique).
993. *A. squalus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 114 (1889) (Amérique Centrale).
994. *A. stellatus*, Waterhouse, idem, p. 114, pl. 7, f. 1 (Amérique Centrale).
995. *A. striativentris*, Waterhouse, ibidem, p. 112, pl. 6, f. 24 (Mexique).
996. *A. strigifer*, Waterhouse, ibidem, p. 190 (Mexique).
997. *A. strigifrons*, Waterhouse, ibidem, p. 75, pl. 4, f. 19 (Mexique).
998. *A. strigosus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 101 (1897) (Minas Geraes).
999. *A. subcarinellus*, Thomson, Typ. Bupr. p. 89 (1878) (Mexique).
1000. *A. subcinctus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 252, pl. 42, f. 245 (1841) (Etats-Unis d'Amérique).
1001. *A. subcornutus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 182 (1864) (Singapour).
1002. *A. subcostatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 122, pl. 7, f. 12 (1889) (Mexique).
1003. *A. subeuropellus*, Thomson, Typ. Bupr. p. 88 (1878) (Brésil).
1004. *A. subfasciatus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 231, pl. 38, f. 222 (1841) (Brésil).
1005. *A. sublateralis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 88, pl. 5, f. 21 (1889) (Mexique).
1006. *A. subrobustus*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 516 (1873) (Japon).
1007. *A. subsignatus*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 357 (1851) (Caffrerie).
1008. *A. subtrifasciatus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 191 (1864) (Nouvelle Guinée).
1009. *A. subvestitus*, H. Deyrolle, idem, p. 150 (Makian).
1010. *A. sulcifer*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 122 (1895) (Syrie).
1011. *A. sulcifrons*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 361 (1851) (Natal).
1012. *A. sulphurifer*, Burmeister, Stett. Ent. Zeit. Vol. 33, p. 384 (1872) (Buenos-Ayres).
1013. *A. suspiciosus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 120 (1897) (Minas Geraes).
1014. *A. sutura alba*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 169 (1864) (Bornéo).
1015. *A. suturalis*, H. Deyrolle, idem, p. 295 (Bornéo).
1016. *A. sylvestris*, H. Deyrolle, ibidem, 206 (Mysolè).
1017. *A. taciturnus*, H. Deyrolle, ibidem, p. 132 (Batchian).
1018. *A. taeniatus*, Chevrolat, Col. Mex. fasc. 6, n° 140 (1835) (Mexique).
1019. *A. tarrascus*, Dugès, La Natureza (2) Vol. 2, p. 33, pl. 2, f. 64 (1891) (Mexique).
1020. *A. temeratus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 94, pl. 5, f. 24 (1889) (Mexique).
1021. *A. tempestivus*, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 334 (1893) (Japon).
1022. *A. temporalis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 105, pl. 6, f. 14 (1889) (Guatémala).
1023. *A. tenebricosus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 121 (1897) (Rio Janeiro).
1024. *A. tenuissimus*, Abeille, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 284 (1891) (Syrie).
1025. *A. terminatus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 63 (1879) (Colombie).
1026. *A. terrae-reginae*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. p. 220 (1892) (Queensland).
1027. *A. thalassinus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 179 (1864) (Bornéo).
1028. *A. tibialis*, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 335 (1893) (Japon).
1029. *A. timidus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 97 (1897) (Minas Geraes).
1030. *A. torpidus*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 11, p. 247 (1860) (Canada).
1031. *A. torquatus*, Le Conte, idem, p. 243 (Etats-Unis d'Amérique).
1032. *A. transitorius*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 87 (1897) (Minas Geraes).
1033. *A. transversesulcatus*, Reitter, Wien. Ent. Zeit. p. 195 (1890) (Tiflis).
1034. *A. transversus*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 531 (1894) (Sumatra).
1035. *A. tricolor*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 194 (1864) (Mysolè).
1036. *A. tridentatus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 220, pl. 36, f. 211 (1841) (Brésil).
1037. *A. trimaculatus*, Gory, idem, p. 247, pl. 41, f. 240 (Brésil).
1038. *A. trinotatus*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 513 (1873) (Japon).

1039. *A. tristis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 187 (1864) (Singapore).
 1040. *A. Trito*, H. Deyrolle, idem, p. 162 (Singapore).
 1041. *A. Tschitscherini*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 29, p. 135 (1895) (Turkestan occidental).
 1042. *A. tuberculicollis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 352 (1894) (Madagascar).
 1043. *A. tuberculiventris*, H. Deyrolle, idem, Vol. 4, p. 173 (1864) (Batchian).
 1044. *A. tubulus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 86 (1897) (Pernambuco).
 1045. *A. turcicus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 467 (1865) (Turquie).
 1046. *A. Uhagoni*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 20 (1897) (Espagne).
 1047. *A. ultramarinus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 4, p. 208 (1864) (Malacca).
 1048. *A. umbrosus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 27, pl. 6, f. 33 (1839) (Cap de Bonne-Espérance).
 1049. *A. unicolor*, Castelnau & Gory, idem, p. 64, pl. 14, f. 84 (Brésil).
 1050. *A. unicus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 66 (1897) (Pernambuco).
 1051. *A. uniformis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 87 (1889) (Amérique centrale).
 1052. *A. unipunctatus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 29, pl. 6, f. 35 (1839) (Montévidéo).
 1053. *A. vagans*, Harold, Col. Heft, Vol. 5 (1869) (Rio Janeiro).
 tenellus || Boheman, Res. Eug. p. 64 (1858).
 1054. *A. vaginalis*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 26 (1897) (Caucase).
 1055. *A. validiusculus*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 25, p. 341 (1890) (Caucase).
 1056. *A. validus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 192 (1864) (Menado).
 1057. *A. valvidianus*, Philippi, Stett. Ent. Zeit. p. 246 (1860) (Chili).
 1058. *A. varius*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 39, p. 221 (1895) (Chine).
 1059. *A. velutinomaculatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 61, pl. 4, f. 12 (1889) (Mex.).
 1060. *A. ventricosus*, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, Vol. 7, p. 120 (1888) (Chine).
 1061. *A. versicolor*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 100 (1835) (Brésil).
 purpureicollis, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 243, pl. 40, f. 235 (1841).
 1062. *A. verticalis*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 126 (1895) (Syrie).
 1063. *A. vespilio*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 118 (1897) (Bahia).
 1064. *A. vigilans*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 100, pl. 6, f. 4 (1889) (Mexique).
 1065. *A. vilis*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 327 (1874) (Iles Philippines).
 1066. *A. villosotriatus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 72 (1879) (Inde).
 1067. *A. violaceicollis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 261, pl. 43, f. 254 (1841) (Brésil).
 astutus, Gory, idem, p. 262, pl. 44, f. 255.
 1068. *A. violaceus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 67 (1879) (Brésil).
 1069. *A. virescens*, Castelnau & Gory, Monogr. Bupr. Vol. 2, p. 57, pl. 13, f. 74 (1839) (Brésil).
 1070. *A. viridiaeneus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 177 (1864) (Amboine).
 1071. *A. viridicupreus*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 319 (1866) (Laos).
 1072. *A. viridiobscurus*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 515 (1873) (Japon).
 1073. *A. vittatus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 151 (1864) (Célèbes).
 1074. *A. volucer*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 69 (1897) (Rio Janeiro).
 1075. *A. votus*, Kerremans, idem, p. 70 (Pernambuco).
 1076. *A. vulcanus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 178 (1864) (Mysol).
 1077. *A. vulgaris*, Harold, Mon. Akad. Berl. Wiss. p. 219 (1878) (Zanzibar).
 1078. *A. Waterhousei*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 1, p. 278 (1892) (Mexique).
 planipennis || Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 108 (1889).
 1079. *A. Westermanni*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 27, pl. 6, f. 32 (1839) (Guinée).
 1080. *A. xanthonotus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 110 (1889) (Amérique centrale).

57. GENUS RHAEBOSCELIS, CHEVROLAT

Rhaeboscelis. Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 203 (1837); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 18 (1857); H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 116 (1864).

Caractères. — Tête étroite et sillonnée, le sillon non prolongé en avant; épistome assez allongé, rétréci en arrière par les cavités antennaires, avancé en avant et bilobé avec une échancrure médiane;

joues obtusément dentées; cavités antennaires grandes, arrondies et rapprochées l'une de l'autre. — Antennes médiocres, logées au repos dans une rainure située entre le bord inférieur des yeux et les joues et prolongée sur l'épisternum prothoracique, le long de la marge latérale et en-dessous de celle-ci; article 1 épais, en massue arquée; 2 épais, plus court que 1, obconique; 3 allongé, subcylindrique, semblable à 4; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux parallèles, médiocres et elliptiques. — Pronotum en trapèze, plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure subtronquée; la base bisinuée avec un large lobe médian avancé et tronqué. — Ecusson plus large que long en triangle curviligne, déprimé. — Elytres brusquement déclives en arrière, légèrement élargis au tiers postérieur, le calus huméral très saillant; le sommet conjointement arrondi. — Marge antérieure du prosternum munie d'une mentonnière très courte et séparée du prosternum par un sillon; prosternum convexe, étroit, anguleusement dilaté entre les hanches, son sommet acuminé. — Mésosternum divisé; ses branches latérales assez longues et arquées. — Métasternum échancré en avant et sillonné au milieu. — Hanches postérieures dilatées au côté interne postérieur et à l'externe antérieur. — Pattes assez robustes; fémurs épais et fusiformes; tibias arqués, aplanis sur les bords, leur sommet dilaté; tarses très courts, leurs articles subégaux entre-eux, épais et comprimés; crochets bifides. — Corps allongé, élargi au tiers supérieur, arqué en-dessus, la région dorsale aplanie, les côtés déclives.

Distribution géographique des espèces. — On connaît trois espèces de ce genre, dont une habite l'Amérique du Nord et les deux autres l'Amérique du Sud.

1. **R. purpurea*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 103 (1837) (Brésil).

longipes, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Eumerus*, p. 4, pl. 1. f. 4 (1839).

2. *R. chalybea*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 275, pl. 46, f. 268 (1841) (Brésil).

3. *R. tenuis*, Le Conte, New Spec. Col. Vol. 1, p. 82 (1863) (Illinois).

58. GENUS GERALIUS, HAROLD

Acanthopygus || H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 116 (1864).

Geralius. Harold, Col. Heft. Vol. 5 (1869).

Caractères. — Tête faiblement sillonnée; front quadrituberculé; épistome court et large, séparé du front par un sillon sinueux, bisinué en avant avec une large échancrure médiane et anguleuse; joues dentées; cavités antennaires médiocres, arrondies. — Antennes courtes insérées dans une rainure, qui se prolonge sur l'épisternum prothoracique et naissant entre les joues et les yeux, dentées à partir du 4^e article; 1 assez épais, en massue; 2 et 3 subégaux entre-eux, plus courts et plus grêles que 1, mais plus longs que 4; les suivants dentés au côté interne, assez épais, transversaux et munis d'une fossette porifère terminale, les trois premiers seuls pouvant s'insérer dans une rainure longeant les yeux, les autres libres, cette rainure n'étant pas prolongée sur l'épisternum prothoracique. — Yeux elliptiques et parallèles. — Pronotum en trapèze, inégal et bossué; le disque tuberculé; la marge antérieure presque droite; les côtés arqués avec une carène latérale très sinueuse; la marge crénelée; la base bisinuée avec un large lobe médian faiblement échancré à son sommet. — Ecusson pentagonal, acumine au sommet. — Elytres larges à la base, plans, triangulaires, atténuées et dentelés au sommet et sur les côtés postérieurs. — Marge antérieure du prosternum munie d'une mentonnière largement arquée et limitée postérieurement par un large et profond sillon parallèle au bord; prosternum court et large, plan, anguleusement arrondi au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes entre les hanches antérieures et les médianes. — Métasternum échancré en arc en avant. — Hanches postérieures très courtes au milieu et très dilatées sur les côtés, la dilatation externe plus accentuée et remontante, l'interne abaissée. — Pattes peu robustes; fémurs normaux; tibias antérieurs et médians un peu arqués,

les postérieurs droits, ciliés sur la tranche interne; tarsi courts, leurs articles subégaux; crochets bifides, — Extrémité du dernier segment abdominal échancré entre deux dents mousses.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre paraît exclusivement propre à l'Amérique du Sud.

1. *G. furciventris*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 88 (1837) (Equateur, Brésil).
murinus, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 105 (1837).
caliginosus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2; *Coraeus*, p. 7, pl. 2, f. 9 (1839).
2. **G. distinctus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 340 (1899) (Goyaz).

59. GENUS KAMOSIA, KERREMANS

Kamosia. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 314 (1898).

Caractères. — Tête inégale, ridée et tuberculée; front sillonné en arrière, le sillon coupé par deux autres sillons arqués; épistome séparé du front par une carène sinueuse, échancré en avant, au milieu et lobé sur les côtés; joues armées d'une dent aiguë. — Cavités antennaires assez grandes, transversales, arrondies et rapprochées l'une de l'autre. — Antennes médiocres, insérées au repos dans une rainure formant le prolongement de la cavité antennaire et prolongée sous le bord latéral du pronotum; article 1 assez épais, obconique; 2 plus court, globulaire; 3 un peu moins épais et plus long que 2; les suivants épais, globulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, peu saillants, elliptiques, un peu obliques et légèrement écartés en arrière sur le vertex. — Pronotum inégal, bossué, assez convexe, un peu plus long que large, fortement lobé en avant et bisinué en arrière. — Ecusson triangulaire. — Elytres allongés, séparément arrondis ou acuminés, toujours dentelés. — Mentonnière du prosternum lobée, échancrée au milieu; prosternum étroit, court, bombé; déclive et aminci au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes et arquées le long de la partie antérieure des hanches médianes. — Métasternum anguleusement échancré à son sommet. — Hanches postérieures peu dilatées du côté interne et très dilatées en avant et en arrière à l'externe. — Pattes peu robustes, plutôt grêles; fémurs peu renflés; tibia grêles, les antérieurs et les médians un peu arqués et tranchants sur le bord externe, les postérieurs presque droits subcylindriques. — Tarsi très courts, subégaux entre eux; leurs articles comprimés; crochets bifides. — Corps allongé et subcylindrique.

Distribution géographique des espèces. — On connaît cinq espèces Africaines de ce genre.

1. **K. thoracica*, nov. sp. (1) (Afrique orientale anglaise).
2. **K. Duvivieri*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 315 (1898) (Tanganika).
3. **K. abyssinica*, Kerremans, idem, Vol. 43, p. 278 (1899) (Abyssinie).
4. **K. meridionalis*, Kerremans, ibidem, Vol. 42, p. 315 (1898) (Delagoa Bay).
5. **K. Alluaudi*, nov. sp. (2) (Assinie).

60. GENUS VELUTIA, KERREMANS

Velutia. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 342 (1900).

Caractères. — Tête inclinée, plane; front sillonné; épistome anguleusement échancré en avant avec les lobes latéraux aigus; joues dentées; cavités antennaires grandes, triangulaires, subcon-

1) Long. 8, 5; larg. 2 mill. — Allongé, subcylindrique; tête, pronotum, écusson et apex élytral bronzé cuivreux obscur et très brillant; élytres noirs et mats avec des traces de dessins villoses et gris, sans allure déterminée; dessous noir, un peu plus brillant que le dessus. — Tête quadrituberculée; pronotum grand, allongé, convexe avec des tubercules bien marqués et garnis de rides circulaires et concentriques; élytres très rugueux, couverts de rugosités simulant des écailles, le sommet acuminé de part et d'autre. Dessous moins rugueux que les élytres. — Afrique orientale anglaise. (Staudinger).

2) Long. 10,5; larg. 2 mm. — Allongé, atténué en arrière; tête et pronotum bronzé clair; élytres bronzé obscur avec une bande transversale et noire au tiers postérieur, cette bande limitée en avant et en arrière par une bande formée par une villosité grise. Dessous noir, très brillant. — Tête arquée, non tuberculée et sillonnée dans toute sa longueur; pronotum très convexe sur le disque, les côtés déprimés, obliques en avant, arqués au milieu et sinueux en arrière; élytres couverts de rugosités simulant des écailles, le sommet séparément arrondi et très finement dentelé. Dessous couvert d'une courte villosité grise. — Assinie. (Ch. Alluaud).

tiguës. — Antennes médiocres, insérées au repos dans un sillon formant le prolongement des cavités antennaires, longeant le bord inférieur des yeux et prolongé le long de la marge latérale du pronotum, sous celle-ci; article 1 épais, en massue; 2 très court, mais aussi épais que 1; 3 allongé, grêle et subcylindrique; 4 semblable à 3; les suivants grêles, obconiques, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, subovales, un peu obliques et légèrement rapprochés sur le vertex. — Pronotum plus large que haut et plus étroit en avant qu'en arrière, couvert de reliefs épais et inégaux; sa marge antérieure largement et fortement lobée en avant; la base bisinuée avec un large lobe médian tronqué. — Écusson formé d'une pièce rectangulaire et déclive en avant et d'une très courte pièce déclive en arrière et acuminée à son sommet. — Élytres plans avec une courte côte médiane et dorsale; le sommet séparément arrondi. — Prosternum échancré en arc en avant, avec un faible rebord, mais sans mentonnière distincte; court et étroit; son sommet subacuminé. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes et arquées, contournant la partie antérieure des hanches médianes. — Métasternum profondément échancré en avant. — Hanches postérieures très étroites, concaves, peu dilatées au côté interne et dilatées en avant et en arrière à l'externe. — Pattes peu robustes; fémurs normaux, subfusiformes et légèrement incurvés à leur extrémité; tibias droits, grêles et cylindriques; tarses courts; crochets bifides. — Corps oblong, subplan en dessus, atténué en avant et en arrière.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce connue de ce genre provient des bords du Rio Grande (Brésil). Son faciès rappelle celui des espèces du genre *Alcinous*, H. Deyrolle, mais avec des caractères distinctifs tels qu'ils ont nécessité la création d'une coupe générique distincte. 1. **V. sericea*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 343 (1900) (Brésil).

61. GENUS PARAGRILUS, SAUNDERS

Clinocera || H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 116 (1864).

Paragrilus. Saunders, Cat. Bupr. p. 127 (1871); Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 124 (1889).

Caractères. — Tête inclinée; vertex bombé et sillonné; épistome situé sur un plan inférieur à celui du front, étroitement échancré en avant; joues inermes; cavités antennaires assez grandes, arrondies et subcontiguës. — Antennes peu robustes, logées au repos dans un sillon formant le prolongement de la cavité antennaire contre le bord interne de l'œil et prolongé le long du bord, sous et contre la marge latérale du pronotum; articles 1 et 2 épais, 1 plus long que 2; 3, 4 et 5 plus minces. subégaux entre eux; les suivants dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, elliptiques, peu saillants et à peine écartés en arrière sur le vertex. — Pronotum variable, convexe ou sillonné au milieu, ses côtés déprimés et carénés; la marge antérieure formant un large lobe avancé; la base fortement bisinuée avec un lobe médian avancé et tronqué ou échancré. — Écusson triangulaire, assez grand. — Élytres striés, souvent avec une côte médiane dorsale naissant du calus huméral; le sommet tronqué ou séparément arrondi. — Prosternum large et convexe en avant, acuminé en arrière; mentonnière très étroite, à peine accusée. — Mésosternum profondément échancré en avant. — Hanches postérieures peu dilatées au côté interne et dilatées en avant à l'externe. — Pattes peu robustes; fémurs normaux, subfusiformes et creusés le long de leur bord interne; tibias grêles et normaux; tarses très courts, subégaux entre eux; crochets bifides. — Corps allongé, peu convexe ou plan, étroit; faciès des *Agrilus*.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre est exclusif à l'Amérique où il paraît représenter les *Cylindromorpha* de l'ancien continent.

1. **P. crassus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 53 (1897) (Brésil).

2. **P. sulcicollis*, nov. sp. (1) (Tucuman).
 3. **P. nigrinus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 340 (1899) (Pérou).
 4. *P. Reichei*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 263, pl. 44, f. 257 (1841) (Colombie).
 5. **P. major*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 53 (1897) (Minas-Geraës).
 6. **P. obliquus*, nov. sp. (2) (Brésil).
 7. *P. angulaticollis*, Waterhouse, Biol. Cent. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 124, pl. 7, f. 19 (1889) (Guatémala).
 8. **P. aeraticollis*, Waterhouse, idem, p. 127 (Texas, Colombie, Brésil).
 9. *P. Lesueuri*, Waterhouse, ibidem, p. 126 (Arizona, Brésil).
 10. **P. Bergi*, nov. sp. (3) (Tucuman).
 11. **P. credulus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 54 (1897) (Brésil).
 12. *P. brasiliensis*, Castelnau et Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Agrilus*, p. 69, pl. 15, f. 92 (1839) (Brésil).
 13. *P. rugulatus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 77 (1879) (Guatémala).
 14. **P. transitorius*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 126 (1889) (Guatémala).
 15. *P. modicus*, Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 304 (1833) (Colombie, Brésil).
 15. **P. Bruchi*, nov. sp. (4) (Tucuman).
 17. **P. abjunctus*, nov. sp. (5) (Buenos Aires).
-
18. *P. aeneifrons*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 154 (1896) (Brésil).
 19. *P. Beskei*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Agrilus*, p. 66, pl. 15, f. 88 (1839) (Brésil).
 20. *P. dubius*, Saunders, Cat. Bupr. p. 127, n° 6 (1871) (Brésil).
exiguus ||, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Agrilus*, p. 67, pl. 15, f. 89 (1839).
 21. *P. exiguus*, Chevrolat, Col. Mex. Cent. 2, n° 146 (1835) (Mexique).
 22. *P. impressus*, Chevrolat, idem, n° 145 (Mexique).
 23. *P. laevicollis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 124 (1889) (Panama).
 24. *P. nanu'us*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou p. 117 (1837) (Pérou).
 25. *P. peruvianus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Agrilus*, p. 66, pl. 14, f. 87 (1837) (Pérou).
 26. *P. trifoveolatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 125 (1889) (Mexique).
 27. *P. vicinus*, Waterhouse, idem, p. 126 (Panama).

62 GENUS PARACEPHALA, THOMSON

Paracephala. Thomson, Typ. Bupr. p. 91 (1878).

Caractères. — Tête inclinée, arquée en avant; épistome largement et peu profondément échancré en arc; joues inermes; cavités antennaires subtriangulaires, subcontiguës et situées à une certaine distance du bord interne des yeux; antennes courtes et libres, dentées à partir du 4^e article; 1^{er} épais; 2 plus court et moins épais; 3 plus allongé que 2, mais plus grêle; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux petits, allongés, elliptiques,

(1) Long. 3,7; larg. 0,7 mm. — *Étroit, allongé, cylindrique, entièrement bronzé.* — Tête étroite, convexe et faiblement sillonnée en arrière; pronotum allongé, couvert de rides transversales, très finement granuleux, sillonné au milieu et déprimé de chaque côté, la dépression linéaire, les côtés arqués avant le milieu et droits ensuite; élytres allongés, finement granuleux avec des séries longitudinales de points vagues; déprimés le long de la suture, celle-ci élevée, le sommet largement arrondi de part et d'autre, subtronqué. Dessous rugueux et ponctué. — Tucuman. (C. Bruch).

(2) Long. 3,3; larg. 0,7 mm. — *Petit, étroit, subcylindrique, entièrement noir et brillant.* — Tête surmontée d'une carène bilobée la séparant du vertex, celui-ci sillonné; pronotum à rides transversales, le disque uni et un peu convexe, les côtés déprimés, la dépression oblique et courbe, l'angle postérieur épais et saillant; élytres rugueux et ridés transversalement avec une courte carène droite naissant sous le calus huméral, le sommet largement et séparément arrondi. Dessous à ponctuation grossière et espacée en avant, fine et rare sur l'abdomen. — Brésil. (C. Bruch).

(3) Long. 4; larg. 0,75 mm. — *Plus robuste, plus rugueux, moins cylindrique et plus aplani en dessus et noir un peu mat; dessous bronzé très obscur.* — Tête étroite, sillonnée dans toute sa longueur; pronotum semblable à celui du *sulcicollis* K., mais les sillons latéraux plus linéaires; élytres très rugueux, plissés transversalement avec une côte naissant sous le calus huméral. Dessous moins rugueux, surtout en arrière. — Tucuman. (C. Bruch).

(4) Long. 4; larg. 0,75 mm. — *Allongé, subcylindrique, entièrement noir, très légèrement verdâtre en dessus.* — Tête étroite et convexe, sillonnée dans toute sa longueur; pronotum à rides sinuées et transversales, allongé, droit sur les côtés, ceux-ci obliques en avant et arrondis avant le milieu, le disque vaguement sillonné, l'impression latérale sinueuse; élytres sans carène dorsale, mais avec une étroite carène prémarginale et droite; finement granuleux et sérielement ponctués, le sommet subtronqué. Dessous très finement granuleux parsemé en outre de points largement espacés. — Tucuman (C. Bruch).

(5) Long. 4,5; larg. 0,8 mm. — *Allongé, subcylindrique, bronzé brillant en dessus; sternum noir, abdomen bronzé.* — Tête étroite, à peine sillonnée; pronotum plus large, plus arqué sur les côtés, sans sillons mais avec des impressions irrégulières le long de la base; élytres rugueux, à rides transversales, avec une carène droite naissant du calus huméral, le sommet séparément arrondi. Dessous moins rugueux que le dessus. — Buenos-Aires. (Bruch).

parallèles et situés à une certaine distance du bord antérieur du pronotum. — Pronotum assez grand, convexe, subcylindrique, plus ou moins bossué; sa marge antérieure tronquée ou à peine bisinuée; la base bisinuée avec un faible lobe médian plus ou moins arqué. — Ecusson petit, en triangle équilatéral. — Elytres allongés, déclives sur les côtés, séparément arrondis au sommet. — Marge antérieure du prosternum faiblement échancrée en arc, sans mentonnière distincte; prosternum court, étroit, bombé et étranglé par le rapprochement des hanches antérieures; son sommet subacuminé. — Mésosternum divisé; ses branches latérales peu distinctes et refoulées en avant des hanches médianes. — Métasternum avancé en avant, suivant un lobe aigu inséré entre les hanches médianes. — Hanches postérieures plus dilatées au côté interne qu'à l'externe. — Pattes peu robustes; fémurs normaux, subfusiforme; tibias assez forts, les quatre antérieurs aplanis sur leur tranche externe, ceux de la première paire un peu plus dilatés, arqués et dentelés sur le bord externe, les postérieurs plus grêles et subcylindriques; tarses relativement grands pour le groupe, leurs articles triangulaires; crochets bifides. — Corps allongé, cylindrique.

Distribution géographique des espèces. — On connaît neuf espèces de ce genre qui paraît exclusivement propre à l'Australie.

1. **P. pistacina*, Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. Vol. 4, p. 218 (1845) (Australie).
canaliculata, Germar, Linn. Ent. Vol. 3, p. 180 (1848).
 2. **P. thoracica*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 343 (1900) (Australie).
 3. **P. crassa*, Kerremans, idem, Vol. 42, p. 176 (1898) (Gayndah).
 4. **P. intermedia*, Kerremans, ibidem, p. 177 (Gayndah).
 5. *P. aenea*, Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austral. p. 302 (1891) (Australie septentrionale occidentale).
 6. **P. cylindrica*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 177 (1898) (Port Denison).
 7. **P. minuta*, Kerremans, idem (Australie).
-
8. *P. cyaneipennis*, Blackburn, Trans. R. Soc. S. Austral. Vol. 17, p. 130 (1893) (Nouvelles Galles du Sud).
 9. *P. murina*, Thomson, Typ. Bupr. p. 91 (1878) (Sidney).

63. GENUS BERGIDORA, NOV. GEN.

Caractères. — Tête arqué en avant mais médiocrement convexe, sillonnée dans toute sa longueur; épistome échancré au milieu en avant et lobé sur les côtés avec le bord un peu relevé en gouttière; joues inermes; cavités antennaires petites, arrondies, subcontiguës. — Antennes...; article 1 allongé, en massue arquée; 2 court, globulaire; les suivants... — Yeux assez grands, globulaires, elliptiques, écartés en arrière sur le vertex et situés à une certaine distance du bord antérieur du pronotum. — Pronotum plus large que long, un peu plus étroit en avant qu'en arrière, le disque très convexe; la marge antérieure fortement et largement lobée, relevée en gouttière au milieu et séparée ainsi du disque par un large sillon transversal; les côtés faiblement arqués avec la marge latérale lisse et tranchante; la base bisinuée avec un lobe médian avancé et tronqué. — Ecusson petit, en triangle équilatéral, acuminé au sommet. — Elytres légèrement arqués d'avant en arrière, un peu déclives sur les côtés, leur sommet séparément arrondi. — Marge antérieure du prosternum faiblement échancrée en arc et sans mentonnière; prosternum court, étroit, subplan, subacuminé au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes et contournant en avant les hanches médianes. — Métasternum faiblement échancré en avant. — Hanches postérieures à peine dilatées au côté interne et très dilatées en avant sur les côtés, la marge postérieure un peu onduleuse. — Pattes assez robustes; fémurs normaux, subfusiformes; tibias assez forts, arqués, tétragones et tranchants sur leur bord externe; tarses courts et assez épais, les articles 1 à 4 emboîtés l'un dans l'autre, le 5^e très allongé, obconique; crochets bifides. — Corps subcylindrique, oblong elliptique, couvert de taches villoses rouge et jaune vifs.

Je crois pouvoir fonder ce genre pour une espèce que m'avait soumise autrefois le regretté Carlos Berg et provenant de l'Uruguay et que j'avais provisoirement placée parmi les *Acmaeodera*. Ses caractères en font incontestablement un *Agrilite*, sans pouvoir le ranger dans aucun des genres de ce groupe.

Distribution géographique de l'espèce. — L'unique espèce connue de ce genre provient de l'Uruguay.

1. **B. picturella*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 6 (1887) (Uruguay).

64. GENUS CLEMA, SEMENOW

Clema. Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 34, p. 590 (1900).

Caractères. — « Genus *Coraebo*, Castelnau & Gory, praesertim ejus subgeneri *Melibaeo*, » H. Deyrolle, proximum, sed distinctissimum corpore anguste cylindrico totopilis accumbentibus albo- » sericeis plus minusve dense vestito; capite majusculo, subhemisphaerico, facie convexa; pronoto » valde inaequali, ante basin fortissime lateque transversim impresso, medio valde gibboso, margine » basali medio supra scutellum anguliformiter sursum prominulo, margine laterali valde deorsum » deflexo, solum ante angulos posticos acutiusculo, anterieus obtuso atque sensim oblitterato; scutello » haud transverso, regulariter vel etiam elongato-triangulari; elytris margine laterali contra coxas » posticas fortius et magis abrupte sinuato, epipleuris nullis; prosterni margine antico lobo gulari » brevissimo, solummodo utrinque perbreve prominulo; coxis intermediis paulo latius quam anticae » inter se distantibus; tarsis minus brevibus, posticis articulo basi longitudinem insequentis saltem duplo » superante, omnibus articulo 4^o patella majuscula lataque instructo, articulo ultimo longitudinem duor » um praecedentium unitorum haud vel parum superante, unguiculis acute bifidis apice interiore altero » multo brevior. Ceterum cum genere *Coraebo* congruens.

» Magis ad eo generi *Cylindromorpho*, Motschulsky, affine, aquo discrepat praecipue : capite etsi » fere hemisphaerico, tamen minus exserto similiterque atque in *Coraebis* constructo, oculus ab antico » pronoti margine minus distantibus eique parallelis; pronoto margine laterali aliter formato, haud » duplici; unguiculis bifides; forma corporis etsi cylindrica, tamen minus angusta et elongata, habitu » potius aliquas *Melibaei*, vel angustas *Aemaecoderae* species in mentem vocante; corpore toto supra » subtusque pilis accumbentibus haud subtilius dense induto. A genere *Agrilo*, Solier, ob capitis » pronotique marginis duplicis destituti structuram diversam nec non habitum, sculpturam et vesti- » turam corporis peculiares magis adeo distat. — Inter genera *Coraebum*, Castelnau & Gory et *Cylin- » dromorphum*, Motschulsky, in systemate collocandum.

» Praeter speciem typicam, quae infra describitur, ad hoc genus referenda esse videtur mihi » ignota *Buprestis candida*, Zubkoff (Bull. Soc. Mosc. Vol. 6, p. 318 (1833), valde imperfecta ab autore » descripta. Quae species densius, quam species nostra, pilis candidis vestita esse videtur atque provenit » probabiliter e desertorum transcasicorum parte boreali-occidentali. »

Je reproduis textuellement la description de ce genre dont je ne connais aucune des deux espèces citées par l'auteur.

Distribution géographique des espèces. — Les deux espèces connues de ce genre habitent les provinces transcasiennes de la Sibérie.

1. *C. candida*, Zubkoff (1), Bull. Soc. Nat. Moscou, Vol. 6, p. 318 (1833) (Transcaspie).

2. *C. deserti*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 34, p. 592 (1900) (Transcaspie).

(1) Cette espèce, qui figure parmi les *Acmaeodera*, dans la première partie, déjà imprimée, du présent *genera*, est à supprimer dans ce genre, puisque, d'après M. Semenow, elle doit faire partie des *Clema*.

65. GENUS CYLINDROMORPHUS, KIESENWETTER

Cylindromorphus. Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 159 (1857); H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 218 (1864); Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 494 (1865).

Caractères. — Tête grande, parfois plus large que le corps, avancée, convexe et sillonnée; épistome séparé du front par une strie et un rebord sinueux et trigone, largement échancré en arc en avant; joues inermes; cavités antennaires presque contiguës et subarrondies, situées entre les côtés de l'épistome et le bord inférieur des yeux. — Antennes médiocres, grêles et courtes, logées au repos dans un sillon formant le prolongement des cavités antennaires, longeant les joues et prolongé obliquement le long du prosternum; article 1 épais, en massue arquée, 2 plus court, un peu moins épais, subglobulaire; 3-5 grêles, obconiques et subégaux entre eux; les suivants triangulaires, obtusément dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux grands, ovalaires, amincis en arrière, très obliques et écartés en arrière sur le vertex, situés à une certaine distance du bord antérieur du pronotum. — Pronotum plus large que long, un peu rétréci en arrière, transversalement convexe, un peu bisinué à la base; les côtés étroitement rebordés et abaissés en avant. — Ecusson petit, triangulaire. — Elytres allongés, un peu rétrécis au tiers antérieur, élargis au postérieur, obliquement atténués ensuite jusqu'au sommet, celui-ci obtusément arrondi. — Marge antérieure du prosternum faiblement échancrée en arc, sans mentonnière distincte; prosternum en triangle allongé. — Mésosternum divisé; ses branches latérales à peine visibles au-dessus des hanches médianes. — Métasternum un peu saillant et tronqué en avant. — Hanches postérieures très courtes, peu dilatées intérieurement et extérieurement. — Pattes peu robustes; fémurs épais, fusiformes; tibias grêles, subcylindriques; tarses assez élargis, leurs articles courts; crochets bifides. — Corps grêle, filiforme et cylindrique.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre est propre à l'ancien continent, à l'exclusion de la Malaisie et de l'Australie. L'exiguité des espèces les aura fait échapper aux recherches et il est probable que leur nombre est beaucoup plus considérable que celui des espèces connues.

1. *C. subuliformis*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 117 (1837) (Hongrie, Samara).
tauricus, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 269, pl. 45, f. 264 (1841).
 2. *C. filum*, Schoenherr, Syn. Ins. Vol. 3, App., p. 124 (1817) (Autriche, Sicile, Samara).
cylindrus, Villa, Col. Eur. Suppl. p. 88 (1835).
**filum*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 498 (1865).
 3. **C. Popovi*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 103 (1853) (Crimée, Sarepta, Mongolie).
pyethri, Stierlin, Idem, p. 491 (1863).
 4. **C. araxidis*, Reitter, Deutsch. Ent. Zeit. p. 24 (1889) (Caucase).
 5. **C. juvenilis*, nov. sp. (1) (Afrique Orientale Anglaise).
 6. *C. pinguis*, Fairmaire, Pet. Nouv. Ent. Vol. 2, p. 49 (1876) (Sahara).
sctifensis, Bonnaire, Rev. Ent. Caen, Vol. 40, p. 317 (1893).
 7. **C. orientalis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 61, p. 26 (1892) (Manille).
 8. *C. japonensis*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 519 (1873) (Japon).
 9. **C. subcylindricus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 296 (1899) (Cameroon).
-
10. *C. acus*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 31 (1897) (Finlande).
 11. *C. bifrons*, Rey, Bull. Soc. Ent. Fr. (6) Vol. 9, p. 161 (1889) (Bohème).
 12. *C. carpetanus*, Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 282 (1864) (Espagne).

(1) Long. 3; larg. 0,5 mm. — Un peu plus petit que le *P. Popovi* Mannh., mais plus large et plus épais et entièrement noir. — Tête hémisphérique, de la largeur du pronotum, le sillon net et linéaire; côtés du pronotum un peu obliques et droits, la dépression transversale peu accusée; la carène latérale droite et interrompue en avant, la marge subsinueuse et abaissée vers la bouche; élytres couverts de rugosités simulant des écailles et de rides transversales sinueuses, le sommet conjointement arrondi et subacuminé. — Afrique orientale anglaise. (Staudinger)

- 13. *C. cribratus*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 30 (1897) (Algérie).
- 14. *C. gallicus*, Mulsant, Opusc. Ent. p. 22 (1863) (France méridionale).
- 15. *C. Mariae Antoniae*, Abeille, L'Echange, p. 67 (1894) (Algérie).
- 16. *C. opacus*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 31 (1897) (Valachie).
- 17. *C. parallelus*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 49 (1859) (France méridionale).
strigatulus, Rey, Bull. Soc. Fr. (6), Vol. 9, p. 160 (1889).
- 18. *C. pubescens*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 29, p. 266 (1895) (Turkestan occidental).
- 19. *C. sinuatus*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 36 (1897) (Algérie).
- 20. *C. somalicus*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 504 (1899) (Somalis).
- 21. *C. spinipennis*, Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 136 (1890) (Oran).
- 22. *C. strictipennis*, Reitter, Wien. Ent. Ziet. p. 154 (1895) (Ordubad).

66. GENUS CORÆGRILUS, FAIRMAIRE

Corægrilus. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 32 (1889).

Caractères. — « L'insecte qui sert de type à ce nouveau genre tient lieu à la fois des *Coraebus* » et des *Agrilus*, se distinguant des deux par le corselet, n'ayant pas de carènes sur les côtés à la base, » des seconds par le premier article des tarses postérieurs, seulement plus long que le suivant: le » deuxième article des antennes assez épais, plus grand que le troisième, le corselet élargi en arrière, la » tête creusée en travers et en long, l'écusson moins transversal à la base, plus pointu à l'extrémité, et » l'absence de mentonnière. La base du corselet présente de chaque côté une large impression dans » laquelle il n'y a pas de trace de carène; on en voit un vestige vers le milieu du bord maginal, qui est » très finement festonné ».

Cette énumération de caractères, trop incomplète pour pouvoir discuter la validité du genre et dont je reproduis fidèlement le texte, me laisse dans une grande perplexité relativement à la place à lui assigner dans la tribu des *Agrilides*. Je ne connais pas l'espèce sur laquelle il est fondé et je le place provisoirement à la fin du groupe des *Agrilites*.

Distribution géographique de l'espèce. — On ne connaît qu'une seule espèce, provenant du Thibet.

- 1. *C. amplithorax*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 33 (1889) (Thibet).

GROUPE 2. TRACHITES, LACORDAIRE

Trachydes. Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 86; H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 218 (1864); Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 502 (1865).

Trachytes. Le Conte & Horn, Smithson. Inst. (1883).

Trachyni. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 121 (1893).

Caractères. — Hanches médianes sensiblement plus écartées l'une de l'autre que les antérieures; marge antérieure des hanches postérieures peu concave; celles-ci non ou à peine dilatées au côté externe; tarses très courts.

- 1. — *Epistome large; cavités antennaires très espacées* 2
— *étroit, rétréci par le rapprochement des cavités antennaires.* 3
- 2. — *Tête forte, plus large que la base du pronotum.* 1. CYLINDROMORPHOIDES, nov. gen.
Non 2. ANTHAXOMORPHA.
- 3. — *Antennes libres au repos, parfois logées dans une dépression du meta-*
notum : 4
Antennes logées au repos dans un sillon net et profond du métanotum 9

4. — Tibias logés au repos dans un sillon des fémurs	5
— libres au repos.	7
5. — Antennes dentées à partir du 6 ^e ou du 8 ^e article	6
— — — du 5 ^e article	3. GERMARICA.
6. — Les articles 8 à 11 des antennes formant massue	4. APHANISTICUS.
— 6 à 11 dentés d'une façon normale	5. ENDELUS.
7. — Base du pronotum tronquée ; yeux parallèles	8
— — sinuose ; yeux obliques	6. TRACHYS.
8. — Pronotum non rebordé sur les côtés et sans strie marginale	7. PARATRACHYS.
— rebordé avec une fine strie marginale	8. STENIANTHE.
9. — Bases du pronotum et des élytres juxtaposées	10
— — — non contiguës et laissant voir une pièce mésothoracique	9. PSEUDIANTHE.
10. — Pattes logées dans des dépressions du dessous	11
— libres	15
11. — Base du pronotum sinuose	12
— — tronquée	10. SPONSORINUS.
12. — Tibias élargis et tranchants	13
— cylindriques ou subcylindriques, non dilatés	14
13. — Écusson petit, en triangle allongé	11. JANTHE.
— grand, en triangle élargi	12. PACHYSCHELUS.
14. — Tibias épais et très arqués	13. LIUS.
— grêles, à peine arqués à la base, ensuite droits.	14. BRACHYS.
15. — Tous les tibias droits	16
Les tibias antérieurs et les médians arqués	15. TAPHROCERUS.
16. — L'extrémité des fémurs arquée ; corps aplani en dessous	16. LEIOPLEURA.
Fémurs droits ; corps cylindrique	17. CALLIMICRA.

1. GENUS CYLINDROMORPHOIDES, NOV. GEN.

Caractères. — Tête forte et large ; front excavé ; épistome bilobé avec une faible échancrure médiane ; cavités antennaires petites, espacées et situées entre le rebord du lobe épistomal et le bord inférieur des yeux ; antennes grêles, assez longues, dentées à partir du 6^e article ; 1 et 2 épais, 1 plus long que 2 ; 3 à 5 subcylindriques et subégaux entre eux ; les suivants triangulaires, peu transversaux, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, globulaires, saillants et un peu obliques, plus écartés en arrière qu'en avant. — Pronotum court, plus large que long, quadrangulaire, tronqué en avant et bisinué en arrière ; les côtés à bords tranchants et infléchis, le disque formant deux bourrelets transversaux séparés par un sillon. — Écusson plus large que long, subcordiforme. — Elytres allongés, ridés transversalement ; le sommet séparément arrondi. — Marge antérieure du prosternum tronquée ; prosternum court, triangulaire, un peu bombé, atténué en arrière. — Branches latérales du mésosternum obliques, courtes et étroites. — Méta sternum étroitement échancré en avant. — Hanches postérieures concaves ; leurs marges parallèles. — Pattes assez longues ; fémurs arqués au sommet ; tibias antérieurs et médians subcylindriques et arqués ; tarses très courts ; crochets bifides. — Corps allongé, subcylindrique ; subplan en dessus, légèrement élargi au tiers postérieur.

Je fonde ce genre sur une espèce du Brésil que j'avais décrite en la plaçant provisoirement parmi les *Taphrocerus*, avec lesquels elle n'a qu'une très vague affinité.

Distribution géographique de l'espèce. L'unique espèce de genre habite le Brésil.

1. **C. agriliformis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 125 (1897) (Goraz).

2. GENUS ANTHAXMORPHUS, H. DEYROLLE

Anthaxomorphus. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 219.

Caractères. — Tête large, légèrement creusée au milieu du front; épistome tronqué en avant, la troncature un peu échancrée; cavités antennaires espacées, obliques, ovalaires et subterminales; antennes libres, courtes, dentées à partir du 6^e article; 1 et 2 épais et renflés, 1 plus long que 2; 3 grêle et allongé; 4 et 5 plus courts, aussi grêles, obconiques; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale, s'élargissant graduellement de 6 à 8 et diminuant de 9 à 11. — Yeux assez grands, ovalaires, saillants, subparallèles, un peu obliques et un peu plus écartés en arrière qu'en avant. — Pronotum court, transversal, convexe sur le disque, un peu aplani sur les côtés; les bords tranchants et crénelés; la marge antérieure à peine sinueuse avec les angles de devant abaissés et aigus, les côtés arqués; la base fortement bisinuée avec un large lobe médian avancé et subtronqué. — Ecusson plus large que long, subcordiforme. — Elytres courts, larges, convexes, rebordés en avant et couvrant la majeure partie des épisternums métathoraciques; le sommet déclive et conjointement arrondi. — Marge antérieure du prosternum avancée et largement lobée; prosternum court et large, arrondi en arrière. — Mésosternum divisé; ses branches latérales à peine visibles. — Mésternum largement et peu profondément entaillé. — Hanches postérieures très étroites; le côté interne et l'externe un peu dilatés en arrière. — Pattes courtes et assez robustes; fémurs renflés, surtout les postérieurs et finement canaliculés; tibias antérieurs un peu arqués, les postérieurs droits; tarses assez allongés; crochets appendiculés. — Corps épais, écourté, quadrangulaire, convexe, atténué en avant et arrondi en arrière.

Je rattache à ce genre une espèce rapportée de Sumatra par M. J.-L. Weyers et qui présente tous les caractères assignés par H. Deyrolle, sauf la présence d'une large mentonnière au prosternum, tandis que le créateur du genre dit : « prosternum sans mentonnière, large et court, formant un léger arc de » cercle rentrant à partir des angles antérieurs du prothorax; à peine saillant et arrondi en arrière. » Cet insecte n'a rien de commun avec les *Anthaxia*, comme semble l'indiquer son nom; il ressemble beaucoup plus à certains *Cisnois*.

Distribution géographique des espèces. — On ne connaît que cinq espèces de ce genre, représentées jusqu'ici chacune par un seul exemplaire, et trouvées en Malaisie.

1. **A. viridiceps*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 37 (1900) (Sumatra).

2. *A. femoralis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 222 (1864) (Iles Key).

3. *A. granulatus*, H. Deyrolle, idem, p. 221, pl. 3, f. 6 (Gilolo).

4. *A. oblongus*, H. Deyrolle, ibidem, p. 222 (Ceram).

5. *A. papuanus*, H. Deyrolle, ibidem, p. 221 (Dorey).

3. GENUS GERMARICA, BLACKBURN

Germarica. Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 257 (1887).

Caractères. — Tête assez large en arrière, peu convexe, faiblement sillonnée; épistome court et très étroit, situé sur un plan inférieur au front et séparé de celui-ci par une carène; cavités antennaires

grandes et presque contiguës; antennes assez épaisses, insérées dans une large dépression longeant la marge latérale inférieure du pronotum, cette dépression ne formant pas un sillon net; dentées à partir du 5^e article; 1 et 2 plus épais que 3 et 5, 1 plus grand que 2; 3-5 globulaires; les suivants triangulaires, transversaux, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, elliptiques, parallèles. — Pronotum plus large que haut et un peu plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure à peine sinueuse; les côtés arqués avec l'angle postérieur obtus; la base bisinuée et surmontée d'un large sillon anguleux. — Ecusson médiocre, en triangle à peine plus long que large. — Elytres assez convexes, atténués et subacuminés au sommet. — Prosternum assez large et tronqué en avant, plus étroit, un peu déclive et arrondi en arrière. — Mésosternum divisé; ses branches latérales courtes. — Mésternum large et faiblement échancré en avant. — Hanches postérieures obliques; les marges subparallèles. — Pattes assez robustes; fémurs épais, renflés et droits; tibias arqués, dilatés à leur extrémité; tarses assez longs, leur 4^e article dilaté; crochets bifides. — Corps grêle, allongé, cylindrique et atténué en arrière.

Distribution géographique de l'espèce. — M. Blackburn a fondé ce genre pour une espèce minuscule de Port Lincoln (Australie).

1. **G. casuarinae*, Blackburn, Trans. Roy. Soc. S. Austral. Vol. 10, p. 257 (1887) (Australie).

4. GENUS APHANISTICUS, LATREILLE

Aphanisticus. Latreille, Règne animal, Vol. 4, p. 448 (1829); Eschscholtz, Zool. Atlas, Vol. 1 (1829); Solier, Ann. Soc. Fr. Vol. 2, p. 315, pl. 12, f. 34 (1833); Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 1, pl. 1 (1839); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 88 (1857); Kiesenwetter, Deuts. Ins. Vol. 4, p. 162 (1857); H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 219 (1864). Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 519 (1865).

Goniophthalma. Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 106 (1837).

Caractères. — Tête forte et saillante, peu enfoncée dans le pronotum, plus ou moins creusée, parfois au point que les bords des yeux forment une carène tranchante; épistome étroit et allongé séparé du front par une carène transversale, rétréci en arrière par les cavités antennaires, son extrémité variable; cavités antennaires presque contiguës, assez grandes, arquées et contournant le bord inférieur des yeux. — Antennes peu robustes, logées dans une dépression du métanotum, cette dépression ne formant un sillon net que le long des yeux; dentées à partir du 8^e article, les articles 8 à 11 formant massue; 1 et 2 assez épais; 3 à 7 filiformes, grêles et subégaux entre eux ou variables. — Yeux très grands, elliptiques, très écartés en arrière sur le vertex et rapprochés vers l'épistome. — Pronotum variable, toujours plus large que long, le disque convexe ou transversalement sillonné. — Ecusson petit triangulaire. — Elytres variables, unis ou à côtes, toujours atténués et séparément arrondis au sommet; le calus huméral bien marqué et saillant. — Marge antérieure du prosternum munie d'une mentonnière variable, séparée du prosternum par un sillon transverse; prosternum large, plan, dilaté et plus ou moins tronqué en arrière. — Mésosternum divisé; ses branches latérales très courtes et très étroites. — Mésternum large et plus ou moins échancré en avant. — Hanches postérieures très courtes, faiblement dilatées au côté interne. — Pattes assez robustes; fémurs épais et renflés; tibias cylindriques, logés en partie dans un sillon du fémur, les quatre antérieurs arqués, les postérieurs droits; tarses très courts; articles 1-4 larges, triangulaires et presque emboîtés l'un dans l'autre, bilobés et lamellés; crochets dentés à la base. — Corps plus ou moins allongé et plus ou moins convexe, toujours atténué en arrière.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre paraît exclusivement propre à l'ancien continent. On en connaît actuellement 73 espèces, très inégalement réparties en Europe, en Asie, en Afrique, en Malaisie et en Australie.

1. *A. emarginatus*, Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 84, pl. 10, f. 116 (1760) (Europe, etc.).
distinctus, Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 521 (1854).
** emarginatus*, Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 161 (1857).
** emarginatus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 524 (1865).
var. angustatus, Lucas, Expl. Alg. Ent. p. 160 (1849).
** sculus* || Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 523 (1865).
** cupricola*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 140 (1893).
actuensis, Abeille, idem, p. 32 (1897).
var. elongatus, Villa, Cat. Col. p. 40 (1835).
Lamothai, Guérin, Rev. Zool. p. 139 (1839).
** elongatus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 525 (1865).
canaliculatus, Schaufuss, Nunq. Otios, Vol. 3, p. 554 (1882).
2. **A. aeneolus**, Kerremans (Mentawai).
** aeneus* || Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 364 (1896).
3. ** A. filiformis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 144 (1896) (Sumatra).
4. *A. lilliputanus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 75 (1879) (Australie).
5. *A. pusillus*, Olivier, Ent. Vol. 2, gen. 32, p. 91, pl. 12, f. 133 (1790) (Europe, etc.).
emarginatus, Fallen, Obs. Ent. Vol. 1, p. 11.
lineola, Germar, Fauna Ins. Eup. Vol. 3, p. 10 (1854).
** pusillus*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 526 (1865).
6. ** A. minutus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 307 (1896) (Congo).
7. *A. aequinoctialis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 75 (1879) (Benguela).
8. *A. pygmaeus*, Lucas, Expl. Alg. Ent. p. 16, pl. 16, f. 4 (1849) (Algérie).
sculus, Mulsant, Opusc. Ent. p. 24 (1863).
9. ** A. consanguineus*, Ritsema, Notes Leyd. Mus. Vol. 19, p. 125 (1897) (Java).
10. ** A. hova*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 297 (1899) (Madagascar).
11. *A. collaris*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 518 (1873) (Japon).
12. *** A. transversus**, nov. sp. (1) (Afrique orientale Anglaise).
13. ** A. agriloides*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 38 (1900) (Sumatra).
14. ** A. tristis*, Kerremans, idem (Sumatra).
15. ** A. nigroaeneus*, Kerremans, ibidem, p. 42 (Sumatra).
16. ** A. aeneus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. p. 349 (1893) (Hindoustan).
17. ** A. laevipennis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 43 (1900) (Sumatra).
18. ** A. ovalis*, Kerremans, idem, p. 42 (Sumatra).
19. *A. subviridis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 475 (1894) (Bengale).
20. *** A. latus**, nov. sp. (2) (Sumatra).
21. ** A. affinis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 41 (1900) (Sumatra).
22. *A. Krugeri*, Ritsema, Notes Leyd. Mus. Vol. 11, p. 237 (1889) (Sumatra).
23. ** A. viridipennis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 41 (1900) (Sumatra).
24. *A. delicatulus*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 371 (1851) (Zanguebar).
25. ** A. vicinus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 307 (1896) (Zanzibar).
26. *** A. leonensis**, nov. sp. (3) (Sierra Leone).

(1) Long. 5, 3; larg. 0, 9 mm. — *Allongé, cylindrique, bronzé très obscur et brillant en dessus, couvert d'une villosité blanchâtre longue mais très espacée. Dessous un peu plus clair que le dessus.* — Tête forte, profondément excavée avec le bord des yeux tranchant; pronotum carré, un peu plus long que large et à peine plus large en avant qu'en arrière, de la largeur de la tête en avant et de celle des élytres à la base, le disque avec une carène située avant le milieu, à une certaine distance de la marge antérieure et formant un angle très obtus; élytres couverts de rugosités épaisses formant de vagues rides transversales et présentant des stries ponctuées assez régulières, le sommet séparément arrondi et finement dentelé. Dessous ponctué, moins rugueux que le dessus. Faciès de l'*A. collaris*, Saunders, du Japon, mais le front plus creusé et les côtés du pronotum non arqués. — Mentawai.

(2) Long. 4; larg. 1, 3 mm. — *Oblong ovale, assez convexe, atténué en arrière, entièrement noir, la tête et le pronotum bronzés.* — Tête étroite avec un profond sillon médian; pronotum large, échancré en avant avec les angles antérieurs avancés, les côtés aplanis, élargis et arqués en avant et sinueux en arrière avec l'angle postérieur un peu saillant et presque droit, le disque avec un large sillon médian, transversal, un peu oblique et interrompu au milieu; élytres convexes, sans côtes distinctes, à stries vagues et ponctuées, déprimés sur les bords à hauteur des hanches, séparément arrondis au sommet. Faciès de l'*A. affinis*, Kerremans, de Sumatra, mais plus grand, plus robuste, un peu plus allongé, et le pronotum plus large sur les côtés en avant et rétréci en arrière. — Afrique orientale anglaise.

(3) Long. 2, 7; larg. 0, 75 mm. — *Entièrement noir, très brillant.* — Tête allongée, plus étroite que le pronotum, sillonnée au milieu; pronotum large, ses côtés dilatés, arrondis et aplanis avec l'angle antérieur avancé et le postérieur obtus, le disque avec un sillon transversal longeant le bord et un second sillon, plus large et plus profond, après le milieu; élytres convexes avec une courte côte droite naissant du calus huméral et une seconde côte située vers le sommet et limitant extérieurement un large évidemment limité intérieurement par la suture stries ponctuées distinctes mais peu régulières, le sommet subtronqué, largement arrondi. — Sierra Leone.

27. **A. nervosus*, (Fairmaire) (1) (Congo, Zanguebar).
 28. **A. assinicus*, nov. sp. (2) (Assinie).
 29. **A. aeneicollis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 306 (1896) (Zanguebar).
 30. *A. nodosus*, Gerstaecker, Arch. Naturg. Vol. 37, p. 58 (1871) (Mombaz).
 31. **A. bilobiceps* (Fairmaire) (3) (Zanguebar).
 32. **A. fluvialis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 306 (1896) (Congo).
 33. **A. mitratus*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 106 (1837) (Madagascar).
bicornutus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 2, pl. 1, f. 1 (1839).
 34. **A. cristatus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 353 (1894) (Madagascar).
 35. **A. insularis*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 533 (1894) (Sumatra).
 36. **A. Gestroi*, Kerremans, idem (Sumatra).
 37. **A. bicolor*, Kerremans, ibidem, p. 363 (1896) (Mentanei).
 38. **A. cordicollis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 39 (1900) (Sumatra).
 39. **A. cupricornis*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 1004 (1892) (Nouvelle-Guinée).
 40. **A. Weyersi*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 39 (1900) (Sumatra).
 41. **A. taciturnus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 180 (1898) (Ile Nias).
 42. **A. sumatrensis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 40 (1900) (Sumatra).
-
43. *A. amblyderus*, Fairmaire, Pet. Nouv. Ent. Vol. 2, p. 49 (1879) (Algérie).
 44. *A. antennatus*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 518 (1873) (Japon).
 45. *A. arcuaticollis*, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 114 (1861) (Ceylan).
 46. *A. ater*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 4, pl. 1, f. 4 (1839) (Madagascar).
 47. *A. auriculatus*, Castelnau & Gory, idem, p. 2, pl. 1, f. 2 (Madagascar).
 48. *A. Bedeli*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 140 (1893) (Algérie).
 49. *A. bispinus*, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 113 (1861) (Ceylan).
 50. *A. Bottegoi*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 505 (1899) (Somalis).
 51. *A. confusus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 225 (1864) (Malacca).
 52. *A. congener*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 518 (1875) (Japon).
 53. *A. diabolicus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 225 (1864) (Nouvelle-Guinée).
 54. *A. Goudoti*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 3, pl. 1, f. 3 (1839) (Madagascar).
 55. *A. impressicollis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 224 (1864) (Nouvelle-Guinée).
 56. *A. impressipennis*, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, p. 164 (1901) (Madagascar).
 57. *A. insculptus*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 372 (1851) (Limpopo).
 58. *A. marginicollis*, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 360 (1877) (Célèbes).
 59. *A. Marseuli*, Tournier. L'Abeille, Vol. 5, p. 144 (1868) (Egypte).
 60. *A. Mayeti*, Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 327 (1895) (Madagascar).
 61. *A. metallescens*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 219 (1892) (Bengale).
 62. *A. nigerrimus*, Kerremans Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 16, p. 365 (1896) (Mentawai).
 63. *A. oblongus*, Kerremans, idem, p. 359 (Nouvelle-Guinée).
 64. *A. occidentalis*, Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2), Vol. 3, p. 1233 (1888) (Australie).

(1) J'ai trouvé cette espèce, ainsi que celle qui suit, au n° 31 (*bilobiceps* Fairm.), dans la collection Fairmaire, sous ce nom, sans en avoir pu retrouver la description. Je crois donc pouvoir la donner ici : Long. 3; larg. 0,8 mm. — *Ovale allongé, asses convexe, entièrement noir, brillant.* — Tête droite, peu allongée, profondément creusée avec les bords des yeux tranchants; pronotum large avec les côtés arrondis en avant et sinueux en arrière, les angles antérieurs avancés et aigus, les postérieurs obtusément arrondis, le disque avec deux bourrelets transversaux séparés par des sillons parallèles, ces bourrelets un peu déprimés au milieu par un fin sillon longitudinal; élytres avec quelques vagues côtes dorsales peu nettes, largement évidés le long de la suture, du tiers postérieur au sommet, celui-ci tronqué avec ses côtés externes arrondis. — Zanguebar.

(2) Long. 3,4; larg. 0,7 mm. — *Oblong ovale, atténué en arrière, d'un noir très brillant en dessus, un peu plus mat en dessous.* — Tête allongée, profondément excavée avec le bord des yeux tranchant; pronotum large, dilaté, aplani et arrondi sur les côtés avec les bords finement crénelés, les angles antérieurs avancés et arrondis, les postérieurs obtus, le disque saillant avec un sillon longeant la marge antérieure et deux larges impressions longeant la base et étranglées au milieu où elles se joignent; élytres présentant trois côtes entre deux rangées de points irréguliers, le sommet tronqué carrément. — Assinie. (Ch. Alluaud).

(3) *Oblong ovale, allongé, atténué en arrière, d'un brun violacé obscur en dessus. Dessous noir.* — Tête creusée avec les bords des yeux tranchants; pronotum large, ses côtés très arqués, dilatés et aplatis avec les angles antérieurs peu avancés mais aigus et les postérieurs petits, saillants en dehors et aigus, le disque avec un sillon transversal et arqué, situé à une certaine distance du bord antérieur et un second sillon, très large mais moins net, après le milieu; élytres à stries ponctuées avec le calus huméral oblique, non prolongé en côte, et présentant des plis à la base et une côte médiane entière, limitant en arrière un profond sillon limité intérieurement par la suture, le sillon et unidenté de chaque côté, la dent limitée, de part et d'autre, par une troncature oblique. — Zanguebar.

65. *A. paradoxus*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 227, pl. 4, f. 20 (1864) (Makian).
66. *A. parvulus*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 370 (1851) (Natal).
67. *A. Perraudieri*, v. d. Poll, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 61, p. 19 (1892) (Indo-Chine).
68. *A. pullus*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 372 (1851) (Limpopo).
69. *A. pumilio*, Fahreus, idem, p. 373 (Natal).
70. *A. Satanas*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 223 (1864) (Malacca).
71. *A. simplex*, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, p. 163 (1901) (Madagascar).
72. *A. subfasciatus*, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 113, pl. 9, f. 6 (1861) (Ceylan).
73. *A. sulcicollis*, Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3), Vol. 2, p. 280 (1858) (Ceylan).

5. GENUS ENDELUS, H. DEYROLLE

Endelus. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 227 (1854).

Caractères. — Tête variable; front plus ou moins creusé; épistome variable, séparé du front par un sillon sinueux; cavités antennaires moyennes, subcontiguës. — Antennes médiocres, libres au repos, dentées à partir du 5^e ou du 6^e article; le 1^{er} épais, plus long que le 2^e; 2 court et renflé; 3 allongé et grêle, 4 et 5 plus courts, le second quelquefois triangulaire; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, parfois saillants et anguleux, le plus souvent elliptiques, souvent bordés en dessus par une carène tranchante, lorsque le front est profondément excavé. — Pronotum variable, plus ou moins arrondi sur les côtés, parfois rétréci en avant; la base toujours bisinuée avec un lobe médian tronqué. — Ecusson médiocre, en triangle équilatéral, parfois un peu allongé. — Elytres variables, allongés et subparallèles, ou cunéiformes, ou bien larges et parallèles en avant et brusquement rétrécis en arrière. — Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum court, largement arrondi au sommet. — Mésosternum divisé; ses branches latérales à peine visibles entre les hanches antérieures et les médianes. — Métosternum à peine échancré en avant. — Hanches postérieures courtes, leurs marges parallèles. — Pattes moyennes; fémurs épais et renflés, creusés sur leur bord interne pour l'insertion des tibias au repos; tibias droits, grêles et subcylindriques; tarses très courts; crochets dentés. — Corps plus ou moins épais et plus ou moins écourté, subpentagonal, toujours atténué en arrière.

Ce genre présente une grande analogie avec les *Aphanisticus*, qui précèdent, et comme lui, possède des espèces d'un polymorphisme assez accentué. Le front surtout, et les yeux sont très variables. Chez certaines espèces, le front est tellement creusé et les yeux si écartés qu'ils paraissent placés à l'extrémité d'un tube.

Distribution géographique des espèces. — On connaît une trentaine d'espèces de ce genre, disséminées par toute la Malaisie, à l'exclusion des autres régions du globe.

1. *E. Cupido*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 230 (1864) (Malacca, Sumatra).
Snellemani, Ritsema, Notes Leyd. Mus. Vol. 1, p. 155 (1879).
2. **E. elongatus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 44 (1900) (Sumatra).
3. **E. coeruleus*, Kerremans, idem, p. 46 (Sumatra).
4. **E. collaris*, Kerremans, ibidem, p. 45 (Sumatra).
5. *E. Weyersi*, Ritsema, Notes Leyd. Mus. Vol. 10, p. 175 (1888) (Sumatra).
6. **E. minutus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 45 (1900) (Sumatra).
7. **E. parallelus*, Kerremans, idem, p. 44 (Sumatra).
8. **E. Modiglianii*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 366 (1892) Mentawai, Sumatra).
9. **E. diabolicus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 86 (1900) (Humboldt Bay).
10. **E. cornutus*, Kerremans, idem, p. 85 (Batchian).
11. **E. signatus*, Kerremans, ibidem, p. 84 (Humboldt Bay).
12. **E. subcornutus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 344 (1900) (Nouvelle Guinée).

13. *E. aethiops*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 235 (1864) (Java).
14. *E. apicalis*, H. Deyrolle, idem, p. 233 (Nouvelle Guinée).
15. *E. aureocupreus*, Kerremans, ibidem, Vol. 36, p. 219 (1892) (Bengale).
16. *E. Brutus*, H. Deyrolle, ibidem, Vol. 8, p. 236 (1864) (Makian).
17. *E. coracoides*, Kerremans, ibidem, Vol. 36, p. 220 (1892) (Bengale).
18. *E. curtus*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 826 (1892) (Birmanie).
19. *E. difformis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 236, pl. 3, f. 9 (1864) (Bornéo).
20. *E. empyreus*, H. Deyrolle, idem, p. 230, pl. 3, f. 7 (Sumatra).
21. *E. Endymio*, H. Deyrolle, ibidem, p. 231 (Bornéo).
22. *E. intermedius*, H. Deyrolle, ibidem, p. 234 (Mysol).
23. *E. Marseuli*, H. Deyrolle, ibidem, p. 232 (Bornéo).
24. *E. Mephistopheles*, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 361 (1877) (Ternate).
25. *E. nitidus*, Kerremans, idem, p. 365 (1896) (Mentawai).
26. *E. quadraticollis*, Kerremans, ibidem, p. 534 (1894) (Sumatra).
27. *E. scintillans*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 232, pl. 3, f. 8 (1864) (Célèbes).
28. *E. viridimaculatus*, H. Deyrolle, idem, p. 234 (Gilolo).

6. GENUS TRACHYS, FABRICIUS

Trachys. Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 218 (1801); Eschscholtz, Zool. Atl. Vol. 1 (1829); Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 311, pl. 12, f. 30 (1832); Castelmou & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 1, pl. 1 (1839); Redtenbacher, Fauna Austr. p. 288 (1848); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 88 (1857); Kiesenwetter, Deutschl. Ins. Vol. 4, p. 166 (1857); H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 219 (1864); Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 504 (1865).

Habroloma. Thomson, Skand. Col. Vol. 6, p. 42.

Caractères. — Tête plus ou moins large, sillonnée ou excavée; épistome rétréci en arrière par les cavités antennaires et échancré en avant; cavités antennaires médiocrement espacées, assez grandes. — Antennes libres à l'extrémité, les articles de la base insérés au repos dans un sillon situé entre les yeux et le bord de l'épistome, ce sillon non continué sur le métanotum; article 1 et 2 épais, 1 plus grand que 2; 3 à 6 grêles, cylindriques ou obconiques; les suivants triangulaires dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux ovales, obliques et plus écartés en arrière; sur le vertex, qu'en avant. — Pronotum beaucoup plus large que long, plus étroit en avant qu'en arrière; la marge antérieure profondément échancrée en arc avec les angles antérieurs avancés et aigus; la base bisinuée avec le lobe médian anguleux ou largement arrondi. — Ecusson invisible ou très petit, alors triangulaire. — Elytres larges, atténués en arrière et arrondis au bout, étroitement rebordés; le calus huméral bien marqué, parfois caréné et prolongé suivant une côte qui longe la marge latérale à une certaine distance de celle-ci. — Marge antérieure du prosternum munie d'une mentonnière distincte, plus ou moins large; prosternum court, large, plan, arrondi au sommet. — Branches latérales du mésosternum à peine distinctes. — Mésternum faiblement échancré en arc en avant. — Hanches postérieures dilatées au côté externe. — Pattes peu robustes, espacées; fémurs assez épais et renflés; tibias grêles et droits; tarses très courts, leurs articles assez élargis et lobés, le premier un peu plus long que les suivants; crochets fortement dentés à la base. — Corps écourté, subovoïde ou pentagonal.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre comprend un grand nombre d'espèces, réparties sur tout l'ancien continent, avec quelques espèces disséminées dans l'Amérique centrale.

Excèsivement polymorphe, il pourrait se subdiviser en un grand nombre de groupes ou sections bien tranchés: Pour la facilité du groupement, je le diviserai provisoirement en cinq sections.

1. *Dessus plus ou moins vilieux, jamais fasciculé.* 2
- *orné de fascicules de poils* § a

2. Une côte élytrale longeant la marge extérieure et naissant du calus huméral, celui-ci relevé et caréné 3
 Pas de côte élytrale 4
3. La côte élytrale courte et dirigée obliquement vers la suture § b
 — — longeant toute la marge latérale à une certaine distance de celle-ci § c
4. Extrémité de l'élytre plus ou moins saillante en bosse et ensuite brusquement déclive § d
 — — régulièrement arquée § e

§ a

1. **T. imperatrix*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 354 (1894) (Madagascar).
2. **T. magnifica*, Kerremans, idem, p. 355 (Madagascar).
3. **T. exsculta*, Kerremans, ibidem, p. 356 (Madagascar).
4. **T. Alluaudi*, Kerremans, ibidem, p. 356 (Madagascar).
5. **T. reflexa*, Génée, Ins. Sard. Vol. 2, p. 12, pl. 2, f. 3 (1839) (Italie).

§ b

6. **T. lanceolata*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 366 (1896) (Mentawai).
7. **T. costipennis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 52 (1900) (Sumatra).
8. **T. corpulenta*, Kerremans, idem, p. 52 (Sumatra).

§ c

9. **T. pretoriensis*, nov. sp. (1) (Transvaal).
10. **T. camerunica*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 298 (1899) (Cameroon).
11. *T. eximia*, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 337 (1892).
12. *T. griseonigra*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 521 (1873) (Japon).
13. *T. Lewisi*, Saunders, idem, p. 519 (Japon).
14. **T. hova*, Théry (Madagascar) (2).
15. **T. pauperula*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 313 (1896) (Nouvelles-Galles du Sud).
16. **T. prudens*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 93 (1900) (Ile Fergusson).
17. **T. confinis*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 537 (1894) (Sumatra).
18. **T. sparsa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 356 (Belgaum).
19. **T. aeneocuprea*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 208 (1890) (Bengale).
20. **T. antiqua*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 345 (1900) (Nouvelle Guinée).
21. **T. placida*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 91 (1900) (Humboldt Bay).
22. **T. dissimilis*, Kerremans, idem, p. 55 (Sumatra).
23. **T. media*, Kerremans, ibidem, p. 56 (Sumatra).
24. **T. palawana*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 92 (1898) (Palanan).
25. **T. perplexa*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 55 (1900) (Sumatra).
26. **T. stigmatica*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 225 (1892) (Inde).
27. **T. cyanura*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 50 (1900) (Sumatra).
28. **T. sincera*, Kerremans, idem, p. 89 (Ile Banguéy).
29. **T. marginicollis*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 24 (1888) (Chine).
30. **T. bicarinata*, Kerremans, Idem, Vol. 36, p. 224 (1892) (Inde).
31. **T. bangueyiana*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 89 (1900) (Ile Banguéy).
32. **T. affinis*, Kerremans, idem, p. 54 (Sumatra).
33. **T. acuta*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 357 (1893) (Inde).

(1) Long. 4; larg. 2 mm. — Oblong ovale, élargi à l'épaule, arrondi en avant, atténué en ligne droite en arrière; broussé obscur en dessus et couvert d'une abondante villosité rousse, orné sur le pronotum d'une double traversée villose plus claire et, sur les élytres, de bandes semblables, longitudinales, un peu obliques, incurvées en avant vers la suture, autour d'espaces arrondis, plus dénudés. Dessous broussé brillant à courte villosité rousse, très peu dense. — Front large, bisinué; carène des yeux tranchant; pronotum très large, sa base très onduleuse avec un large lobe médian arrondi, les angles postérieurs aigus et un peu abaissés sur l'épaule; écusson visible; élytres avec une côte fine naissant sur le calus huméral et longeant le bord à une certaine distance de celui-ci. — Transvaal. (E. Simon, par Ch. Alluaud).

(2) M. Théry m'a donné cette espèce sous ce nom, sans me dire où il l'avait décrite. Je la crois inédite, mais incontestablement nouvelle et je ne la cite que pour mémoire.

34. **T. accepta*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 535 (1894) (Sumatra).
35. **T. lepidoptera*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 256 (1864) (Bornéo, Sumatra).
36. **T. taciturna*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 380 (1894) (Perack).
37. **T. Konbirensis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 92 (1900) (Bengale).
38. **T. nobilitata*, Kerremans, idem, p. 54 (Sumatra).
39. **T. gentilis*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 34, p. 540 (1894) (Sumatra).
* *var. amica*, Kerremans, idem, p. 541.
40. **T. lineata*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 53 (1900) (Sumatra).
41. **T. delectabilis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 58 (1900) (Sumatra).
42. **T. modesta*, Kerremans, idem, p. 57 (Sumatra).
43. **T. ignota*, Kerremans, ibidem, p. 92 (Monts Orjuno).
44. **T. andaica*, Kerremans, ibidem, p. 88 (Nouvelle-Guinée).
45. **T. curvifrons*, Kerremans, ibidem, p. 56 (Sumatra).
46. **T. aeneola*, Kerremans, ibidem, p. 59 (Sumatra).
47. *T. variegata*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 265 (1864) (Bornéo, Sumatra).
48. **T. tetra*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 60 (1900) (Sumatra).
49. **T. morosa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 356 (1893) (Hindoustan).
50. **T. amabilis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 58 (1900) (Sumatra).
51. **T. Weyersi*, Kerremans, idem, p. 57 (Sumatra).
52. **T. insidiosa*, Kerremans, ibidem, p. 90 (Ile Fergusson).
53. **T. fraterna*, Kerremans, ibidem, p. 90 (Luçon).
54. **T. moesta*, Kerremans, ibidem, p. 92 (Humboldt Bay).
55. **T. subfasciata*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 539 (1894) (Sumatra).
56. **T. modica*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 91 (1900) (Nouvelle-Guinée).
57. **T. congener*, Kerremans, idem, p. 58 (Sumatra).
- 57^a. **T. lilliputana*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 208 (1890) (Chota Nagpore).
58. **T. australis*, Blackburn (Australie)
59. *T. nana*, Paykhull, Faun. Suec. Vol. 2, p. 233 (1799) (Europe, etc.)
 minuta, Rossi, Faun. Etrur. Vol. 1, p. 190 (1790).
 triangularis, Lacordaire, Faune Paris. Vol. 1, p. 616 (1831).
 trogodytes, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 10, pl. 2, f. 13 (1839).
 * *nana*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 516 (1865).
60. *T. Pandellei*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 79, pl. 3, f. 6 (1852) (Pyrénées).
 * *Pandellei*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 518 (1865).

§ d.

61. *T. orientalis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 77 (1879) (Bengale).
62. **T. bicolor*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 208 (1890) (Chota Nagpore).
63. **T. obesa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 345 (Zambèse).
64. **T. signata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 145 (1896) (Sumatra).
65. **T. luzonica*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 91 (Iles Philippines).
66. **T. tristis*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 23 (1888) (Chine).
67. **T. dejecta*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 89 (Sumatra).
68. **T. chinensis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 181 (1898) (Hong-Kong).
69. **T. verna*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 48 (1900) (Sumatra).
70. **T. excavata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 355 (1893) (Bengale).
71. **T. violascens*, Kerremans, idem, p. 355 (Bengale).
72. **T. bella*, Kerremans, ibidem, Vol. 38, p. 477 (1894) (Ceylan).
73. **T. atra*, Kerremans, ibidem, Vol. 37, p. 354 (1893) (Bengale).
74. **T. gravida*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 49 (1900) (Sumatra).
75. *T. Duvivieri*, Kerremans, idem, Vol. 1, p. 285 (1892) (Congo).
 * *apicata* || Duvivier, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 195 (1890).
76. **T. Kraatzi*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 297 (1899) (Cameroon).

77. **T. occisa*, nov. sp. (1) (Afrique orientale Anglaise).
 78. **T. fluviatilis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 313 (1896) (Ogowé).
 79. *T. minuta*, Linné, Syst. Nat. ed. 10, Vol. 1, p. 410 (1758) (Europe, etc.).
 * *minuta*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 510 (1865).
 80. **T. vermiculata*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 48 (1900) (Sumatra).
 81. **T. obliqua*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 223 (1892) (Bengale).
 82. **T. viridula*, Kerremans Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 61, p. 25 (1892) (Iles Philippines).
 83. **T. sumbawana*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 42, p. 181 (1898) (Sumbawa).
 84. **T. Davidis*, Fairmaire, idem, Vol. 32, p. 23 (1888) (Chine).
 85. **T. Saundersi*, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 337 (1892) (Japon).
 86. *T. subbicornis*, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 8 (Japon).
 87. **T. salicis*, Lewis, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 24, p. 337 (1892) (Japon).
 88. **T. abietis*, nov. sp. (2) (Stanley Falls).
 89. **T. fidens*, nov. sp. (3) (Afrique orientale anglaise).
 90. **T. percauta*, nov. sp. (4) (Afrique orientale anglaise).
 91. **T. grandiceps*, Théry (Madagascar) (5).
 92. **T. sellata*, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, p. 165 (1901) (Madagascar).
 93. **T. Simoni*, nov. sp. (6) (Cap de Bonne-Espérance).
 94. *T. lucidula*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 369 (1851) (Cap de Bonne-Espérance).
 95. **T. africana*, nov. sp. (7) (Afrique orientale anglaise).
 96. **T. differens*, nov. sp. (8) (Afrique orientale anglaise).
 97. **T. erratica*, nov. sp. (9) (Afrique orientale anglaise).
 98. **T. juvenilis*, nov. sp. (10) (Afrique orientale anglaise).
 99. **T. zanzibarica*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 314 (1896) (Zanguebar).
 100. **T. Horni*, Théry (Ceylan) (5).
 101. **T. virescens*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 828 (1892) (Birmanie).

(1) Long. 3,2; larg. 1,8 mm. — Oblong ovale, assez épais, entièrement noir, brillant, un peu violacé; tête et pronotum couverts d'une villosité rousse dorée assez dense. Élytres ornés de bandes sinuées grises. Dessous noir. — Tête largement et peu profondément excavée, le bord des yeux relevé; côtés du pronotum obliquement atténués en ligne droite, la base bisinuée avec un lobe médian arrondi; écusson visible; élytres sans côte prémarginale, très rugueux, inégalement chagrinés, le calus huméral très saillant et surmonté d'une carène crénelée, courte et dirigée obliquement en ligne droite vers la suture, le sommet saillant en dessus et brusquement déclive ensuite. Dessous moins rugueux que le dessus, irrégulièrement ponctué. — Afrique orientale anglaise. (Staudinger).

(2) Long. 4; larg. 7,2 mm. — Ovalaire, épais, écourté; tête et pronotum bronzé obscur, couverts d'une villosité jaune grisâtre terne; élytres noirs, couverts de la même villosité, très rare sur le disque, disposée en vagues bandes larges vers le sommet. Dessous noir à reflets violacés. — Tête assez large excavée, avec le bord des yeux saillant; côtés du pronotum obliquement atténués en ligne presque droite, à peine arqués, la base très onduleuse avec le lobe médian très large, très avancé et très arqué; écusson visible; élytres très rugueux, grossièrement chagrinés, le calus huméral très saillant et caréné, mais non prolongé en côte, le sommet relevé et ensuite brusquement déclive. — Stanley Falls. (Seeldrayers).

(3) Long. 2,8; larg. 1,5 mm. — Ovalaire, épais, un peu atténué en arrière, bronzé violacé pourpré brillant en dessus et couvert d'une villosité rousse dorée peu dense, les élytres ornés de bandes sinuées et blanches. Dessous noir brillant. — Tête faiblement excavée, le bord des yeux non caréné; les côtés du pronotum à peine arqués; écusson visible; le calus huméral épais, subcaréné obliquement vers la suture; le sommet des élytres un peu relevé en bosse et ensuite déclive. — Afrique orientale anglaise. (Staudinger).

(4) Long. 3; larg. 1,6 mm. — Ovalaire, assez épais, arrondi en arrière; tête et pronotum bronzés; élytres noirs avec deux bandes sinuées grises vers le sommet. Dessous noir. — Tête largement et peu profondément excavée, avec le bord des yeux tranchant; côtés du pronotum obliquement atténués en arc, le lobe médian de la base plus étroit et arrondi; écusson visible; élytres vaguement striés, le calus huméral saillant et surmonté d'une courte carène oblique dirigée vers la suture, le sommet un peu relevé en bosse et ensuite brusquement déclive. — Afrique orientale anglaise. (Staudinger).

(5) Voir la note 2, page 308.

(6) Long. 3; larg. 1,7 mm. — Oblong, écourté, épais, arrondi en avant et en arrière; les côtés parallèles; entièrement bronzé et couvert, en dessus, d'une très courte villosité grise, espacée. — Tête large, faiblement excavée en avant et finement sillonnée en arrière; côtés du pronotum obliquement atténués en arc, la base sinuée avec le lobe médian subanguleux; écusson visible; élytres à ponctuation peu profonde mais assez régulière, le calus huméral faible et non caréné, le sommet à peine relevé et un peu déclive à l'extrémité. — Cap de Bonne-Espérance. (E. Simon par Ch. Alluaud).

(7) Long. 3,4; larg. 1,8 mm. — Court, épais, arrondi en arrière, entièrement noir, brillant, très légèrement bleuâtre, les élytres couverts d'une rare villosité grise, vaguement disposée en bandes vers le sommet. — Tête largement creusée, le bord des yeux relevé et tranchant; écusson visible; calus huméral très fort et caréné; sommet des élytres relevé en bosse et brusquement déclive ensuite. — Afrique orientale anglaise (Staudinger).

(8) Long. 3; larg. 1,7 mm. — Ovalaire, assez épais; les côtés parallèles bronzé obscur et couverts d'une courte villosité brune disposée, sur les élytres, en larges bandes sinuées. — Tête largement et peu profondément excavée; le bord des yeux un peu relevé mais non tranchant; écusson visible; calus huméral peu saillant, à très courte carène un peu arquée; extrémité des élytres à peine relevée en bosse et ensuite obliquement déclive. — Afrique orientale anglaise (Staudinger).

(9) Long. 2,5; larg. 1,5 mm. — Ovalaire, assez épais, les côtés un peu obliques et atténués vers le sommet, bronzé brillant, plus lisse que les précédents, couvert d'une villosité rousse très rare, agglomérée vers le sommet. Dessous noir. — Tête large, à peine excavée; pronotum relativement haut, les côtés très obliquement atténués en ligne droite, la base onduleuse avec un large lobe médian arqué; élytres à ponctuation épaisse, le calus huméral assez saillant mais non caréné, le sommet à peine relevé et obliquement déclive ensuite. — Afrique orientale anglaise (Staudinger).

(10) Long. 2,4; larg. 1,4 mm. — Faciès du précédent, mais d'un bronzé pourpré avec les élytres couverts d'une villosité rousse dorée et de deux bandes sinuées blanches, l'une très vague, vers le milieu, l'autre plus nette, au tiers postérieur, un peu oblique, élargie vers la suture; une tache arrondie entre cette bande et le sommet. — Tête faiblement excavée, le bord des yeux un peu relevé en carène; côté du pronotum obliquement arqués, le lobe médian de la base subanguleux; écusson visible; élytres finement granuleux, à séries longitudinales de points assez rapprochées, le calus huméral oblique, faible et non caréné, le sommet à peine relevé et obliquement déclive ensuite. — Afrique orientale anglaise (Staudinger).

102. **T. divergens*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 350 (1893) (Belgaum).
 103. **T. sparsa*, Kerremans, idem, p. 356 (Belgaum).
 104. **T. rufescens*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 61, p. 25 (1892) (Manille).
 105. **T. simulans*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 349 (1893) (Bengale).
 106. **T. plebeja*, Kerremans, idem, Vol. 38, p. 476 (1894) (Bengale).
 107. **T. nova*, Kerremans, idem, p. 476 (Perak).
 108. **T. aenescens*, Kerremans, ibidem, Vol. 36, p. 221 (1892) (Inde).
 109. **T. obscura*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 146 (1896) Sumatra).
 110. **T. globosa*, Kerremans, idem, p. 145 (Sumatra).
 111. **T. brunneiana*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 87 (1900) (Brunnei).
 112. **T. pilosula*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 354 (1893) (Bengale).
 113. **T. fallax*, Kerremans, idem, p. 350 (Bengale).
 114. **T. æqualis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 51 (1900) (Sumatra).
 115. **T. transversa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 224 (1892) (Bengale).

§ e

116. **T. borneensis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 88 (1900) (Bornéo).
 117. *T. pumila*, Illiger, Mag. Insekt. Vol. 2, p. 257 (1803) (Europe, etc.)
 corrusca, Drapiez, Ann. Soc. Phys. Brux. Vol. 1, p. 132, pl. 7, f. 3 (1819).
 intermedia, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 7, pl. 2, f. 8 (1839).
 * *pumila*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 515 (1865).
 118. **T. cincta*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 51 (1900) (Sumatra).
 119. **T. umbrosa*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 536 (1894) (Sumatra).
 120. **T. Blackburni*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 313 (Nouvelles-Galles du Sud).
 121. **T. cupripyga*, H. Deyrolle, idem, Vol. 8, p. 247 (1864) (Sumatra, Bornéo).
 122. ***T. Fairmairei**, nov. sp. (1) (Madagascar).
 123. **T. Tschoffeni*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 314 (1896) (Congo).
 124. **T. Andrewesi*, Kerremans, idem, Vol. 37, p. 353 (1893) (Bengale).
 125. **T. nitidula*, Fairmaire (Tonkin).
 126. **T. maculata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 478 (1894) (Bengale).
 127. **T. nitida*, Kerremans, idem, Vol. 37, p. 351 (1893) (Bengale).
 128. **T. pacifica*, Kerremans, ibidem, Vol. 38, p. 478 (1894) (Bengale).
 129. **T. mansueta*, Kerremans, ibidem, p. 479 (Bengale).
 130. **T. rotundata*, Kerremans, ibidem, Vol. 37, p. 352 (1893) (Bengale).
 131. **T. parvula*, Kerremans, ibidem, p. 352 (Bengale).
 132. ***T. hovasiana**, nov. sp. (2) (Madagascar).
 133. **T. asiatica*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 87 (1900) (Cachemyre).
 134. ***T. levipennis**, nov. sp. (3) (Afrique orientale anglaise).
 135. ***T. assinica**, nov. sp. (4) (Assinie).
 136. *T. phlyctaenoides*, Kolenati, Melet. Ent. Vol. 5, p. 35 (1846) (Crimée).

(1) Long. 1,5; larg. 1,3 mm. — Ovalaire, les côtés subparallèles; d'un bronze cuivreux très brillant, couvert d'une villosité grise agglomérée çà et là sur les élytres. — Tête large, front bisinué, bords des yeux très relevés en carène; pronotum faiblement échancré en avant; écusson visible; élytres à ponctuation épaisse et inégale, les parties villeuses finement granuleuses, le calus huméral assez épais, oblique, non caréné, le disque régulièrement arqué de la base au sommet. — Madagascar (Fairmaire).

(2) Long. 2,7; larg. 1,5 mm. — Ovalaire, les côtes parallèles, atténué en arrière, entièrement noir avec le tiers postérieur des élytres bronzé, ceux-ci couverts d'une villosité grise vaguement disposée en bandes, la partie bronzée couverte d'une villosité roux doré. — Tête assez large, sillonnée, vaguement excavée, le bord des yeux non caréné; pronotum couvert de ramifications vermiculées enfoncées et très irrégulières, le sommet faiblement bisinué, la base onduleuse avec un très large lobe médian arqué; écusson visible; élytres très rugueux, le calus huméral saillant et caréné, le sommet régulièrement arqué. — Madagascar (Ch. Alluaud).

(3) Long. 3; larg. 1,6 mm. — Faciès du *T. erratica* qui précède n° 97, mais le front plus large et plus creusé; tête et pronotum bronzé verdâtre clair, élytres bronzé cuivreux très brillant. Dessus bronzé obscur. — Tête largement creusée, le bord des yeux caréné; pronotum faiblement échancré en avant et fortement onduleux à la base avec un large lobe médian avancé et arqué, les côtés obliquement arqués; écusson visible; élytres lisses, vaguement ponctués, les points épais mais peu profonds, la villosité grise, plus dense sur la moitié postérieure, le calus huméral saillant, surmonté d'une carène arquée. — Afrique orientale anglaise (Staudinger).

(4) Long. 2,5; larg. 1,3 mm. — Ovalaire, épais, les côtés à peine atténués en arrière, entièrement noir, très brillant; les élytres ornés de deux vagues bandes sinuées grises, l'une médiane, l'autre au tiers postérieur et d'un point préapical de même. — Tête excavée en avant et sillonnée en arrière, bords des yeux faiblement carénés; pronotum faiblement échancré en arc en avant, sinueux en arrière avec un large lobe médian avancé et arqué, les côtés obliquement atténués en arc; écusson visible; élytres avec le calus huméral bien marqué mais non caréné, le sommet largement arrondi. — Assinie (Ch. Alluaud).

137. **T. discreta*, nov. sp. (1) (Cap de Bonne-Espérance),
 138. **T. amazonica*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 26 (1896) (Brésil).
 139. **T. estebana*, Kerremans, idem, p. 25. (Vénézuéla).
 140. **T. Chevrolati*, Kerremans, ibidem, p. 26 (Guadeloupe).
 141. *T. torrida*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a. p. 77 (1879) (Benguela).
 142. *T. segregata*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 131 (1889) (Guatémala).
 143. *T. troglodytes*, Schoenherr, Syn. Ins. App. p. 125 (1817) (Europe, etc.).
 antea, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 122 (1837).
 humila, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 8, pl. 2, f. 10 (1839).
 * *troglodytes*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 512 (1865).
 144. *T. fragariae*, Brisout, Bull. Soc. Ent. Fr. (5) vol. 4, p. 20 (1874) (France).
 145. *T. Marseuli*, Brisout, idem, p. 20 (1874) (France).
 146. *T. hipponensis*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 513 (1865) (Bone).
 147. *T. Goberti*, Bauduer (Europe méridionale?).
 148. *T. pygmaea*, Fabricius, Mant. Ins. Vol. 1, p. 183 (1787) (Europe, etc.).
 corrusca, Ponza, Col. Salut. p. 81 (1805).
 laevicollis, Schaum, Stett. Cat. p. 45 (1856).
 * *pygmaea*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 511 (1865).
 149. **T. boliviana*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 126 (1897) (Bolivie).
 150. *T. turanica*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 27, p. 497 (1893) (Turkestan).
-
151. *T. acuminata*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 261 (1864) (Céram).
 152. *T. aeneopyga*, H. Deyrolle, idem, p. 257 (Bornéo).
 153. *T. ahenata*, Mulsant, Opusc. Ent. Vol. 13, p. 26 (1863) (Crimée).
 154. *T. albographa*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 249 (1864) (Iles Arou).
 155. *T. albomaculata*, H. Deyrolle, idem, p. 253 (Morty).
 156. *T. albopicta*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 16, p. 360 (1896) (Nouvelle-Guinée).
 157. *T. anthrenoides*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 77 (1879) (Inde).
 158. *T. apicalis*, v. d. Poll, Not. Leyden Mus. Vol. 9, p. 181 (1887) (Célèbes).
 159. *T. apicata*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 105 (1837) (Madagascar).
 acephala, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 2, pl. 1, f. 1 (1839).
 160. *T. argentea*, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 114 (1861) (Ceylan).
 161. *T. argenteosparsa*, Théry, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 66, p. 367 (1897) (Sierra Leone).
 162. *T. aurea*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 24, p. 212 (1890) (Transcaspienne).
 163. *T. auricollis*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 520 (1873) (Japon).
 164. *T. auriflua*, Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 11, p. 280 (1876) (Sibérie orientale).
 165. *T. australasiae*, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 9, p. 362 (1877) (Queensland).
 166. *T. azurea*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 247 (1864) (Mysole).
 167. *T. bactriana*, Semenow, Hor. Soc. Ent. Ross. Vol. 29, p. 351 (1895) (Bukhara).
 168. *T. Bali*, Guérin, Rev. Zool. p. 329 (1840) (Inde).
 169. *T. Barnevillei*, Tournier, L'Abeille, Vol. 5, p. 145 (1868) (Algérie).
 170. *T. basilica*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 262 (1864) (Batchian).
 171. *T. bifrons*, Kiesenwetter, Deutsch. Ent. Zeit. Vol. 33, p. 256 (1879) (Amour).
 172. *T. brevior*, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 165 (1901) (Madagascar).
 173. *T. capensis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 353, pl. 60, f. 352 (1841) (Cap de Bonne-Espér.).
 174. *T. carbonaria*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 243 (1864) (Bornéo).
 175. *T. carinata*, H. Deyrolle, idem, p. 248 (Nouvelle-Guinée).
 176. *T. cavata*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 23 (1895) (Syrie).
 177. *T. chromatica*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 251 (1864) (Bornéo).
 178. *T. cinereovirrata*, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 115 (1861) (Ceylan).

(1) Long. 2,3; larg. 1,3 mm. — Ovale assez épais, atténué et arrondi en arrière, bronzé violace obscur en dessus, les élytres avec des bandes préapicales grises, onduleuses et très vagues. Dessous noir. — Tête large, convexe et sillonnée en arrière, déprimée en avant, le bord des yeux non caréné; pronotum faiblement échancré en arc en avant, onduleux en arrière avec un large lobe médian avancé et arrondi; écusson visible; élytres avec le calus huméral saillant et surmonté d'une carène oblique, le sommet moins arrondi, plus atténué que chez le *T. assinica*, qui précède. — Cap de Bonne-Espérance (L. Fairmaire).

179. *T. commixta*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 76 (1879) (Inde).
180. *T. compressa*, Abeille, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 286 (1891) (France méridionale).
181. *T. confusa*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 263 (1864) (Mysole).
182. *T. consimilis*, Kerremans, idem, Vol. 38, p. 477 (1894) (Perak).
183. *T. coracina*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 366 (Limpopo).
184. *T. cribrosa*, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 166 (1901) (Madagascar).
185. *T. cupricauda*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 255 (1864) (Bornéo).
186. *T. cupricolor*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 521 (1873) (Japon).
187. *T. decora*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 258 (1864) (Bornéo).
188. *T. decorata*, H. Deyrolle, idem, p. 259 (Salwatty).
189. *T. denudata*, Ritsema, Not. Leyden Mus. Vol. 1, p. 156 (1879) (Sumatra).
190. *T. depressifrons*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 264 (1864) (Bornéo).
191. *T. dubia*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 328 (1874) (Bohol).
192. *T. elegans*, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova. Vol. 9, p. 361 (1877) (Java).
193. *T. elegantula*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 520 (1873) (Japon).
194. *T. evanescens*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 369 (1851) (Natal).
195. *T. exilis*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 535 (1894) (Sumatra).
196. *T. fasciata*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 4, pl. 1, f. 5 (1839) (Madagascar).
197. *T. fasciuncula*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 320 (1866) (Laos).
198. *T. flaviceps*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 223 (1892) (Inde).
199. *T. Fleutiauxi*, v. d. Poll, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 61, p. 19 (1892) (Hué).
200. *T. Frenchi*, v. d. Poll, Notes Leyden Mus. Vol. 9, p. 126 (1887) (Queensland).
201. *T. griseifasciata*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 521 (1873) (Japon).
202. *T. hilaris*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 538 (1894) (Sumatra).
203. *T. humeralis*, Kerremans, idem, p. 360 (1896) (Nouvelle-Guinée).
204. *T. humilis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 266 (1864) (Nouvelle-Guinée).
205. *T. impressa*, Boheman, Res. Eugen. Ent. p. 65 (1858) (Chine).
206. *T. incerta*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 366 (1851) (Natal).
207. *T. inconspicua*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 522 (1873) (Japon).
208. *T. inedita*, Saunders, idem, p. 522 (Japon).
209. *T. integra*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 225 (1892) (Inde).
210. *T. irregularis*, H. Deyrolle, idem, Vol. 8, p. 264 (1864) (Ternate).
211. *T. Koenigi*, Reitter, Wien. Ent. Zeit. p. 146 (1890) (Circassie).
212. *T. lacunosa*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 262 (1864) (Gilolo).
213. *T. laeta*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 539 (1894) (Sumatra).
214. *T. languida*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 479 (1894) (Ceylan).
215. *T. laticollis*, H. Deyrolle, idem, Vol. 8, p. 248 (1864) (Bornéo).
216. *T. lubrica*, H. Deyrolle, idem, p. 266 (Bornéo).
217. *T. lyra*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 828 (1892) (Birmanie).
218. *T. major*, Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 284 (1864) (Espagne).
219. *T. mellicula*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 246 (1864) (Makian).
220. *T. mendica*, H. Deyrolle, idem, p. 244 (Malacca).
221. *T. micros*, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 166 (1901) (Madagascar).
222. *T. minima*, Wiedeman, Zool. Mag. Vol. 2, p. 104 (1825) (Bengale).
223. *T. murina*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 258 (1864) (Bornéo).
224. *T. nigra*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 829 (1892) (Birmanie).
225. *T. notata*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 260 (1864) (Célèbes).
226. *T. nubila*, H. Deyrolle, idem, p. 254 (Mysole).
227. *T. nuda*, Abeille, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 355 (1893) (Asie mineure).
228. *T. opulenta*, Abeille, idem, p. 355 (Turkestan).
229. *T. parallela*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 505 (1899) (Somalis).
230. *T. parallellicollis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 267 (1864) (Mysole).
231. *T. penicillata*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 827 (1892) (Mentawai).

232. *T. Perrieri*, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, Vol. 10, p. 164 (1901) (Madagascar).
233. *T. picturata*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 251 (1864) (Céram.).
234. *T. polita*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 831 (1892) (Birmanie).
235. *T. popula*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 257 (1864) (Bornéo).
236. *T. princeps*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. p. 328 (1874) (Iles Philippines).
237. *T. puberula*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 367 (1851) (Gariep).
238. *T. pulicaria*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 267 (1864) (Mysole).
239. *T. pupilla*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 537 (1894) (Sumatra).
240. *T. quercicola*, Marseul, Ann. Soc. Ent. Fr. (5), Vol. 1, p. 80 (1871) (Sabaudie).
241. *T. vesilla*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 250 (1864) (Bornéo).
242. *T. robusta*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 521 (1873) (Japon).
243. *T. rudis*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 830 (1892) (Birmanie).
244. *T. rufopubens*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 32, p. 24 (1888) (Chine).
245. *T. rugata*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 1005 (1892) (Nouvelle-Guinée).
246. *T. senegalensis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 351, pl. 60, f. 350 (1841) (Sénégal).
247. *T. setulosa*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 254 (1864) (Nouvelle-Guinée).
248. *T. simplex*, H. Deyrolle, idem, p. 252 (Morty).
249. *T. socialis*, Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. 9, p. 592 (1875) (Nouvelle-Galles du Sud).
250. *T. solitaris*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 356 (1894) (Madagascar).
251. *T. somala*, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 25, p. 349 (1895) (Garrâ Mare).
252. *T. splendidula*, Reitter, Wien. Ent. Zeit. p. 146 (1890) (Ordubad).
253. *T. subviolacea*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 222 (1892) (Inde).
254. *T. timida*, Fahreus, Ins. Caffr. Vol. 1, p. 368 (1851) (Gariep).
255. *T. undulata*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 245 (1864) (Célèbes).
256. *T. varia*, H. Deyrolle, idem, p. 244 (Bornéo).
257. *T. variolaris*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 521 (1873) (Japon).
258. *T. ventricosa*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 242 (1864) (Bornéo).
259. *T. vexator*, Kerremans, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, p. 830 (1892) (Birmanie).
260. *T. vilis*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 265 (1864) (Bornéo).
261. *T. x-argentea*, Motschulsky, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 114 (1851) (Ceylan).
262. *T. zebrina*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 253 (1864) (Mysole).

7. GENUS PARATRACHYS, SAUNDERS

Paratrachys. Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 523 (1873).

Caractères. — Tête convexe; front aplani, à peine sillonné au milieu; épistome large, continu avec le front, largement et peu profondément échancré en arc en avant; cavités antennaires petites, médiocres, espacées, subterminales et situées contre le bord inférieur des yeux. — Antennes libres à l'extrémité, courtes et grêles, dentées à partir du 6^e article; le 1^{er} plus long et aussi épais que 2; 3 à 5 subcylindriques, subégaux et grêles; les suivants obtusément dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, ovalaires et parallèles. — Pronotum transversal, convexe; la marge antérieure faiblement bisinuée; les côtés obliquement arqués; la base tronquée. — Ecusson petit, en triangle allongé. — Elytres triangulaires, convexes, tronqués à la base, le calus huméral nul, le sommet conjointement arrondi, subacuminé. — Prosternum sans mentonnière; sa marge antérieure faiblement échancrée en arc; le sommet largement tronqué. — Branches latérales du mésosternum invisibles. — Mésternum largement tronqué en avant et entièrement juxtaposé contre le prosternum. — Hanches postérieures à peine dilatées en arrière au côté interne, l'externe coupé obliquement par les épipleures mésternales. — Pattes peu robustes; fémurs peu renflés et droits, insérés dans des dépressions du corps; tibias courts, subcylindriques; tarses fortement lamellés, les lamelles rousses. — Corps régulièrement et nettement ovoïde.

Distribution géographique des espèces. — On ne connaît que cinq espèces de ce genre, que M. E. Saunders avait fondé pour une espèce du Japon, tout signalant une seconde espèce, non décrite, de l'Inde. Il est probable que plusieurs *Trachys* de l'Inde ou de la Malaisie viendront se ranger dans cette coupe générique, puisque parmi ceux que j'ai revus, j'en ai trouvé quatre qui sont incontestablement des *Paratrachys*, un du Tonkin, un de Konbir (Bengale) un de Sumatra et un enfin de l'île Fergusson.

1. **P. hypocrita*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. 8, p. 349 (1888) (Tonkin).
2. **P. nigricans*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 209 (1890) (Bengale).
3. **P. fergussonica*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 87 (1900) (Ile Fergusson).
4. **P. pilifrons*, Kerremans, idem, p. 51 (Sumatra).

5. *P. hederæ*, Saunders, Journ. Linn. Soc. Lond. Vol. 11, p. 523 (1873) (Japon).

8. GENUS STENIANTHE, FAIRMAIRE

Stenianthe. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. 6, p. 38 (1886).

Caractères. — Tête convexe; front uni; épistome très court et très large, séparé du front par un sillon, largement et peu profondément échancré en arc en avant; cavités antennaires petites, espacées, subtriangulaires et situées contre le bord inférieur de l'œil. — Antennes libres, grêles et peu allongées, dentées à partir du 5^e article; le 1^{er} allongé, obconique, renflé au bout; 2 et 3 courts, égaux entre eux, globulaires; 4 plus grêle, un peu plus allongé; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, elliptiques et parallèles. — Pronotum uni et convexe; sa marge antérieure et la postérieure tronquées; l'angle inférieur non abaissé sur les élytres. — Ecusson très petit, en triangle équilatéral. — Elytres convexes, finement rebordés, tronqués à la base, atténués au sommet, couverts de stries légèrement cintrées en dedans vers la suture. — Marge antérieure du prosternum tronquée ou faiblement échancrée, sans mentonnière; prosternum très large, finement rebordé et sillonné de chaque côté, le sommet largement tronqué, subsinueux. — Branches latérales du mésosternum invisibles. — Métasternum largement tronqué en avant et entièrement juxtaposé contre le prosternum. — Hanches postérieures très légèrement dilatées en avant et en arrière au côté externe. — Pattes libres, peu rétractiles; fémurs assez épais et renflés; tibias cylindriques, les antérieurs faiblement arqués et un peu dilatés au sommet, les intermédiaires et les postérieurs droits; tarses assez élargis, le 1^{er} article un peu plus long que les suivants; crochets dentés à la base. — Corps oblong ovale, très convexe en dessus.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre est exclusif à Madagascar où il semble représenter les *Janthé* de l'Inde et de l'Afrique. On n'en connaît que trois espèces.

1. **S. janthina*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. 6, p. 38 (1886) (Madagascar).
-
2. *S. crassula*, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, p. 166 (1901) (Madagascar)
 3. *S. metallina*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 243 (1900) (Madagascar).

55. GENUS PSEUDIANTHE, FAIRMAIRE

Pseudianthe. Fairmaire, Rev. Ent. Caen, p. 167 (1901).

Caractères. — « Ce genre, voisin des *Stenianthe*, en diffère au premier abord par son corps » parallèle, également arrondi aux deux extrémités, ses yeux assez grands, plus dégagés du corselet, » son front fortement sillonné, son corselet s'arrondissant assez fortement et en avant seulement, ayant » le bord postérieur droit, ne touchant pas tout à fait la base des élytres, laissant à découvert une étroite

» bande du mésothorax très lisse et brillante comme l'écusson, les angles postérieurs étant droits, ses
 » élytres parallèles, arrondies à l'extrémité avec les épaules en angle droit, presque tuberculées en
 » dessus; le prosternum est largement et faiblement sinué en avant, peu large entre les hanches et
 » bistrifié, le mésosternum indistinct, le métasternum saillant en angles obtus, les deux premiers segments
 » de l'abdomen sont soudés et la saillie intercoxale est triangulaire, obtuse. — La coloration de cet
 » insecte est sombre et contraste avec celle des *Stenianthe*. »

D'après ces caractères, je serais tenté de placer cette coupe générique parmi les *Mastogenini*, si le créateur du genre ne le disait voisin des *Fanthe*.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre, qui me paraît suffisamment distinct de ses congénères, ne comprend que deux espèces qui me sont inconnues et qui proviennent de Madagascar.

1. *P. tenebrosa*, Fairmaire, Rev. Ent. Caen, p. 167 (1901) (Madagascar).
2. *P. semistrigosa*, Fairmaire, Bull. Soc. Ent. Fr. p. 80 (1902) (Madagascar).

10. GENUS SPONSORINUS, FAIRMAIRE

Sponsorinus. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 241 (1900).

Caractères. — « Ce nouveau genre est voisin des *Trachys* dont il diffère par le corps plus court,
 » plus massif, plus convexe, le corselet à bord postérieur presque droit, les angles postérieurs embrassant
 » presque la base des élytres et les pattes comprimées, rétractiles, les tibias reçus dans un sillon des
 » fémurs. Le prosternum forme une saillie qui est reçue dans une échancrure assez forte du métaster-
 » num, la saillie intercoxale est assez large et un peu obtuse, les antennes sont cachées dans une rainure
 » prosternale comme chez les *Brachys* américains et insérées dans une fossette sous les yeux. Le corps
 » est lisse ou ponctué mais sans impressions ni maculatures pubescentes et rappellerait plutôt les
 » *Sponsor*, mais la structure du prosternum, bien qu'il soit aussi largement sinué en avant, avec la dispa-
 » rition du mésosternum et l'échancrure du métasternum ainsi que la forme des pattes le rapproche du
 » *G. Fanthe*, seulement, dans ce dernier genre, le corps est oblong, peu convexe, atténué en arrière, le
 » antennes sont libres et le prosternum est tronqué. »

Je reproduis textuellement la description de M. Fairmaire, ne connaissant pas les deux espèces sur lesquelles il a fondé ce genre. Je n'ai plus sous les yeux le *Sponsor fulgens* Fairmaire, de l'Ile Maurice, que l'auteur y introduit avec, probablement, d'autres *Sponsor*. Mais je ne suis pas tout à fait de l'avis de M. Fairmaire quand il différencie son nouveau genre d'avec les *Fanthe*, parce que ceux-ci n'auraient pas de coulisse antennaire. Ce sillon existe chez toutes les espèces de ce dernier genre qu'il m'a été permis d'examiner.

Distribution géographique des espèces. — Les deux espèces actuellement connues de ce genre proviennent de Madagascar.

1. *S. Perrieri*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 34, p. 242 (1900) (Madagascar).
2. *S. latus*, Fairmaire, idem (Madagascar).

11. GENUS JANTHE, MARSEUL

Galbella || Westwood, Cab. Orient. Ent. p. 83 (1848).

Janthe. Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 502 (1865).

Oncomaea. Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. (3), Vol. 5, p. 320 (1866).

Caractères. — Tête médiocre, peu convexe; front faiblement sillonné ou impressionné; épistome court, large, continu avec le front, largement et peu profondément échancré en arc en avant;

cavités antennaires situées à une certaine distance des yeux, médiocrement rapprochées, irrégulières et subterminales. — Antennes peu robustes, insérées au repos dans un profond sillon linéaire situé sous le bord extérieur latéral du pronotum; article 1^{er} obconique, épais et allongé; 2 court et épais; 3 à 5 grèles, subcylindriques; les suivants obtusément dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux elliptiques, médiocres, peu saillants, obliques et plus rapprochés en arrière, sur le vertex, qu'en avant. — Pronotum court, large, convexe; sa marge antérieure échancrée en arc profond; sa base bisinuée avec le lobe médian étroitement échancré au dessus de l'écusson et les angles postérieurs aigus, abaissés et enveloppant la base des élytres. — Ecusson très petit, en triangle plus long que large. — Elytres ovalaires, convexes, largement lobés à la base, le calus huméral épais et saillant. — Marge antérieure du prosternum faiblement échancrée ou tronquée; prosternum bombé, son sommet largement arrondi. — Branches latérales du mésosternum à peine visibles. — Mésternum échancré en avant et entièrement juxtaposé au prosternum. — Hanches postérieures dilatées en arrière au côté interne et à l'externe, leur marge antérieure droite, la postérieure arquée en dedans. — Pattes assez larges, contractiles, adaptées dans des dépressions ou cavités au point que le dessous paraît formé par un seul plan uniformément convexe, lorsque les pattes sont repliées comme chez les *Pachyschelus*, qui suivent; fémurs robustes, à bord interne tranchant et creusé pour l'insertion des tibias; ceux-ci aplanis, leur bord externe un peu dilaté et tranchant, creusés en dessous d'une fossette destinée à loger les tarsi; ceux-ci courts, à articles bilobés, lamellés de jaune; crochets dentés à la base. — Corps ovale, oblong, convexe, glabre et brillant.

Distribution géographique des espèces. — On connaît actuellement onze espèces de ce genre, dont 2 spéciales à l'île de Chypre; 5 se trouvent en Afrique, 1 à Madagascar et 3 aux Indes Orientales.

1. *ℳ. felix*, Marseul, L'Abeille, Vol. 2, p. 504 (1865) (Chypre).
 2. *ℳ. violacea*, Westwood, Cab. Orient. Ent. p. 83, pl. 41, f. 1a-b (1848) (Bengale).
 3. *ℳ. cœrulea*, Saunders, Trans. Ent. Soc. Lond. (3), Vol. 5, p. 321 (1866) (Pachbon, Bengale).
 4. **ℳ. globosa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 36, p. 226 (1892) (Bengale).
 5. **ℳ. abyssinica*, Kerremans, idem, Vol. 43, p. 298 (1894) (Abyssinie).
 6. **ℳ. zanzibarica*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. Vol. 28, p. 145 (1883) (Somalis).
 7. **ℳ. levis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 308 (1896) (Zanzibar).
 8. **ℳ. cuneiformis*, Kerremans, idem, Vol. 42, p. 329 (1898) (Zanzibar).
-
9. *ℳ. Beccarii*, Gestro, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova, Vol. 3, p. 47 (1872) (Bogos).
 10. *ℳ. felicissima*, Abeille, Rev. Ent. Caen, p. 36 (1897) (Chypre).
 11. *ℳ. hova*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 354 (1894) (Madagascar).

13. GENUS PACHYSCHELUS, SOLIER

Pachyschelus. Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 313 (1833); H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 219 (1864).

Metonius. Say, Trans. Amer. Philos. Soc. Vol. 6, p. 264 (1836)

Caractères. — Tête assez large, convexe, insérée dans une échancrure du pronotum; front plus ou moins sillonné; épistome rétréci par les cavités antennaires, plus ou moins échancré en avant; cavités antennaires très grandes, presque contiguës, irrégulières et situées contre le bord interne des yeux. — Antennes courtes, insérées au repos dans un sillon net, linéaire et profond, prolongé sur l'épisternum prothoracique; article 1 épais, obconique; 2 un peu moins épais, globulaire; 3 et 4 plus minces, subcylindriques et subégaux entre eux; les suivants à peine dentés au côté interne, subtriangulaires et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, latéraux, elliptiques et parallèles. — Pronotum presque trois fois aussi large que long, bombé; sa marge antérieure largement et profon-

dément échancrée en arc; les côtés obliques et plus ou moins arqués; la base très sinueuse avec un large lobe médian avancé et arqué. — Ecusson très grand en triangle régulier, plus large que long. — Elytres plus ou moins convexes, arrondis à l'épaule avec un calus huméral saillant; les côtés arqués ou droits; le sommet conjointement arrondi, parfois tronqué. — Prosternum largement lobé en avant, le lobe avancé sur la bouche; le sommet coupé carrément et juxtaposé au métasternum. — Branches latérales du mésosternum invisibles. — Hanches postérieures étroites au côté interne et plus ou moins élargies en avant et en arrière à l'interne. — Pattes assez robustes, insérées au repos dans des dépressions du corps au point que le dessous ne forme qu'un seul plan plus ou moins convexe; fémurs peu renflés, presque droits, creusés sur leur bord interne; tibias larges, arqués et tranchants en dehors; tarses courts; crochets dentés. — Corps très variable, hémisphérique ou elliptique, ovalaire ou heptagonal, souvent convexe.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre, d'abord considéré comme exclusif à l'Amérique, a été ensuite découvert en Malaisie. Une espèce, récemment trouvée à Madagascar, rattache une fois de plus cette île à celles de l'Asie Méridionale.

1. **P. semilunaris*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 346 (1900) (Surinam).
2. **P. capitatus*, nov. sp. (1) (Goyaz).
3. **P. speculum*, Klug, Ent. Braz. Vol. 2, p. 430 (1827) (Brésil).
4. **P. circularis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 354 (1899) (Goyaz).
5. **P. Bruchi*, nov. sp. (2) (Brésil).
6. **P. circumdatus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 126 (1897) (Rio).
7. **P. circumscriptus*, nov. sp. (3) (Brésil).
8. *P. pauperulus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 81 (1879) (Brésil).
9. **P. auricollis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 315 (1896) (Brésil).
10. **P. coelestis*, Kerremans, idem, p. 316 (Brésil).
11. *P. undularius*, Burmeister, Stett. Ent. Zeit. Vol. 33, p. 7 (1873) (Buenos-Ayres).
12. **P. humeralis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 315 (1896) (Brésil).
13. **P. nodifer*, Kerremans, idem, p. 316 (Brésil).
14. **P. basalis*, Kerremans, ibidem, p. 320 (Brésil).
15. **P. coeruleipennis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 127 (1897) (Minas-Geraes).
16. **P. flexuosus*, Kerremans, idem, p. 128 (Goyaz).
17. **P. novus*, Kerremans, ibidem, p. 128 (Goyaz).
18. **P. olivaceus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 318 (1896) (Chili).
19. **P. transversus*, Kerremans, idem, p. 320 (Brésil).
20. **P. pulverulentus*, Kerremans, ibidem, p. 317 (Brésil).
21. **P. ineditus*, Kerremans, ibidem, p. 317 (Brésil).
22. **P. albopictus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 421 (1894) (Mexique).
23. **P. congener*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 354 (1899) (Goyaz).
24. **P. modicus*, Kerremans, idem, 355 (Goyaz).
25. *P. expansus*, Kerremans, ibidem, Vol. 40, p. 319 (1896) (Brésil).
26. **P. subundulatus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 318 (1896) (Brésil).
27. *P. trifasciatus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 82 (1879) (Brésil).
28. **P. debilis*, nov. sp. (1) (Brésil).

(1) Long. 3,3; larg. 1,8 mm. — Ovalaire, élargi au tiers postérieur, atténué en arrière, noir en dessus, recouvert d'une villosité grise sauf sur l'écusson, le long de la suture et sur un espace arrondi, transversal, commun aux deux élytres et situé après le milieu. Dessous pourpre violacé obscur et brillant. — Tête très large, faiblement excavée en avant et finement sillonnée en arrière; pronotum largement et peu profondément échancré en avant, ses côtés un peu obliques et à peine arqués. Elytres obliquement dilatés de l'épaule jusqu'à avant le milieu, ensuite brusquement atténués jusqu'au sommet. Faciès du *P. speculum* Klug, mais plus petit. — Goyaz. (H. Donckier).

(2) Long. 2,3 larg. 1,8 mm. — Large, convexe, écourté, orbiculaire; tête et côtés du pronotum dorés et brillant, pronotum bronzé obscur très brillant; élytres noirs, couverts d'une villosité grise, peu dense et laissant, autour de l'écusson, un vaste espace semicirculaire, presque glabre, cet espace limité par une ligne villose un peu plus nette. Dessous noir brillant. — Tête étroite, assez convexe, à peine sillonnée; pronotum largement échancré en avant, les côtés très obliquement et faiblement arqués; élytres très convexes sur le disque, déprimés le long du bord avec celui-ci tranchant jusque vers le milieu, le sommet largement et conjointement arrondi. — Brésil. (Ch. Bruch).

(3) Long. 2; larg. 1,3 mm. — Ovalaire, atténué en arrière, les côtés antérieurs des élytres droits, tête et côtés du pronotum vert-clair, le milieu de celui-ci, les élytres et le dessous noirs. Voisin des *P. collaris*, Castelnau et Gory, et *dubius* Waterhouse, mais le faciès moins arrondi, plus anguleux, le sommet plus acuminé, les angles postérieurs du pronotum dépassant les bords des élytres et arrondis au sommet. — Brésil (Ch. Bruch).

29. **P. truncatus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 319 (1896) (Brésil).
30. **P. pictus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 163 (1896) (Brésil).
31. **P. obscurellus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 318 (1886) (Brésil).
32. **P. proximus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 129 (1897) (Goyaz).
33. **P. simplex*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 320 (1896) (Brésil).
34. *P. purpureus*, Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 6, p. 164 (1836) (Amérique du Nord).
americanus, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 346, pl. 58 f. 343 (1841).
35. *P. sticticus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 153, pl. 8, f. 23 (1889) (Guatemala).
36. **P. bicolor*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 420 (1894) (Mexique).
37. **P. alatus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 356 (1899) (Pérou).
38. **P. inca*, Kerremans, idem, p. 355 (Pérou).
39. **P. carmineus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 420 (1894) (Mexique).
40. **P. astræus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 147 (1889) (Mexique).
41. *P. fulgidipennis*, Lucas, Voy. Casteln. p. 67, pl. 4, f. 7 (1858) (Goyaz).
42. *P. thoracicus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 139 (1889) (Guatemala).
43. **P. aeneicollis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 358 (1899) (Pérou).
44. *P. compactus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 138, pl. 7, f. 15 (1889) (Panama).
45. *P. ardens*, Waterhouse, idem, p. 144, pl. 8, f. 1 (Mexique).
46. *P. secendens*, Waterhouse, idem, p. 145, pl. 8, f. 2 (Guatemala).
47. **P. rotundatus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 357 (1889) (Pérou).
48. **P. hexagonalis**, nov. sp. (2) (Brésil).
49. **P. communis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 141, pl. 8, f. 3 (1889) (Panama).
50. **P. planus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 359 (1899) (Brésil).
51. *P. collaris*, Castelnau & Gory, Monog. Bupr. Vol. 2, *Brachys*, p. 7, pl. 2, f. 10 (1839) (Colombie).
52. ***P. planatus**, nov. sp. (3) (Brésil).
53. *P. dubius*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 143, pl. 7, f. 16 (1889) (Guatemala).
54. *P. viridicollis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 343, pl. 58, f. 339 (1841) (Cayenne).
55. ***P. abnitidus**, nov. sp. (4) (Brésil).
56. **P. confinis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 356 (1899) (Goyaz).
57. **P. cordiformis*, Kerremans, idem, Vol. 40, p. 321 (1896) (Brésil).
58. ***P. reflexus**, nov. sp. (5) (Brésil).
59. *P. marginicollis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 348, pl. 59, f. 346 (1841) (Brésil).
60. **P. occidentalis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 359 (1899) (Pérou).
61. **P. peruvianus*, Kerremans, idem, p. 357 (Pérou).
62. **P. gemellus*, Kerremans, idem, p. 358 (Pérou).
63. *P. terminans*, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 219 (1801) (Amérique du Sud).
cyanæus, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 344, pl. 58, f. 340 (1841).
aerosus, Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 2, p. 148 (1846).
64. *P. coeruleus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 342, pl. 58, f. 338 (1841) (Guyanes).

(1) Long. 2,5; larg. 1,5 mm. — Très différent des précédents par sa forme nettement ovalaire, non anguleuse; tête et pronotum vert obscur et mat; écusson noir brillant; élytres noir bleuâtre, peu brillants. Dessous noir brillant. — Tête étroite et convexe; pronotum très finement granuleux, sa base presque tronquée, à peine onduleuse; élytres moins impressionnés sur les côtés, formant avec le pronotum, une courbe régulière, depuis le bord antérieur de celui-ci jusqu'à leur sommet. — Brésil (Ch. Bruch).

(2) Long. 2,3; larg. 1,6 mm. — Ovalaire, élargi au tiers antérieur, bleu foncé brillant en dessus avec un reflet violacé pourpré sur les élytres. Dessous noir. — Tête assez convexe, non sillonnée; pronotum faiblement échancré en avant, obliquement arqué sur les côtés, la base sinuée, le lobe médian peu abaissé et largement tronqué; élytres faiblement déprimés sur les côtés antérieurs et très déclives au sommet; celui-ci assez largement et conjointement arrondi. Dessous d'un noir profond, très brillant. — Brésil (Ch. Bruch).

(3) Long. 3,3; larg. 1,9 mm. — Très voisin du *P. Bruchi* Kerremans, qui précède, mais moins orbiculaire et un peu moins convexe, plus atténué en arrière, l'espace dénudé des élytres plus allongé, la villosité semblable, mais plus dense et plus épaisse. Entièrement noir, la tête légèrement bossée. — Tête étroite, faiblement sillonnée; pronotum largement et profondément échancré en arc en avant, ses côtés obliquement arqués, le lobe médian de la base tronqué au dessus de l'écusson; élytres à villosité formant deux demi ellipses concentriques, le sommet moins élargi. — Brésil (Ch. Bruch).

(4) Long. 2,3; larg. 1,3 mill. — Ovalaire, assez convexe, atténué en arrière, entièrement noir brillant, la partie antérieure du front bronzé clair, les élytres ornés de deux bandes vagues sinuées et villueuses, gris blanchâtre. — Tête convexe, non sillonnée; pronotum largement et profondément échancré en avant, les côtés obliquement et faiblement arqués, le lobe médian de la base tronqué; élytres droits sur les côtés antérieurs, obliquement atténués un peu avant le milieu, le sommet déclive et conjointement acuminé, les côtés aplatis en avant. — Brésil (Ch. Bruch).

(5) Long. 3; larg. 2 mm. — Large, hexagonal, convexe, arrondi en avant et acuminé en arrière; partie antérieure du front et côtés du pronotum vert obscur terne; tête et pronotum noirs; élytres noir violacé brillant. Dessous noir. — Tête étroite et convexe, à peine sillonnée; pronotum avec quelques vagues impressions obliques, linéaires et inégales sur les côtés, ceux-ci très obliques et peu arqués, la base tronquée au milieu; élytres très larges, convexes sur le disque, impressionnés et déprimés sur les côtés, ceux-ci plus larges un peu avant le milieu, ensuite brusquement atténués en ligne droite. — Brésil (Ch. Bruch).

65. *P. viridanus*, Thomson, Typ. Bupr. p. 93 (1878) (Brésil).
 66. *P. constans*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 137 (1889) (Panama).
 67. *P. ovalis*, Waterhouse, idem, p. 140 (1889) (Amérique centrale).
 68. **P. famulus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 359 (1899) (Goyaz).
 69. *P. corruscus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 344, pl. 58, f. 341 (1841) (Brésil, Guyanes).
* *cupreus* || Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. 1897, p. 130.
 70. **P. levis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 163 (Brésil).
 71. ****P. vicinus***, nov. sp. (1) (Brésil).
 72. *P. pulicarius*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 350, pl. 59, f. 349 (1841) (Brésil, Guyanes).
 73. ****P. nitidus***, nov. sp. (2) (Brésil).
 74. *P. hydrophoroides*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 140 (1889) (Amérique centrale).
 75. **P. gratus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 356 (1899) (Goyaz).
 76. *P. dilatatus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 347, pl. 59, f. 345 (1841) (Brésil).
 77. **P. solitarius*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 421 (1894) (Mexique).
 78. **P. politus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 322 (1896) (Amérique du Nord).
 79. *P. ovatus*, Say, Ann. Lyc. New-York, Vol. 1, p. 252 (1825) (Etats-Unis).
lacriginatus, Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 6, p. 164 (1836).
punctatus, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 347, pl. 59, f. 344 (1841).
 80. **P. acutus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 164 (1896) (Brésil).
 81. **P. atratus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 322 (1896) (Brésil).
 82. ****P. nigerrimus***, nov. sp. (3) (Brésil).
 83. **P. chrysocephalus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 322 (1896) (Vénézuéla).
 84. **P. aeneus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 147 (1896) (Sumatra).
 85. **P. scintillans*, Kerremans, idem, p. 147 (Sumatra).
 86. **P. Weyersi*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 7, p. 60 (1900) (Sumatra).
 87. *P. Migneauxi*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 368, pl. 3, f. 10 (1864) (Singap., Sumatra).
 88. **P. Dohrni*, Kerremans, idem, Vol. 44, p. 346 (1900) (Sumatra).
 89. **P. hovanus*, Fairmaire, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 71, p. 351 (1902) (Madagascar).
-
90. *P. affinis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 143, pl. 8, f. 7 (1889) (Panama).
 91. *P. aversus*, Waterhouse, idem, p. 146, pl. 8, f. 13 (Mexique).
 92. *P. azureus*, Waterhouse, ibidem, p. 152, pl. 5, f. 21 (Guatemala).
 93. *P. bifasciatus*, Waterhouse, ibidem, p. 151, pl. 8, f. 19 (Guatemala).
 94. *P. biguttatus*, Waterhouse, ibidem, p. 153, pl. 8, f. 22 (Panama).
 95. *P. biimpressus*, Motschulsky, Etud. Ent. p. 54 (1859) (Amérique du Nord).
 96. *P. centralis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 148 (1889) (Guatemala).
 97. *P. cinctus*, Waterhouse, idem, p. 149, pl. 8, f. 15 (Amérique centrale).
 98. *P. clarus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 130 (1897) (Rio).
 99. *P. consobrinus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 81 (1879) (Brésil).
 100. *P. curtulus*, Boheman, Eug. Res. Zool. Vol. 2, p. 65 (1858) (Rio Janeiro).
 101. *P. cyanellus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Brachys*, p. 8, pl. 2, f. 12 (1839) (Colombie).
 102. *P. deplanatus*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 104 (1837) (Amérique centrale et méridionale).
 103. *P. discoidalis*, Waterhouse, Biol. Centr.-Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 145, pl. 8, f. 11 (1889) (Panama).
 104. *P. diversus*, Waterhouse, idem, p. 143, pl. 7, f. 16 (Guatemala).
 105. *P. elegans*, Waterhouse, ibidem, p. 152, pl. 8, f. 20 (Panama).

(1) Long. 2,3; larg. 1,3 mm. — *Voisin du P. pulicarius* Gory, mais la tête moins large; tête verdâtre en avant et noir violacé très brillant, comme le pronotum, en arrière; écusson noir; élytres noir bleuté. — Dessous noir brillant. — Tête et pronotum presque lisses, la première étroite convexe et faiblement sillonnée; élytres faiblement déprimés sur les côtés, ceux-ci formant avec le pronotum une seule courbe régulière jusqu'au sommet. — Brésil (Ch. Bruch).

(2) Long. 2,2; larg. 1,3 mm. — *Ovalaire, subacuminé en arrière, voisin des deux précédents, mais le sommet des élytres moins arrondi. Partie antérieure du front verte; tête, pronotum et écusson noir brillant ainsi que le dessous; élytres noir violacé.* — Tête convexe, à peine sillonnée; pronotum avec deux petits sillons transversaux le long de la marge antérieure et quatre vagues fossettes, situées sur une même ligne transverse un peu après le milieu et visibles seulement sous un certain angle. Elytres avec l'impression marginale peu prononcée, leurs côtés formant une courbe régulière avec le pronotum, leur sommet subacuminé et déclive. — Brésil (Ch. Bruch).

(3) Long. 2; larg. 1,3 mm. — *Ovalaire, élargi vers le milieu, subacuminé en arrière, convexe, entièrement noir, très brillant en dessus, la partie antérieure du front d'un bronze verdâtre clair.* — Plus ovalaire, plus large et plus convexe que le *P. atratus*, Kerremans, qui précède, la tête assez large, un peu convexe; le pronotum lisse et très brillant; les élytres formant un ovale régulier, subacuminé au sommet, avec la tête et le pronotum la dépression marginale allongée mais peu accentuée, le sommet déclive. — Brésil (Ch. Bruch).

106. *P. ephippius*, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 218 (1801) (Amérique du Sud).
 107. *P. Erichsoni*, Saunders, Cat. Bupr. p. 135, n° 36 (1871) (Pérou).
lucidulus || Erichson, Wieg. Arch. Naturg. Vol. 1, p. 75 (1847).
 108. *P. exiguus*, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 220 (1801) (Guyanes).
acuminatus, Sturm, Cat. p. 203 (1826).
 109. *P. familiaris*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1 p. 141, pl. 7, f. 9 (1889) (Mexique).
 110. *P. fasciatus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 333, pl. 56, f. 327 (1841) (Bogota).
 111. *P. fastigiatus*, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 219 (1801) (Amérique du Sud).
 112. *P. foliaceus*, Motschulsky, Etud. Ent. p. 53 (1859) (Para).
 113. *P. fulgens*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 141, pl. 7, f. 17 (1889) (Guatémala).
 114. *P. granuloscollis*, Waterhouse, idem, p. 146, pl. 7, f. 20 (Guatémala).
 115. *P. incertus*, Waterhouse, ibidem, p. 142, pl. 7, f. 4 (Panama).
 116. *P. indigaceus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 127 (1897) (Minas Geraes).
 117. *P. irroratus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 149, pl. 7, f. 23 (1889) (Mexique).
 118. *P. Jousselini*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 345, pl. 58, f. 342 (1841) (Colombie).
 119. *P. laevis*, Gory, idem, p. 349, pl. 59, f. 347 (Brésil).
 120. *P. laticeps*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 149, pl. 8, f. 16 (1889) (Panama).
 121. *P. lucidulus*, Fabricius, Ent. Syst. Vol. 1, p. 191 (1794) (Surinam).
 122. *P. luctuosus*, Lucas, Voy. Casteln. p. 68 (1858) (Minas Geraes).
 123. *P. lunifer*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 148, pl. 7, f. 22 (1889) (Guatémala).
 124. *P. maculatus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Brachys*, p. 8, pl. 2, f. 11 (1839) (Brésil).
 125. *P. melas*, H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 269 (1864) (Makian).
 126. *P. metallicus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 349, pl. 59, f. 548 (1841) (Brésil).
 127. *P. minimus*, Lucas, Voy. Castelnau, p. 69 (1858) (Minas Geraes).
 128. *P. modestus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 147, pl. 8, f. 14 (1889) (Panama).
 129. *P. nigricollis*, Waterhouse, idem, p. 148, pl. 7, f. 21 (Mexique).
 130. *P. oblongus*, Motschulsky, Etud. Ent. p. 54 (1859) (Guyanes).
 131. *P. octodentatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 142, pl. 1, f. 5 (1889) (Panama).
 132. *P. ornatus*, Lucas, Voy. Castelnau, p. 68 (1859) (Minas Geraes).
 133. *P. pubicollis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 153, pl. 8, f. 24 (1889) (Amér. centr.).
 134. *P. pulchellus*, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 220 (1801) (Amérique du Sud).
 135. *P. purpuripennis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 144, pl. 8, f. 8 (1889) (Mexique).
 136. *P. pusillus*, Fabricius, Ent. Syst. Suppl. p. 137 (1798) (Tranquebar).
 137. *P. pygmaeus*, De Geer, Mém. Ins. Vol. 4, p. 137 (1784) (Surinam).
nanus, Gmelin, Syst. Nat. Vol. 1, p. 1940 (1788).
pedicularis, Olivier, Ent. Méth. Vol. 2, p. 241 (1790).
parvus, Schoenherr, Syn. Ins. Vol. 1, p. 237 (1817).
 138. *P. repentinus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 82 (1879) (Brésil).
 139. *P. robustus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 142, pl. 7, f. 10 (1889) (Guatémala).
 140. *P. Schwartzi*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. Vol. 1, p. 298 (1892) (Floride).
coeruleus || Schwartz, Proc. Amer. Philos. Soc. Vol. 17, p. 364 (1878).
 141. *P. signatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 150, pl. 8, f. 17 (1889) (Guatémala).
 142. *P. splendens*, Motschulsky, Etud. Ent. p. 52 (1859) (Amérique du Sud).
 143. *P. subcyaneus*, Motschulsky, idem, p. 53 (Guyanes).
 144. *P. testudinarius*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 341, pl. 57, f. 337 (1841) (Cayenne).
 145. *P. trapezoidalis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 151, pl. 7, f. 24 (1889) (Mexique).
 146. *P. undulatus*, Waterhouse, idem, p. 151, pl. 8, f. 18 (Panama).
 147. *P. violaceus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Brachys*, p. 9, pl. 2, f. 13 (1839) (Colombie).

14. GENUS LIUS, H. DEYROLLE

Lius. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 219 (1864).

Caractères. — Tête étroite, plus ou moins convexe, parfois sillonnée; épistome excessivement rétréci par les cavités antennaires au point que les bords internes de celles-ci limitent un creusement étroit

constituant seul cet épistome qui est largement et peu profondément échancré en arc en avant ; cavités antennaires très grandes, ovalaires et obliques. — Antennes grêles, médiocres, insérées au repos dans un sillon linéaire net et profond qui se prolonge sur le bord latéral du pronotum à une certaine distance de celle-ci ; article 1 épais, obconique ; 2 plus court, globulaire ; 3 à 5 moins épais, subégaux entre eux, plus grêles et un peu plus allongés que 2 ; les suivants assez épais, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. Yeux médiocres, latéraux, elliptiques et parallèles. — Pronotum convexe, formant avec la tête réunie un triangle plus large que long arrondi au sommet ; la marge antérieure tronquée ; les côtés très obliques ; la base sinueuse avec un large lobe médian tronqué ou faiblement échancré dans son milieu. — Ecusson assez grand, triangulaire, un peu plus large que long, sa marge antérieure souvent cintrée pour s'adapter dans l'échancrure de la base du pronotum. — Elytres triangulaires, sinueux à la base, acuminés au sommet. — Marge antérieure du prosternum avancée sur la bouche et formant une sorte de mentonnière plus ou moins accusée et tronquée ; prosternum un peu plus large en arrière qu'en avant, le sommet formant un angle aigu. — Mésosternum à peine visible. — Métaesternum profondément échancré, l'échancrure anguleuse. — Hanches postérieures très courtes sur leur moitié interne, dilatées en avant et en arrière sur l'externe. — Pattes assez robustes, insérées en partie dans des cavités sternales ; fémurs assez épais ; tibias forts, arqués, subcylindriques, leur bord interne un peu cintré en dehors ; tarses très courts, le premier article un peu long que les suivants, ceux-ci bilobés ; crochets dentés. — Corps conique, épais, en forme de losange ayant les côtés antérieurs plus courts que les postérieurs, rarement subcylindrique, toujours plus acuminé en arrière qu'en avant.

Distribution géographique des espèces. — On connaît une soixantaine d'espèces de ce genre, répandues par toute l'Amérique du sud et plus rares dans l'Amérique centrale ; on n'en connaît qu'une seule espèce des Antilles.

1. *L. Castor*, Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. 13, p. 49 (1876) (Brésil).
2. **L. tucumanus*, Kerremans, C. r. Soc. Ent. Belg. p. 7 (1887) (Tucuman).
3. **L. violaceus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 139 (1897) (Goyaz).
4. **L. convexus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 360 (1899) (Goyaz).
5. **L. vicinus*, Kerremans, idem, p. 360 (Goyaz).
6. **L. striatus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 138 (1897) (Goyaz).
7. **L. pilosellus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 361 (1899) (Goyaz).
8. *L. Ephialtes*, Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. 13, p. 50 (1876) (Brésil).
9. **L. magnus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 139 (1897) (Goyaz).
10. *L. conicus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2 ; *Brachys*, p. 5, pl. 1, f. 6 (1839) (Brésil).
11. **L. modestus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 141 (1897) (Goyaz).
12. **L. carinatus*, nov. sp. (1) (Goyaz).
13. *L. Lafertei*, Thomson, Typ. Bupr. p. 92 (1878) (Brésil).
14. **L. clarus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 141 (1897) (Minas-Geraes).
15. **L. aeneus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 330 (1896) (Vénézuéla).
16. *L. Ares*, Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. 13, p. 49 (1876) (Amérique Centrale).
17. **L. cyanellus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 328 (1896) (Amazonie).
18. **L. holochalceus*, Kerremans, idem, p. 329 (Brésil).
19. **L. viridis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 140 (1897) (Goyaz).
20. *L. moerens*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 340, pl. 57, f. 336 (1841) (Guyanes).
21. **L. tristis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 139 (1897) (Goyaz).
22. **L. atrocyaneus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 360 (1899) (Goyaz).
23. **L. nigerrimus*, Kerremans, idem, Vol. 40, p. 329 (1896) (Brésil).
24. **L. atratus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 167 (1896) (Brésil).

(1) Long. 3 ; larg. 1,2 mm. — *Petit, cunéiforme, pourpré violacé brillant en dessus ; dessous noir.* — Tête assez forte, front bisinué avec le bord des yeux caréné ; pronotum très finement pointillé ; élytres avec des stries discales enfoncées continuées sur les côtés en stries ponctuées, les interstries discaux ponctués, les latéraux finement pointillés. De chaque point émerge un poil blanc, très court. Le calus huméral fort et limité intérieurement par une dépression basilaire. — Goyaz. (H. Donckier).

25. **L. minutus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 116 (1896) (Brésil).
26. **L. Bruchi*, nov. sp. (1) (Brésil).
27. **L. aterrimus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 349 (1900) (Goyaz).
28. **L. laticeps*, nov. sp. (2) (Goyaz).
29. *L. exiguus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Brachys*, p. 6, pl. 2, f. 8 (1839) (Cayenne).
cayennensis, Saunders, Cat. Bupr. p. 134, n° 4 (1871).
30. **L. amabilis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 329 (1896) (Amazones).
31. *L. scutellatus*, Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 314 (1833) (Brésil).
32. **L. reflexus*, nov. sp. (3) (Brésil).
33. *L. aculeatus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 337, pl. 56, f. 331 (1841) (Guyanes).
34. *L. purpureus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 79 (1879) (Brésil).
35. **L. rugosus* nov. sp. (4) (Brésil).
36. **L. strigosus*, nov. sp. (5) (Brésil).
37. **L. politus*, nov. sp. (6) (Goyaz).
38. **L. bronzeus*, nov. sp. (7) (Goyaz).
39. **L. cupreus*, nov. sp. (8) (Brésil).
40. *L. variabilis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 136 (1889) (Guatémala).
41. *L. Otus*, Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. 13, p. 50 (1876) (Nouveau-Fribourg).
42. **L. dimidiatus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 140 (1897) (Goyaz).
43. **L. aeneicollis*, Kerremans, Ann. Fr. p. 166 (1896) (Brésil).
44. **L. coeruleus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 349 (1900) (Goyaz).
45. **L. parvulus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 136 (1889) (Panama).
46. **L. timidus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 349 (1900) (Guatémala).
47. **L. breviceps*, nov. sp. (9) (Goyaz).
48. **L. carmineus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 167 (1896) (Brésil).
49. **L. elateroides*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 380 (1896) (Bahia).
50. **L. Gounellei*, nov. sp. (10) (Bahia).
51. **L. agriloides*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 168 (1896) (Brésil).
52. **L. elongatus*, Kerremans, idem, p. 168 (Brésil).
53. **L. Jakowleffi*, nov. sp. (11) (Brésil).

(1) Long. 3; larg. 1,3 mm. — *Petit cunéiforme, entièrement noir, très brillant.* — Tête étroite, sillonnée en avant seulement; pronotum assez allongé, en trapèze, les côtés obliquement atténués en ligne droite, la base fortement bisinuée avec le lobe médian large, avancé et faiblement échancré en arc; élytres couverts de séries longitudinales de points non vailleux, le sommet onduleux, vaguement relevé en bosse. — Brésil. (Ch. Bruch.)

(2) Long. 3,6; larg. 1,7. — *Subovalaire, acuminé en arrière, pourpré sombre en dessus; dessous violacé noir, très obscur.* — Tête large, excavée en avant et sillonnée en arrière; pronotum peu sinueux sur les côtés, obliquement atténué; élytres sérialelement et régulièrement ponctués, presque droits sur les côtés antérieurs, ensuite brusquement atténués en ligne droite jusqu'au sommet, impressionnés et onduleux en arrière. — Goyaz (H. Donckier).

(3) Long. 2,5; larg. 1,3. — *Plus large et plus écourté que le L. BRUCHI, Kerremans, qui précède, d'un noir violacé en dessus avec un reflet pourpré sur les élytres.* — Tête forte, large, sillonnée; pronotum avec ses côtés sinueux en avant et arqués ensuite; élytres à séries longitudinales de points très régulières, le calus huméral assez saillant. — Brésil. (Ch. Bruch.)

(4) Long. 2,8; larg. 1,3 mm. — *Subheptagonal, peu convexe, atténué en avant et acuminé en arrière, cuivreux pourpré brillant en dessus avec la partie antérieure du front cuivreux clair et un peu verdâtre. Dessous cuivreux pourpré brillant.* — Tête forte, excavée en avant et sillonnée en arrière; pronotum large et court, ses côtés sinueux en avant et arqués au milieu; élytres couverts de séries longitudinales de points et présentant en outre des sinuosités irrégulières, vaguement disposées en rides sur les côtés, le sommet conjointement acuminé. — Brésil. (Ch. Bruch.)

(5) Long. 2,7; larg. 1,2 mm. — *Voisin du précédent pour la coloration et le faciès, mais le front plus large et moins sinueux, plus obliquement atténué en ligne droite, les élytres plus rugueux, à rides transversales très irrégulières, le corps un peu plus large, relativement plus trapu, la coloration plus pourprée, le dessous un peu plus sombre que le dessus.* — Brésil. (Ch. Bruch.)

(6) Long. 2,8; larg. 1,2 mm. — *Subcunéiforme, atténué en avant et acuminé en arrière, lisse et bronzé très obscur en dessus; noir en dessous.* — Tête relativement étroite, profondément creusée et sillonnée; pronotum assez haut, très étroit en avant, ses côtés obliquement atténués en ligne droite, le lobe médian de la base échancré; élytres très finement granuleux avec des séries longitudinales de points assez épais mais peu profonds, le calus huméral bien marqué, la base faiblement impressionnée contre ce calus, le sommet conjointement acuminé et très finement dentelé. — Goyaz. (H. Donckier).

(7) Long. 2,8; larg. 1,2 mm. — *Voisin du précédent, entièrement bronzé, obscur, lisse, le front plus large et moins creusé, le pronotum plus grand, moins atténué en avant, les élytres à points plus fins et plus réguliers, à séries plus espacées, le calus huméral moins saillant.* — Goyaz (H. Donckier).

(8) Long. 3,2; larg. 1,3 mm. — *Cunéiforme, élargi à l'épaule, atténué en avant et acuminé en arrière, entièrement d'un bronzé clair et brillant.* — Tête assez large, creusée en avant et sillonnée en arrière; pronotum assez grand, les côtés obliques et un peu sinueux, la marge antérieure faiblement échancrée; élytres à séries longitudinales de points assez épais, séparées l'une de l'autre par des séries de points plus fins. — Brésil (Ch. Bruch).

(9) Long. 3,5; larg. 1,2 mm. — *Ressemble au L. CARMINEUS, Kerremans, par sa forme allongée et cylindro-conique, mais un peu plus robuste et plus trapu, d'un pourpre violacé clair en dessus; dessous noir.* — Tête étroite, allongée et sillonnée; pronotum assez allongé, convexe avec les côtés obliquement et faiblement arqués, la base fortement sinuose avec le lobe médian avancé et échancré; les élytres allongés avec des séries longitudinales de points irréguliers. — Goyaz (H. Donckier).

(10) Long. 3; larg. 0,8 mm. — *Plus étroit et plus allongé que le L. CARMINEUS, Kerremans, le front moins large et plus nettement sillonné, le pronotum relativement plus allongé et plus étroit, les élytres plus allongés et plus étroits, d'un pourpre violacé très brillant en dessus, noir en dessous.* — Bahia (E. Gounelle).

(11) Long. 3,7; larg. 1 mm. — *Allongé, subcylindrique, atténué en avant et en arrière, bronzé obscur et brillant en dessus; dessous noir.* — Tête allongée, sillonnée; pronotum convexe, relativement allongé, ses côtés obliques en avant et droits en arrière, couvert d'une ponctuation également et largement espacée; élytres allongés, couverts de séries longitudinales de points, le sommet largement et conjointement arrondi, finement dentelé. — Brésil (Jakowleff).

54. **L. Grouvellei*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 168 (1896) (Brésil).

-
55. *L. Adonis*, Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. 13, p. 49 (1876) (Santarem).
 56. *L. Bacchus*, Saunders, idem, p. 50 (Ega).
 57. *L. cupricollis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 79 (1879) (Brésil).
 58. *L. Cycnus*, Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. 13, p. 49 (1876) (Bahia).
 59. *L. dissimilis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 135, pl. 7, f. 18 (1889) (Guatémala).
 60. *L. guadelupensis*, Fleutiaux & Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6), Vol. 9, p. 404 (1889) (Antilles).
 61. *L. Hades*, Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. 13, p. 51 (1876) (Santarem).
 62. *L. Helios*, Saunders, idem, p. 50 (Ega).
 63. *L. Hercules*, Saunders, ibidem, p. 49 (Brésil).
 64. *L. ignifrons*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 80 (1879) (Brésil).
 65. *L. ignitus*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Brachys*, p. 6, pl. 2, f. 7 (1839) (Cayenne).
 66. *L. Pollux*, Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. 13, p. 48 (1876) (Parana).
 67. *L. proximus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 79 (1879) (Brésil).
 68. *L. simplex*, Thomson, idem, p. 80 (Brésil).
 69. *L. Tercus*, Saunders, Ent. Monthl. Mag. Vol. 13, p. 49 (1876) (Loc?).
 70. *L. tomentosus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 80 (1879) (Brésil).

14. GENUS BRACHYS, SOLIER

Brachys. Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 312 (1833); Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 1, pl. 1 (1839); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 86 (1857); H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 219 (1864).

Caractères. — Tête médiocre; front sillonné; épistome bisinué, subanguleux au milieu en avant, rétréci par les cavités antennaires; celles-ci grandes, obliques, arrondies en arrière et prolongées en sillon en avant. — Antennes médiocres, insérées au repos dans un sillon linéaire net et profond, formant le prolongement des cavités antennaires et longeant ensuite le dessous de la marge latérale du pronotum; article 1^{er} épais, obconique et courbe; 2 presque aussi long et aussi épais que 1; 3 et 4 plus grêles, subégaux entre eux et plus petits que 2; les suivants dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, ovalaires, subparallèles, à peine plus écartés en arrière qu'en avant. — Pronotum en trapèze, plus large que long; le disque convexe, les côtés et la base déprimés; la marge antérieure presque droite; les côtés obliques; la base fortement bisinuée avec un lobe médian avancé et tronqué. — Ecusson médiocre, triangulaire, plus large que long. — Elytres larges et courts, brusquement atténués en arrière, le calus huméral saillant et le plus souvent caréné, la carène prolongée suivant une côte longeant la marge latérale à une certaine distance de celle-ci; souvent une ou plusieurs côtes discales. — Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum largement arrondi ou subanguleux au sommet et présentant une profonde fossette allongée et médiane. — Branches latérales du mésosternum excessivement courtes et transversales. — Métasternum largement échancré en avant, subanguleux. — Hanches postérieures très courtes, un peu dilatées au côté externe. — Pattes insérées en partie au repos dans des dépressions du dessous; fémurs médiocres, faiblement renflés, les antérieurs et les médians un peu incurvés au sommet; tibias droits, grêles et cylindriques; tarses très courts; crochets dentés à la base. — Corps épais, hexagonal, atténué en avant et acuminé en arrière.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre paraît exclusivement propre à l'Amérique. Il comprend 94 espèces dont la majeure partie confinée dans la région tropicale du nouveau continent.

1. **B. nodosus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 131 (1897) (Goyaz).

2. ***B. nodifer**, nov. sp. (1) (São Paulo).
3. **B. pretiosus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 131 (1897) (Minas Geraes).
4. **B. lineiger*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 352 (1899) (Goyaz).
5. **B. Simoni*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 27 (1896) (Vénézuéla).
6. ***B. depressus**, nov. sp. (2) (Brésil).
7. **B. amazonicus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 310 (1896) (Amazonie).
8. *B. tessellatus*, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 218 (1801) (Etats-Unis d'Amérique).
laevicauda, Le Conte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. (2). Vol. 11, p. 252 (1860).
9. **B. cuprinus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 137 (1897) (Goyaz).
10. ***B. Bruchi**, nov. sp. (3) (Brésil).
11. **B. ineditus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 325 (1899) (Brésil).
12. **B. frontalis*, Kerremans, idem, p. 327 (Amazonie).
13. ***B. marmoreus**, nov. sp. (4) (Brésil).
14. **B. nigrofasciatus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 324 (1896) (Brésil).
15. **B. cyanicollis*, Kerremans, idem, p. 326 (Brésil).
16. **B. aurulans*, Kerremans, idem, p. 325 (Brésil).
17. **B. pictus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 135 (1897) (Minas Geraes).
18. **B. mirabilis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 353 (1899) (Goyaz).
19. **B. anthraenoides*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 132 (1889) (Panama).
20. **B. floricola*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 347 (1900) (Floride).
21. **B. festivus*, Kerremans, idem, Vol. 43, p. 352 (1899) (Goyaz).
22. **B. suavis*, Kerremans, ibidem, Vol. 44, p. 347 (1900) (Guatémala).
23. *B. triangularis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 78 (1879) (Brésil).
24. *B. terminans*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 3, pl. 1, f. 3 (1839) (Etats-Unis d'Amérique).
aerosus, Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. Vol. 2, p. 148 (1846).
25. **B. purpuratus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 136 (1897) (Goyaz).
26. *B. ovatus*, Weber, Obs. Ent. Vol. 1, p. 76 (1801) (Etats-Unis d'Amérique).
aurulentus, Kirby, Fauna Bor. Amer. Vol. 4, p. 162 (1837).
tessellatus, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 3, pl. 1, f. 2 (1839).
molestus, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 232, pl. 55, f. 325 (1841).
27. **B. lineatus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 133 (1897) (Goyaz).
28. **B. taciturnus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 348 (1900) (Guatémala).
29. **B. humeralis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 133 (1897) (Minas-Geraes).
30. ***B. vicinus**, nov. sp. (5) (Brésil).
31. **B. tovaricus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 27 (1896) (Vénézuéla).
32. **B. tuberculifer*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 323 (1896) (Brésil).
33. *B. pedicularius*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 337, pl. 57, f. 332 (1841) (Carthagène).
34. **B. Horni*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 324 (1896) (Kansas).

(1) Long. 4,3; larg. 2,5 mm. — Hexagonal, plan en dessus, le bout des élytres très légèrement élevé et ensuite brusquement déclive; entièrement noir, très légèrement bleuâtre en dessus, un peu bronzé en dessous, couvert sur les élytres d'une très courte villosité blanchâtre, très espacée. — Tête bilobée avec un profond sillon médian; pronotum avec une courte carène arquée de chaque côté, interrompue en avant et en arrière; élytres couverts de nodosités allongées et irrégulières entre des sillons sinueux, dont deux plus accusées vers le sommet, formant le prolongement des côtes prémarginales. — São Paulo.

(2) Long. 3,5; larg. 1,3 mm. — Subhexagonal, arrondi et atténué en arrière; front cuiré pourpré; tête et pronotum noirs à reflets violacés élytres bronzé cuivré brillant avec une large bande postmédiane noir verdâtre brillant, ornés de deux bandes villenses et blanches, l'une très sinuose, au milieu, l'autre droite, préapicale et interrompue à la suture. Dessous noir. — Tête large, creusée en avant et sillonnée en arrière; pronotum avec une courte carène arquée de chaque côté; élytres déprimés au milieu du disque, la dépression limitée extérieurement par une vague côte sinuose, subparallèle à la prémarginale. — Brésil. (C. Bruch).

(3) Long. 3,5; larg. 5 mm. — Subovalaire, arrondi en arrière, noir brillant en dessus, bronzé en dessous, la tête et le pronotum couverts d'une villosité roux doré, peu dense, les élytres ornés de trois bandes villenses sinuées et blanches limitées en arrière par une bande villense et roux doré. — Tête assez forte, faiblement sillonnée en arrière; carène latérale du pronotum épaisse et arquée; élytres avec une côte discale parallèle à la prémarginale et une côte présuturale sensible seulement vers la base. — Brésil. (C. Bruch).

(4) Long. 3; larg. 1 mm. — Subovalaire, peu convexe, atténué en arrière; front vert clair recouvert d'une villosité blanchâtre; tête et pronotum noir violacé brillant; élytres noirs avec de larges espaces granuleux et bronzés recouverts d'une villosité roux doré entremêlée de poils blancs. — Tête faiblement sillonnée; côtés du pronotum régulièrement arqués, non sinueux en avant, carène latérale droite; élytres avec, y compris la prémarginale, trois côtes linéaires bien marquées. — Brésil. (C. Bruch).

(5) Long. 3; larg. 1,3 mm. — Subhexagonal, plan en dessus, atténué en arrière, noir en dessus, bronzé en dessous, le pronotum couvert d'une villosité roux doré; les élytres de même, cette villosité rousse alternant avec une blanche, notamment vers le sommet où celle-ci forme une sorte de cercle sur chaque élytre. — Tête étroite, finement sillonnée; carène du pronotum arquée et interrompue en avant et en arrière; élytres avec une côte discale parallèle à la prémarginale, le sommet subacuminé et conjointement arrondi. — Brésil (C. Bruch).

35. **B. pulverosus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 133 (1889) (Mexique).
 36. **B. debilis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 348 (1900) (Guatémala).
 37. **B. acutus*, nov. sp. (1) (Brésil).
 38. **B. viridans*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 327 (1896) (Amazonie).
 39. **B. nigricans*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 137 (1897) (Goyaz).
 40. **B. cyaneoniger*, Kerremans, idem, p. 135 (Goyaz).
 41. **B. fasciatus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 328 (1896) (Amazonie).
 42. **B. transversus*, Kerremans, idem, Vol. 43, p. 354 (1899) (Goyaz).
 43. **B. zonalis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 138 (1897) (Goyaz).
 44. **B. rudis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 164 (1896) (Brésil).
 45. **B. carinellus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 232 (1896) (Brésil).
 46. **B. insignis*, Kerremans, idem, Vol. 43, p. 353 (1899) (Goyaz).
-
47. *B. aeneicollis*, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 360 (1873) (Pérou).
 48. *B. aequinoctialis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. p. 331, pl. 55, f. 324 (1841) (Colombie).
 49. *B. aeruginosus*, Gory, idem, p. 335, pl. 56, f. 329 (Etats-Unis d'Amérique).
 50. *B. aratus*, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 354 (1873) (Pérou).
 51. *B. austerus*, Kirsch, idem, p. 362 (Pérou).
 52. *B. bicolor*, Kirsch, ibidem, p. 357 (Pérou).
 53. *B. brevis*, Kirsch, ibidem, p. 358 (Pérou).
 54. *B. carbo*, Kirsch, ibidem, Vol. 10, p. 179 (1866) (Bogota).
 55. *B. carbonatus*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. (2), Vol. 11, p. 252 (1860) (Louisiane).
 56. *B. carinicollis*, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 352 (1873) (Pérou).
 57. *B. Chapuisi*, Dugès, La Naturelle (2), Vol. 2, p. 36, pl. 2, f. 61 (1891) (Mexique).
 58. *B. coelestis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 134 (1897) (Minas Geraes).
 59. *B. cognatus*, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 364 (1873) (Pérou).
 60. *B. compar*, Kirsch, idem, p. 365 (Pérou).
 61. *B. dimidiatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 134 (1889) (Guatémala).
 62. *B. distinctus*, Waterhouse, idem, 132 (Guatémala).
 63. *B. emarginatus*, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 357 (1873) (Pérou).
 64. *B. fasciferus*, Schwartz, Proc. Amer. Philos. Soc. Vol. 17, p. 363 (1873) (Floride).
 65. *B. floccosus*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 118 (1837) (Mexique).
 66. *B. fulvus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 134 (1897) (Rio).
 67. *B. Gounellei*, Kerremans, idem, p. 132 (Minas Geraes).
 68. *B. guttulatus*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 120 (1837) (Brésil).
 69. *B. hexagonalis*, Dugès, La Naturelle (2), Vol. 2, p. 36, pl. 2, f. 64 (1891) (Mexique).
 70. *B. ignobilis*, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 354 (1873) (Pérou).
 71. *B. inornatus*, Kirsch, idem, p. 356 (Pérou).
 72. *B. jucundus*, Kirsch, ibidem, p. 361 (Pérou).
 73. *B. latus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 134 (1889) (Panama).
 74. *B. latus*, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 363 (1873) (Pérou).
 75. *B. Lebasii*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 4, pl. 1, f. 4 (1839) (Colombie).
 76. *B. lugubris*, Le Conte, Proc. Acad. Philad. (2), Vol. 11, p. 251 (1860) (Etats-Unis d'Amérique).
 77. *B. manus*, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 366 (1873) (Pérou).
 78. *B. mutabilis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 330, pl. 55, f. 323 (1841) (Guyanes).
 79. *B. nobilis*, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 353 (1873) (Pérou).
 80. *B. obscurus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 336, pl. 46, f. 330 (1841) (Guyanes).
 81. *B. observans*, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 356 (1873) (Pérou).
 82. *B. orichalceus*, Kiesenwetter, Deut. Ent. Zeit. Vol. 23, p. 255 (1889) (Fl. Amour).

(1) Long. 3; larg. 1,3 mill. — *Ecourté, plan en-dessous, élargi à l'épaule et acuminé au sommet; broncé obscur très brillant et recouvert en dessus d'une villosité roux doré alternant avec des poils blanc argenté, disposée en vagues bandes onduleuses; cette villosité concentrée en avant dans les stries élytrales de façon à simuler des côtes linéaires.* — Tête déprimée en avant et finement sillonnée en arrière; pronotum très élargi sur les côtés en arrière et sinueux en avant; élytres sans autre côte que la prémarginale, mais à stries ponctuées assez prononcées. — Brésil (C. Bruch).

83. *B. planus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 333, pl. 56, f. 321 (1841) (Carthagène).
84. *B. planifrons*, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 364 (1873) (Pérou).
85. *B. regularis*, Thomson, Typ. Bupr. p. 92 (Brésil).
86. *B. scapulosus*, Chevrolat, Silb. Rev. Ent. Vol. 5, p. 104 (1837) (Mexique).
87. *B. simplex*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 134, pl. 7, f. 14 (1889) (Guatemala).
88. *B. tenuis*, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 351 (1873) (Pérou).
89. *B. tricinctus*, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 217 (1801) (Brésil).
90. *B. tristis*, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 355 (1873) (Pérou).
91. *B. varicolor*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, p. 5, pl. 1, f. 5 (1839) (Brésil).
91. *B. virens*, Kirsch, Berl. Ent. Zeit. Vol. 17, p. 363 (1873) (Brésil).
93. *B. viridescens*, Kirsch, idem, p. 359 (Brésil).
94. *B. viridulus*, Kirsch, ibidem, p. 362 (Brésil).

15. GENUS TAPHROCERUS, SOLIER

Taphrocerus. Solier, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 2, p. 314 (1833); H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 291 (1864).

Caractères. — Tête forte; front sillonné; épistome séparé du front par une carène transversale, largement échancré en avant; cavités antennaires médiocres. — Antennes insérées au repos dans un sillon qui se prolonge sous la marge latérale du pronotum; article 1^{er} épais, allongé et arqué; 2 plus court, épais; 3 et 4 allongés, plus longs que 2 et plus grêles; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux gros, saillants, ovales et subparallèles. — Pronotum en trapèze, le disque formant souvent des bourrelets transversaux; la marge antérieure tronquée; les côtés plus ou moins sinueux; la base fortement bisinuée avec un lobe médian plus ou moins échancré. — Ecusson triangulaire, sa base souvent cintrée dans l'échancrure du lobe pronotal. — Elytres assez allongés, costulés et sérialelement ponctués, un peu élargis au tiers postérieur et subacuminés ou tronqués au sommet. — Marge antérieure du prosternum plus ou moins rebordée, séparée du prosternum par un sillon; prosternum très étroit, rétréci par les cavités cotyloïdes antérieures, ensuite un peu dilaté, son sommet anguleux. — Branches latérales du mésosternum à peine visibles. — Métasternum anguleusement échancré en avant. — Hanches postérieures très courtes, concaves, légèrement élargies au côté interne. — Pattes libres au moins en partie, vers les coudes, assez fortes; fémurs peu renflés, arqués au sommet; tibias antérieurs et médians cylindriques et très arqués, les postérieurs moins; tarses assez longs pour le groupe; crochets dentés. — Corps allongé, hexagonal; faciès des *Brachys*, mais moins robuste, moins écorté; la tête plus forte, l'écusson relativement plus grand, les détails différents.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre, confiné en Amérique, comprend 38 espèces actuellement connues, dont 18 en Amérique du Sud, 12 dans l'Amérique centrale, 6 dans l'Amérique du Nord et 2 aux Antilles.

1. **T. agriliformis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 125 (1897) (Goyaz).
 2. **T. cupriceps*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 344 (1900) (Goyaz).
 3. **T. squamulatus*, Kerremans, idem, Vol. 40, p. 309 (1896) (Bahia).
 4. *T. psilopteroides*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 129 (1889) (Amérique Centrale).
 5. **T. texanus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 312 (1896) (Texas).
 6. *T. stygicus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 78 (1879) (Brésil).
 7. **T. cylindricollis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 312 (1896) (Philadelphie).
 8. *T. gentilis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 328, pl. 55, f. 321 (1841) (Guyanes).
 9. *T. gracilis*, Say, Ann. Lyc. New-York, Vol. 1, p. 253 (1825) (Etats-Unis d'Amérique).
- alboguttatus*, Mannerheim, Bull. Soc. Nat. Moscou, p. 120 (1837).

10. **T. minutus*, nov. sp. (1) (Brésil).
 11. **T. parallelus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 310 (1896) (Brésil).
 12. *T. volitans*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 329, pl. 55, f. 322 (1841) (Guyanes).
 13. *T. angustus*, Gory, idem, p. 338, pl. 57, f. 333 (Guyanes).
 14. *T. communis*, Waterhouse, Biol. Cent. Amer. Col. Vol. 4, pt. 1, p. 130 (1889) (Mexique).
 15. **T. alboplagiatus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 309 (1896) (Brésil).
 16. **T. depilis*, Kerremans, idem, p. 311 (Amazones).
 17. **T. pictus*, Kerremans, ibidem, p. 311 (Brésil).
 18. **T. albopictus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 165 (1896) (Brésil).
-
19. *T. agriloides*, Crotch, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 76 (1873) (Texas).
 20. *T. bifasciatus*, Kerremans, Ann. Mus. Nat. Hongrois Vol. 13, p. 379 (1900) (Amazones).
 21. *T. costatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 127 (1889) (Amérique Centrale).
 22. *T. elongatus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 327, pl. 55, f. 320 (Montevideo).
 23. *T. fasciatus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 128 (1889) (Panama).
 24. *T. guttatus*, Waterhouse, idem, p. 129 (Guatemala).
 25. *T. innubus*, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 214 (1801) (Brésil).
 26. *T. Kerremansi*, Dugès, La Naturelleza (2) Vol. 2, p. 35, pl. 2, f. 62a (1891) (Mexique).
 27. *T. laeviscollis*, Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 7, p. 587 (1867) (Cuba).
 28. *T. laevicollis*, Le Conte, Bull. U. S. Geol. Surv. Vol. 4, p. 403 (Floride).
 29. *T. Leoni*, Dugès, La Naturelleza (2) Vol. 2, p. 35, pl. 2, f. 61 (1891) (Mexique).
 30. *T. mexicanus*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 128 (1889) (Guatemala).
 31. *T. nigritulus*, Waterhouse, idem, p. 128 (Panama).
 32. *T. nugator*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 264, pl. 44, f. 258 (1841) (Guyanes).
 33. *T. puncticollis*, Schwartz, Proc. Amer. Philos. Soc. Vol. 17, p. 363 (1878) (Floride).
 34. *T. purpureipennis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 129 (1889) (Panama).
 35. *T. rusticus*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 78 (1879) (Brésil).
 36. *T. tenellus*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 334, pl. 56, f. 328 (1841) (Orénoque).
 37. *T. timidus*, Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 7, p. 587 (1867) (Cuba).
 38. *T. uniformis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 130 (1889) (Mexique).

16. GENUS LEIOPLEURA, H. DEYROLLE

Leiopleura. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 219 (1864).

Caractères. — Tête étroite, déclive en avant, médiocrement convexe en arrière; front sillonné; épistome très étroit, linéaire entre les cavités antennaires, largement échancré en avant; cavités antennaires grandes, presque contiguës. — Antennes courtes et grêles, insérées au repos dans un sillon net et profond prolongé obliquement le long de la marge du pronotum et à une certaine distance en dessous de celle-ci; article 1^{er} assez épais, allongé; 2 plus court, tout aussi épais; 3 à 5 allongés, grêles et subégaux entre eux; les suivants dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, subovales et parallèles. — Pronotum plus large que long et plus étroit en avant qu'en arrière; le disque convexe; les côtés déprimés, sinueux ou arqués, la base souvent déprimée, fortement bisinuée avec un lobe médian avancé et tronqué. — Ecusson assez grand, en triangle régulier, un peu plus large que long. — Elytres très convexes, souvent déprimés sur les côtés à hauteur des hanches postérieures; obliquement atténués du tiers postérieur au sommet, celui-ci conjointement ou séparément arrondi. — Marge antérieure du prosternum avancée en mentonnière; prosternum largement tronqué

(1) Long. 3; larg. 0,7 mm. — Petit, étroit, allongé, atténué en arrière, entièrement noir, très brillant avec une bande transversale de poils blancs au quart supérieur, cette bande interrompue à la suture et sur les côtés. — Tête forte, faiblement sillonnée; pronotum court, en trapèze, transversalement bombé sur le disque, la base déprimée, la marge antérieure limitée par un sillon; élytres à séries longitudinales de points irréguliers, plus nets sur la moitié antérieure, les côtés présentent des ri les parallèles et transversales peu nettes. — Brésil (Ch. Bruch).

ou faiblement lobé à son sommet, entièrement justaposé au métasternum. — Branches latérales du mésosternum invisibles. — Métasternum largement tronqué ou échancré en avant. — Hanches postérieures excessivement courtes, dilatées au côté externe. — Pattes libres, médiocres; fémurs assez épais, subfusiformes; tibias grêles, subcylindriques, presque droits, les antérieurs et les médians faiblement arqués; tarses très courts, les articles 1 à 4 subégaux entre eux; crochets dentés. — Corps elleptique ou ovalaire, plus ou moins allongé ou écourté, très convexe en dessus.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre paraît exclusivement répandu dans l'Amérique intertropicale. On en connaît actuellement 76 espèces.

1. **L. cruciceps*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 362 (1899) (Goyaz).
2. **L. colorata*, Kerremans, idem, p. 363 (Pérou).
3. **L. dives*, Kerremans, ibidem, Vol. 40, p. 332 (1896) (Amazone).
4. **L. socialis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 169 (1896) (Brésil).
5. **L. Claveri*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 350 (1900) (Colombie).
6. **L. trochilus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 169 (1896) (Brésil).
7. ****L. brasiliensis***, nov. sp. (Brésil) (1).
8. **L. coeruleicollis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 144 (1897) (Minas Geraes).
9. **L. aenea*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 363 (1899) (Goyaz).
10. **L. collaris*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 364 (1899) (Goyaz).
11. **L. taciturna*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 173 (1896) (Brésil).
12. **L. amica*, Kerremans, idem, p. 171 (Brésil).
13. **L. hypocrita*, Kerremans, ibidem, p. 170 (Brésil).
14. **L. subcircularis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 332 (1896) (Brésil).
15. **L. tabaci*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 170 (1896) (Brésil).
16. **L. unicolor*, Kerremans, idem, p. 28 (Vénézuéla).
17. **L. lata*, Kerremans, ibidem, p. 422 (1894) (Mexique).
18. **L. fallax*, Kerremans, ibidem, p. 172 (1896) (Brésil).
19. **L. cupricollis*, Kerremans, ibidem, p. 28 (Vénézuéla).
20. **L. soror*, Kerremans, ibidem, p. 173 (Brésil).
21. **L. cincta*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 361 (1899) (Pérou).
22. **L. minuta*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 422 (1894) (Mexique).
23. **L. dubia*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 141 (1897) (Bolivie).
24. **L. viridiceps*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 362 (1899) (Goyaz).
25. **L. ntidicollis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 423 (1894) (Mexique).
26. **L. peruviana*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 361 (1899) (Pérou).
27. **L. ovata*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 178 (1896) (Brésil).
28. **L. inca*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 363 (1899) (Pérou).
29. **L. inaequalis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 423 (1894) (Mexique).
30. **L. lateralis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 159 (1889) (Panama).
31. **L. levis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 422 (1894) (Mexique).
32. **L. incerta*, Kerremans, idem, p. 173 (1896) (Brésil).
33. **L. modesta*, Kerremans, ibidem, p. 175 (Brésil).
34. **L. pacifica*, Kerremans, ibidem, p. 176 (Brésil).
35. **L. grandis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 331 (1896) (Amazones).
36. **L. elongata*, Kerremans, idem, p. 331 (Amazones).
37. **L. pallidicollis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 143 (Rio).
38. **L. trivialis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 159, pl. 9, f. 5 (1889) (Panama).
39. **L. tristis*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 142 (1897) (Pernambuco).
40. **L. cyanura*, Kerremans, idem, p. 142 (Pernambuco).

(1) Long. 3; larg. 2 mill. — Ovalaire, écourté, élargi, convexe; tête et pronotum vert clair; élytres bleu foncé avec l'apex et une grande tache arrondie et marginale, située dans la dépression latérale vert clair. L'écusson étroitement entouré de vert. Dessous noir. — Tête étroitement sillonnée; pronotum large, obliquement arqué et déprimé sur les côtés, à ponctuation espacée, le disque convexe; élytres droits sur les côtés antérieurs, ensuite largement et conjointement arrondis, les parties vertes plus rugueuses que les bleues. — Brésil (L. Fairmaire).

41. *L. aeneifrons*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 160 (1889) (Panama).
 42. **L. distincta*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 174 (1896) (Brésil).
 43. **L. gibbosa*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 331 (1896) (Amazones).
 44. **L. moerens*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 175 (1896) (Brésil).
 45. *L. nigrita*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 340, pl. 57, f. 335 (1841) (Brésil).
 46. **L. puella*, Kerremans, Ann. Fr. p. 174 (1896) (Brésil).
 47. **L. pygmaea*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 364 (1899) (Brésil).
-
48. *L. ana*, Thomson, Typ. Bupr. p. 93 (1878) (Brésil).
 49. *L. basalis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amér. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 158 (1889) (Guatémala).
 50. *L. Belli*, Waterhouse, idem, p. 666 (Nicaragua).
 51. *L. clara*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 143 (1897) (Rio-Janeiro).
 52. *L. capitata*, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 214 (1801) (Brésil).
 53. *L. compactilis*, Chevrolat, Ann. Soc. Ent. Fr. Vol. 7, p. 588 (1867) (Cuba).
 54. *L. concinna*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 339, pl. 57, f. 334 (1841) (Guyanes).
 55. *L. contigua*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 154, pl. 9, f. 2 (1889) (Panama).
 56. *L. convexa*, Waterhouse, idem, p. 160, pl. 9, f. 6 (Panama).
 57. *L. crassa*, Waterhouse, ibidem, p. 155, pl. 9, f. 3 (Amérique centrale).
 58. *L. difficilis*, Waterhouse, ibidem, p. 161 (Panama).
 59. *L. divisa*, Waterhouse, ibidem, p. 154 (Panama).
 60. *L. dorsalis*, Thomson, Typ. Bupr. p. 81 (1878) (Brésil).
 61. *L. inconspicua*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 162 (1889) (Honduras).
 62. *L. intermedia*, Waterhouse, idem, p. 154, pl. 9, f. 1 (Guatémala).
 63. *L. interrupta*, Waterhouse, ibidem, p. 158 (Panama).
 64. *L. jubilans*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 163 (1889) (Honduras).
 65. *L. longula*, Waterhouse, idem, p. 162 (Mexique).
 66. *L. nigra*, Waterhouse, ibidem, p. 159 (Panama).
 67. *L. parvula*, Waterhouse, ibidem, p. 161, pl. 9, f. 7 (Panama).
 68. *L. placida*, Waterhouse, ibidem, p. 163 (Panama).
 69. *L. polita*, Waterhouse, ibidem, p. 163, pl. 9, f. 8 (Panama).
 70. *L. pulchra*, Waterhouse, ibidem, p. 156, pl. 9, f. 4 (Panama).
 71. *L. puncticeps*, Waterhouse, ibidem, p. 156 (Amérique centrale).
 72. *L. rotundata*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 142 (1897) (Bahia).
 73. *L. rugosa*, Fabricius, Syst. Eleuth. Vol. 2, p. 219 (1801) (Brésil).
 74. *L. venusta*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 157 (1889) (Amérique centrale).
 75. *L. viridicollis*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 343, pl. 58, f. 339 (1841) (Amérique centrale).
 76. *L. viridifrons*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 156 (1889) (Panama).

17. GENUS CALLIMICRA, H. DEYROLLE

Callimicra. H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 219 (1864).

Caractères. — Tête étroite, médiocrement convexe; front silloné; épistome séparé du front par un sillon net, profond et étroit, sa marge antérieure bilobée, fortement rétréci entre les cavités antennaires; celles-ci grandes, arrondies, presque contiguës. — Antennes grêles, insérées au repos dans un sillon net et linéaire situé sous la marge latérale du pronotum et à une certaine distance de celle-ci; article 1^{er} épais, un peu arqué, subfusiforme; 2 aussi épais, mais court et globulaire; 3 à 5 plus grêles, 3 aussi court que 2, les 2 suivants un peu plus longs, subégaux entre eux; les autres triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, ovalaires, peu saillants, un peu obliques et plus faiblement écartés en avant qu'en arrière sur le vertex. — Pronotum grand, convexe, déprimé sur les côtés et le long de la base; la marge antérieure bisinuée avec un lobe médian

subanguleux; les côtés régulièrement arqués avec l'angle postérieur presque droit, très peu obtus; la base bisinuée avec un large lobe médian avancé et arqué, souvent tronqué au-dessus de l'écusson. — Ecusson triangulaire, plus large que long. — Elytres convexes, déclives en arrière, déprimés à la base; les côtés droits ou subsinueux jusqu'au tiers postérieur, ensuite largement et conjointement arrondis. — Marge antérieure du prosternum avancée en mentonnière largement arquée; prosternum plan, largement arrondi en arrière. — Mésosternum invisible. — Mésternum profondément échancré en avant pour la réception du sommet du prosternum. — Hanches postérieures très courtes, convexes, dilatées au côté externe. — Pattes libres, mais insérées dans des dépressions peu profondes; fémurs assez épais, subfusiformes et droits; tibias grêles et subcylindriques; tarses très courts, leurs articles subégaux entre eux; crochets dentés. — Corps assez épais, convexe en dessus et subplan en dessous, elliptique, arrondi en avant et en arrière, les côtés subsinueux et parallèles.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre comprend une trentaine d'espèces disséminées dans l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, à l'exclusion des autres régions.

1. *C. venustula*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 281, pl. 47, f. 274 (1841) (Brésil).
 2. **C. nigra*, Kerremans, Mén. Soc. Ent. Belg. p. 144 (1897) (Goyaz).
 3. *C. taciturna*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 280, pl. 46, f. 273 (1841) (Brésil).
 4. *C. violaceipennis*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 165 (1889) (Mexique).
 5. **C. cyanea*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 146 (1897) (Minas Geraes).
 6. **C. coraeoides*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 366 (1899) (Pérou).
 7. **C. lucidula*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 165 (1889) (Panama).
 8. **C. inca*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 366 (1899) (Pérou).
 9. *C. pinguis*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 75 (1879) (Colombie).
 10. **C. peruviana*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 43, p. 364 (1899) (Pérou).
 11. **C. collaris*, Kerremans, idem, Vol. 44, p. 350 (1900) (Goyaz).
 12. **C. cyanipennis*, Kerremans, ibidem, Vol. 43, p. 365 (1899) (Goyaz).
 13. **C. viridis*, Kerremans, ibidem, p. 365 (Bahia).
 14. *C. subcyanea*, Gory, Mon. Bupr. Suppl. Vol. 4, p. 280, pl. 46, f. 272 (1841) (Brésil).
 15. *C. brevis*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Coraeus*, p. 17, pl. 4, f. 26 (1839) (Brésil).
 16. **C. cuprea*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 145 (1897) (Rio Janeiro).
 17. **C. scapha*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 40, p. 333 (1896) (Brésil).
 18. **C. parallela*, Kerremans, idem, Vol. 43, p. 366 (1899) (Goyaz).
 19. **C. elongata*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 146 (1897) (Minas Geraes).
 20. **C. pygmaea*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 44, p. 351 (1900) (Goyaz).
 21. **C. cylindera*, nov. sp. (1) (Brésil).
-
22. *C. angustula*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 166, pl. 9, f. 10 (1889) (Amér. centr.).
 23. *C. bicolor*, Castelnau & Gory, Mon. Bupr. Vol. 2, *Coraeus*, p. 17, pl. 4, f. 27 (1839) (Brésil).
 24. *C. breviuscula*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 165 (1889) (Mexique).
 25. *C. dimidiata*, Waterhouse, idem, p. 164, pl. 9, f. 9 (Panama).
 26. *C. Goryi*, Thomson, Typ. Bupr. p. 93 (1878) (Brésil).
 27. *C. obtusa*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 164 (1889) (Panama).
 28. *C. scutellata*, Thomson, Typ. Bupr. App. 1a, p. 76 (1879) (Brésil).
 29. *C. timialitha*, Thomson, idem, p. 76 (Brésil).

(1) Long. 3,5; larg. 0,75 mm. — Grêle, allongé, cylindrique, entièrement noir, brillant. — Tête finement sillonnée et convexe; pronotum presque aussi long que large, lisse, convexe, déprimé sur les côtés postérieurs et le long de la base; élytres couverts de séries longitudinales de points et de quelques rides sur les côtés, à hauteur des hanches. Faciè du *C. pygmaea* Kerremans, mais plus grêle et plus allongé. — Brésil (C. Bruch).

TRIBU XII. MASTOGENINI, LE CONTE & HORN

Mastogenini. Le Conte & Horn, Smithson. Instit. 1882; Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 115 (1892); Ann. Fr. Vol. 65, p. 149 (1896).

Caractères. — Cavité sternale formée en entier par le métasternum; mésosternum peu ou non visible; plaques des hanches postérieures à peine dilatées intérieurement; épimères métathoraciques découvertes; crochets des tarses largement dentés; base du pronotum tronquée.

- | | |
|---|----------------|
| 1. Yeux un peu obliques, légèrement rapprochés en arrière sur le vertex | 2 |
| — parallèles | 3 |
| 2. Antennes dentées à partir du 4 ^e article | 1. MASTOGENIUS |
| — — — 3 ^e — | 2. ANKAREUS |
| 3. Les articles dentés des antennes triangulaires | 3. MICRASTA |
| — des antennes allongés et à peine dentés au côté interne | 4. EXAESTHETUS |

I. GENUS MASTOGENIUS, SOLIER

Mastogenius. Solier, Hist. Chili, Vol. 4, p. 507 (1850); Lacordaire, Gen. Col. Vol. 4, p. 85 (1857); H. Deyrolle, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 8, p. 115 (1864).

Haplostethus. Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. (2) Vol. 11, p. 253 (1860).

Caractères. — Tête régulièrement convexe, non ou à peine sillonnée; épistome séparé du front par un sillon transversal et situé sur un plan inférieur à celui-ci, sa marge antérieure échancrée en arc au milieu; cavités antennaires triangulaires et situées contre les yeux. — Antennes dentées à partir du 4^e article, le 1^{er} épais, plus long que 2; celui-ci aussi épais que 1, mais plus court, globulaire; 3 très court, globulaire; les suivants allongés, triangulaires, assez larges en avant, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux assez grands, ovales, un peu obliques et légèrement rapprochés en arrière sur le vertex. — Pronotum grand, convexe, semicirculaire, tronqué droit en arrière avec un sillon le long de la base, la marge latérale tranchante avec, sous celle-ci une carène qui lui est subparallèle. — Ecusson petit, en triangle régulier, plus long que large. — Elytres convexes, tronqués et sillonnés à la base, droits sur les côtés et largement arrondis en arrière. — Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum large en avant, son processus intercoxal avancé en rectangle, tronqué au sommet. — Mésosternum invisible. — Métasternum largement tronqué en avant. — Hanches postérieures subcontiguës, anguleusement dilatées au côté interne. — Pattes peu robustes; fémurs subfusiformes, assez épais; tibias normaux, grêles et cylindriques; tarses très courts; crochets bifides. — Corps oblong, très convexe en dessus, à côtés parallèles, également arrondi en avant et en arrière.

Je ne connaissais pas ce genre lorsque j'ai étudié les deux suivants et je n'ai eu que plus tard ses représentants. J'ai été induit en erreur relativement à certains détails, par la description de Lacordaire, description qui ne concorde que très peu avec ce que j'ai sous les yeux. C'est ainsi que les détails de la structure antennaire, donnés par cet auteur, sont contraires à la réalité et que les yeux sont plus rapprochés sur le vertex que vers la bouche.

Distribution géographique des espèces. — Ce genre, peu nombreux en espèces, est propre au nouveau continent.

1. *M. parallelus*, Solier, Hist. Chili, Vol. 4, p. 508 (1850) (Chili)
2. *M. Solieri*, Thomson, Typ. Bupr. p. 91 (1878) (Brésil).
3. *M. subcyanus*, Le Conte, Trans. Amer. Philos. Soc. (2), Vol. 11, p. 254, pl. 12, f. 8 (1860) (E.-U. d'Amér).

4. *M. aeneus*, Kerremans, Mém. Soc. Ent. Belg. p. 47, (1897) (Rio Janeiro).
5. *M. felix*, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) Vol. 18, p. 106 (1896) (Turnsvaal).
6. *M. sulcicollis*, Philippi, Stett. Ent. Zeit. p. 315 (1864) (Chili).
7. *M. uniformis*, Waterhouse, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) Vol. 18, p. 105 (1896) (Grenada).

2. GENUS ANKAREUS, KERREMANS

Ankareus. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 349 (1894).

Caractères. — Tête convexe, finement sillonnée; épistome assez allongé, bilobé en avant; cavités antennaires assez grandes, médiocrement espacées, subtriangulaires et tuberculées. — Antennes plus longues que la tête et le pronotum réunis, dentées à partir du 3^e article; le 1^{er} allongé, en massue; 2 court, globulaire; les suivants dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale; 3 très allongé, les autres plus courts, tous garnis d'une longue villosité. — Yeux assez grands, peu convexes, elliptiques, à peine obliques et très faiblement rapprochés en arrière, sur le vertex. — Pronotum grand, semicirculaire, convexe, tronqué droit en arrière, très faiblement rebordé à la base; les côtés carénés, avec une seconde carène inférieure, parallèle à la marge latérale. — Ecusson plus long que large, triangulaire, la base droite, les côtés un peu courbes. — Elytres convexes, tronqués à la base, droits sur les côtés et largement arrondis en arrière; un sillon le long de la base. — Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum à processus intercostal moins avancé et plus étroit que chez les *Mastogenius*, subtronqué, un peu arrondi au sommet. — Mésosternum invisible. — Métasternum faiblement échancré en arc en avant. — Hanches postérieures obliques, presque aussi larges sur les côtés internes qu'aux externes, leurs marges subparallèles. — Pattes peu robustes, fémurs subfusiformes; tibias grêles et subcylindriques; tarses très courts, fauves; crochets bifides. — Corps épais, convexe, oblongo-elliptique.

Distribution géographique des espèces. On ne connaît que trois espèces de ce genre qui représente à Madagascar les *Mastogenius* de l'Amérique.

- 1.* *A. subcyaneus*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 38, p. 351 (1894) (Madagascar).
- 2.* *A. aeneus*, Kerremans, idem, p. 351 (Madagascar).

3. *A. cyanicollis*, Kerremans, idem, p. 350 (Madagascar).

3. GENUS MICRASTA, KERREMANS

Micrasta. Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 115 (1893).

Caractères. — Tête peu convexe; front sillonné; épistome assez allongé, faiblement échancré en avant; cavités antennaires espacées; subarrondies, médiocres. — Antennes peu allongées, glabres, dentées à partir du 4^e article; 1 et 2 épais, 1 plus long que 2; 3 grêle, à peine plus long que 2; les suivants triangulaires, dentés au côté interne et munis d'une fossette porifère terminale. — Yeux médiocres, peu saillants, elliptiques et parallèles. — Pronotum grand, convexe, semicirculaire, tronqué droit à la base avec un sillon longeant celle-ci. — Ecusson très petit, subtriangulaire. — Elytres convexes, tronqués en avant, droits sur les côtés et largement arrondis au sommet; la base sillonnée. — Marge antérieure du prosternum tronquée; prosternum large et plan, tronqué au sommet, son processus intercoxal assez large et carré. — Mésosternum invisible. — Métasternum tronqué en avant. — Hanches postérieures légèrement dilatées au côté interne et à l'externe. — Pattes peu robustes; fémurs un peu renflés, subfusiformes; tibias grêles, subcylindriques; tarses très courts, jaune fauve; crochets bifides. — Corps épais, convexe, elliptique, droit sur les côtés et arrondi en avant et en arrière.

Distribution géographique des espèces. — On ne connaît que 7 espèces de ce genre, toutes du Brésil.

1. **M. meligethoides*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 115 (1893) (Brésil).
2. **M. grandithorax*, Kerremans, idem, p. 115 (Brésil).
3. **M. viridis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 151 (1896) (Brésil).
4. **M. parallela*, Kerremans, idem, p. 152 (Brésil).
5. **M. cyanipennis*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Belg. Vol. 37, p. 115 (Brésil).
6. **M. typica*, Kerremans, idem, p. 115 (Brésil).
7. **M. minuta*, Kerremans, Ann. Soc. Ent. Fr. p. 153 (1896) (Brésil).

4. GENUS EXAESTHETUS, WATERHOUSE

Exaesthetus. Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 192 (1889).

Caractères. — « Cavités antennaires petites, pas très rapprochées. Antennes un peu plus » longues que la tête et le pronotum réunis, villeuses; le 1^{er} et le 2^e article médiocrement robuste, les » suivants plus grêles, allongés. Pronotum convexe, transversal, impressionné à la base, finement » marginé sur les côtés, les angles antérieurs déclives et invisibles en dessus. Ecusson allongé, subpen- » tagonal. Elytres aussi larges que la base du pronotum, subparallèles, atténués en arc au sommet, sans » côtes. Prosternum sans mentonnière; le processus intercostal quadrangulaire, obtusément arrondi à » l'apex, presque tronqué et juxtaposé contre un processus peu accusé du métasternum. Episternum » métathoracique peu large, subparallèle. Hanches postérieures de la même hauteur sur toute leur » surface. Premier et deuxième segments abdominaux soudés, le processus intercoxal acuminé. Pattes » assez minces; les tibias droits; les tarses médiocrement allongés, le 1^{er} et le 2^e article avec une très » courte lamelle, peu visible lorsqu'elle est desséchée, le 4^e article avec une large lamelle mince; les » crochets lobés au milieu.

« Je pense que ce Buprestide très aberrant peut être placé près des *Mastogenius*. Son faciès rappelle celui des *Haplocnemus* (Dasytide). »


Distribution géographique de l'espèce. — Je ne connais ce genre que par la description de son fondateur. C'est incontestablement un *Mastogenius* et les caractères sont suffisamment distincts des autres genres de la tribu. L'unique espèce connue provient du Mexique.




1. *E. dasytoides*, Waterhouse, Biol. Centr. Amer. Col. Vol. 3, pt. 1, p. 173, pl. 9, 15, 15 a-c (1889) (Mexique)

EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE I

- Fig. 1. *Sternocera rufipennis*, Kerremans, p. 9.
 — 2. *Julodis Heva*, Kerremans, p. 12.
 — 3. *Amblysterna stictica*, Kerremans, p. 15.
 — 4. *Blepharum bivittatum*, Kerremans, p. 19.
 — 5. *Paracastalia plagiata*, Kerremans, p. 22.
 — 6. *Pseudocastalia cyaneoviridis*, Kraatz, p. 25.
 — 7. *Polycestella curta*, Kerremans, p. 25.
 — 8. *Polycestoides chrysis*, Kerremans, nov. sp., p. 27 (note).
 — 9. *Chrysochroa (Demochroa) Corbetti*, Kerremans, p. 47.
 — 10. *Madecassia Rothschildi*, Gahan, p. 82.
 — 11. *Psiloptera (Lampetis) sulcicollis*, Kerremans, p. 95.
 — 12. *Psiloptera (Polybothris) Carreti*, Kerremans, nov. sp., p. 99 (note).








Metasambus Weyersi, Kerrem.



Melibaeopsis Weyersi, Kerrem.



Samboides viridana, Kerrem.



Erimantius rufopictus, Kerrem.



Diadora gibbicollis, Kerrem.



Epimacha planata, Kerrem.



Nastella Fairmairei, Kerrem.



Planidia velutina, Kerrem.



Demostis elongata, Kerrem.



Mundaria typica, Kerrem.



Asymodes transvalensis, Kerrem.



Belgaumia capacina, Kerrem.



Hypocisseis latipennis, Mac Leay.



Agrilus deliciosus, Kerrem.



Kamasia thoracica, Kerrem.



Velutia sericea, Kerrem.

FAM. BUPRESTIDÆ



Paracephala crassa, Kerrem.



Bergidora pictarella, Kerrem.



Cylindromorphoides agriliformis, Kerrem.



Anthaxomorphus viridiceps, Kerrem.



Germanica casuarinae, Blackb.



Endelus cornutus, Kerrem.



Trachys imperatrix, Kerrem.



Paratrachys pilifrons, Kerrem.



Pachyschelus horanus, Fairm.



Lius rugosus, Kerrem.



Brachys insignis, Kerrem.



Taphrocerus minutus, Kerrem.



Leiopleura brasiliensis, Kerrem.



Callimicra collaris, Kerrem.



Ankareus subcyaneus, Kerrem.



Micrasta grandithorax, Kerrem.

FAM. BUPRESTIDÆ

PLANCHE 2

- Fig. 1. *Armenosoma atrum*, Waterhouse, p. 110.
 — 2. *Melobasina apicalis*, Kerremans, p. 144.
 — 3. *Parastassa Caroli*, Marseul, p. 153.
 — 4. *Xenorhipis Brendeli*, Le Conte, a. ♂; b. ♀; c. antenne du ♂, p. 162.
 — 5. *Agrilaxia bella*, Kerremans, nov. sp., p. 178 (note 2).
 — 6. *Pseudactenodes Schmidt*, Quedenfeldt, p. 196.
 — 7. *Stigmodera praezellens*, Kerremans, p. 206.
 — 8. *Hyperantha Stempelmanni*, C. Berg, p. 217.
 — 9. *Alcinous nodosus*, Kerremans, p. 222.
 — 10. *Strigulia cyclodera*, Fairmaire, p. 224.
 — 11. *Chloricalla gratiosa*, Kerremans, p. 231.
 — 12. *Brachycorachus picturellus*, Kerremans, p. 234.

PLANCHE 3

- Fig. 1. *Metasambus Weyersi*, Kerremans, p. 237.
 — 2. *Melibaeopsis obesa*, Kerremans, p. 240.
 — 3. *Samboides viridana*, Kerremans, p. 242.
 — 4. *Evimantius rufopictus*, Kerremans, p. 245.
 — 5. *Diadora gibbicollis*, Kerremans, p. 247.
 — 6. *Epimacha planata*, Kerremans, p. 249.
 — 7. *Nastella Fairmaireis*, Kerremans, p. 249.
 — 8. *Planidia velutina*, Kerremans, p. 250.
 — 9. *Demostis elongata*, Kerremans, p. 251.
 — 10. *Mundaria typica*, Kerremans, p. 251.
 — 11. *Asymades transvalensis*, Kerremans, p. 252.
 — 12. *Belgaumia capucina*, Kerremans, p. 252.
 — 13. *Hypocisseis latipennis*, Mac Leay, p. 256.
 — 14. *Agrilus deliciosus*, Kerremans, p. 266.
 — 15. *Kamosia thoracica*, Kerremans, nov. sp., p. 294.
 — 16. *Velutia sericea*, Kerremans, p. 295.

PLANCHE 4

- Fig. 1. *Paracephala crassa*, Kerremans, p. 297.
 — 2. *Bergidora picturella*, Kerremans, p. 298.
 — 3. *Cylindromorphoides agriliformis*, Kerremans, p. 302.
 — 4. *Anthaxomorphus viridiceps*, Kerremans, p. 302.
 — 5. *Germanica casuarinae*, Blackburn, p. 303.
 — 6. *Endelus cornutus*, Kerremans, p. 305.
 — 7. *Trachys imperatrix*, Kerremans, p. 308.
 — 8. *Paratrachys pilifrons*, Kerremans, p. 315.
 — 9. *Pachyschelus hovanus*, Fairmaire, p. 320.
 — 10. *Lius rugosus*, Kerremans, nov. sp., p. 323.
 — 11. *Brachys insignis*, Kerremans, p. 326.

- Fig. 12. *Taphrocerus minutus*, Kerremans, nov. sp., p. 328 (note).
 — 13. *Leiopleura brasiliensis*, Kerremans, nov. sp., p. 329 (note).
 — 14. *Callimicra collaris*, Kerremans, p. 331.
 — 15. *Ankareus subcyaneus*, Kerremans, p. 333.
 — 16. *Micrasta grandithorax*, Kerremans, p. 334.

Les figures reproduites sur les planches ont été exécutées par M. W. PURKISS, de Londres, d'après les spécimens de ma collection.

INDEX ALPHABÉTIQUE (1)

(Les chiffres indiquent la pagination)

Acantha 69, Acanthopygus 293, **Acherusia** 17, **Acmaeodera** 27, ACMAEODERITES 27, **Actenodes** 193, ACTENODITES 193, **Agaeocera** 59, **Agelia** 49, **Aglaostola** 155 **Agrilaxia** 177, AGRILINI 217, AGRILITES 217, **Agriloides** 264, **Agrilus** 266, Alampetis 90, **Alcynous** 221, **Alyssoderus** 245, **Amblysterna** 15, **Amorphosoma** 254, **Amorphosternus** 255, Amphisbeta 90, **Amyia** 238, **Anadora** 258, Ancylocheira 140, **Ancylotela** 41, **Anilara** 169, **Ankareus** 333, Anoplis 140, **Anthaxia** 170, ANTHAXITES 154, **Anthaxomorphus** 302, Apatea 90, Apateum 90, Apatura 20, **Aphanisticus** 303, Aplax 90, Aprosupus 63, **Aristosoma** 152, Argante 131, **Armenosoma** 110, **Asemochrysus** 62, **Astraeus** 148, **Asymades** 252, **Aurigena** 105, **Autarchontes** 261.

Belgaumia 252, **Belionota** 197, **Bergidora** 297, **Blepharum** 19, **Brachycoraebus** 234, **Brachys** 324, **Briseis** 161, **Bubastes** 150, Bubastodes 22, BUPRESTIDAE 3, BUPRESTINI 124, **Buprestis** 140, BUPRESTITES 138, **Bulis** 150.

Callimicra 330, **Callipyndax** 239, **Callistroma** 84, **Callopiustus** 52, **Calodema** 202, **Capnodis** 106, Carcinias 90, **Cardiaspis** 126, Cassidabothris 90, **Castalia** 23, Castiarina 206, Catoxantha 47, Chalcangium 193, Chalcogenia 167, **Chalcopoecila** 136, **Chalcoplia** 78, **Chalcophora** 77, **Chalcophorella** 79, CHALCOPHORINI 56, CHALCOPHORITES 56, **Chalcophoropsis** 54, **Chalcotaenia** 76, Chilostetha 110, **Chloricalla** 231, **Chrysaspis** 50, **Chrysestes** 58, Chrysoblemma 110, CHRYSOBOTHRINI 181, **Chrysobotris** 183, CHRYSOBOTHRITES 181, **Chrysochroa** 46, CHRYSOCHROINI 45, **Chrysodema** 73, **Chrysophana** 21, **Cinyra** 137, **Cisseicoraebus** 253, **Cisseis** 227, **Cisseoides** 254, **Clema** 298, Clinocera 295, Coccinellopsis 90, Coeculus 108, **Colobogaster** 182, **Conognatha** 199, **Coraebastus** 223, **Coraebus** 231, **Coraegribus** 300, Cornelia 90, **Corydon** 224, Cratomerus 171, **Cryptodactylus** 243, **Curis** 180, **Cyalithus** 63, **Cylindromorphoides** 301, **Cylindromorphus** 299, Cylindrophora 180, Cynira 137, **Cyphogastra** 86, **Cyphosoma** 108, **Cyphothorax** 258, **Cyria** 54.

Dactylozodes 214, Damarsila 95, Demochroa 47, **Demostis** 251, Deudora 111, **Diadora** 247, **Diadoxus** 65, Diana 163, **Dicerca** 130, Dicerites 124, **Dicercomorpha** 127, **Diceropygus** 160, **Diplolophotus** 265, **Discoderes** 222, **Dystaxia** 43.

Ectinogonia 128, **Endelus** 305, **Engyaulus** , Engycera 153, **Entomogaster** 225, **Epidelus** 62, **Epimacha** 249, **Epistomentis** 55, Erebodes 90, **Ethon** 226, **Euamyia** 238, **Euchroma** 67,

(1) Les noms des genres sont en caractères gras; les tribus et les groupes en majuscules; les synonymes des genres en caractères ordinaires.

Euharpya 90, Eumerus 238, **Eupristocerus** 246, Eurybia 151, **Euryspilus** 151, **Eurythyrea** 139, **Evagora** 109, **Evides** 61, **Evimantius** 245, **Exaesthetus** 334, **Exagistus** 156.

Galbella 316, **Geralius** 293, **Germanica** 302, **Glyptoscelimorpha** 42, Goniophthalma 303, Gyascutus 64.

Habroloma 307, **Halecia** 69, Haplostethus 332, **Haplotrinchus** 126, Hemisobothris 90, **Hilarotes** 89, **Hippomelas** 64, Hoplistura 111, Hoplandrocneme 111, **Hyperantha** 216, **Hypocisseis** 256, **Hypoprasis** 67, Hypostigmodera 203.

Icaria 103, **Icarina** 103, **Iridotaenia** 72, **Isophaenus** 152.

Janthe 316, Julodiella 13, **Julodimorpha** 16, JULODIMORPHITES 16, JULODINI 6, **Julodis** 9.

Kamosia 294, **Kisanthobia** 163.

Lachesis 88, Laconides 90, Lamesis 162, Lampetis 92, **Lampra** 134, Lamprocheila 61, **Latipalpis** 104, **Leiopleura** 328, **Lius** 321.

Madecassia 82, Maschalix 256, MASTOGENINI 332, **Mastogenius** 332, **Megactenodes** 196, Megaloxantha 47, **Melanophila** 163, **Melibaeopsis** 239, **Melibaeus** 234, **Melobasina** 144, **Melobasis** 157, **Merimna** 166, **Metasambus** 237, Metonius 317, **Metaxymorpha** 203, **Micrasta** 333, **Microscastalia** 22, **Mixochlorus** 60, Monosacra 95, **Mundaria** 251, **Mychommatus** 260.

Nascio 146, **Nascioides** 147, **Nastella** 249, Nemaphorus 25, Neobubastes 150, **Neobuprestis** 136, **Neocoraebus** 230, **Neocuris** 179, Neojulodis 13, Neospades 227, **Notomorpha** 41, **Notographus** 169, Notograptus 169.

Ocypetes 149, Odontomus 183, **Oedisterna** 103, **Omochyseus** 262, Oncomaea 316. Oomorpha 37, Ovalisa 134, Oxypteris 163, Pachypyga 168, **Pachyschelus** 317, Palaeobothris 90, **Paracastalia** 22, **Paracephala** 296, **Paracupta** 82, **Paradomorphus** 263, **Paradora** 248, **Paragrillus** 295, **Paraphrixia** 20, **Parastassa** 153, **Parataenia** 71, **Paratrachys** 314, **Pareumerus** 237, **Pasyphae** 68, **Pelecopseiaphus** 58, **Periorisma** 63, **Peronaemis** 145, Perotis 105, **Phlocteis** 257, **Phaenops** 162, Phelix 108, **Philanthaxia** 153, **Philocteanus** 53, Phobetodes 90, **Phrixia** 19, **Pithiscus** 200, Plagiopse 156, **Planidia** 250, **Pleiona** 85, **Poecilonota** 133, **Poecilonota** 216, POLYBOTHRI 97, **Polycesta** 25, **Polycestella** 25, POLYCESTINI 15, POLYCESTITES 16, **Polycestoides** 27, **Polyctesis** 38, **Polyonychus** 247, **Prospheres** 18, **Pseudactenodes** 195, **Pseudagrillus** 240, **Pseudhyperantha** 125, **Pseudianthe** 315, **Pseudocastalia** 24, Pseudochrysodema 73, Pseudophthalma 90, **Pseudotaenia** 81, **Psiloptera** 90, PSILOPTERITES 89, **Pterobothris** 146, **Ptosima** 39, PTOSIMITES 37, Ptychomus 27, Pycnbothris 90, **Pygicera** 145.

Rhaeboscelis 292, Rhaphidochila 111, **Rethia** 123.

Soccosoma 9, **Samboides** 242, **Sambus** 241, **Scaptelytra** 66, SCHIZOPINI 42, **Schizopus** 44, Semnopharus 203, **Sphenoptera** 110, SPHENOPTERINI 109, **Sponsor** 37, **Sponsorinus** 316, **Stenogaster** 259, **Stenianthe** 315, Stenuris 131, **Steraspis** 51, **Sternocera** 7, **Stigmodera** 203, STIGMODERINI 198, Strigoptera 23, **Strigulia** 224, Strobilodera 110, **Synechocera** 221,

Taphrocera 327, Themognatha 205, **Tetragonoschema** 168, **Thrincopyge** 44, Thrincopygini 44, **Torresita** 156, **Toxoscelus** 244, **Trachykele** 130, TRACHYDES 300, TRACHYNI 300, Trachypteris 163, **Trachys** 307, TRACHYTES 300, **Trigonogenium** 167, Trigonophorus 167, Tropeopeltis 111, Trypanidius 259, **Trypantius** 259, **Tylauchenia** 149, **Tyndaris** 40.

Velutia 894.

Xenopsis 21, **Xenorhipis** 162, **Xyroschelis** 42.

Yamina 143.

Zemina 214.

REMARQUE RELATIVE A LA DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE
DES GENRES ET DES ESPÈCES

Les citations géographiques ont été formulées d'après les régions ou les localités de capture pour les espèces que je possède et pour celles qui ne me sont pas connues en nature, d'après les indications des auteurs cités.

ERRATA ET CORRIGENDA

Page 19. — 3. Genus **Blepharum**, Leconte, lisez **Thomson**.

Page 20. — 5. Genus **Apatura**, Castelnau & Gory, lisez **Paraphrixia**, Kerremans (Le nom d'*Apatura* existe déjà dans la nomenclature zoologique; il passe donc en synonymie).

Page 38. — 1. *S. fugens*, Fairmaire, lisez *fulgens*.

Bruxelles, le 15 septembre 1903.